

DECOCORT CREAM

Miconazole Nitrate / Hydrocortisone (2.0% w/w / 1.0% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Decocort Cream
2. Bagaimana Decocort Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Decocort Cream
4. Cara menggunakan Decocort Cream
5. Semasa menggunakan Decocort Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Decocort Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Risalah ini menjawab beberapa soalan umum tentang Decocort Cream. Ia tidak mengandungi semua maklumat yang sedia. Risalah ini tidak menggunakan tempat atau nasihat doktor atau ahli farmasi.

Semua ubat mempunyai risiko dan manfaat. Doktor anda telah mempertimbangkan risiko anda terhadap manfaat yang diharapkan daripada menggunakan ubat ini.

Simpan risalah ini dengan ubat. Anda mungkin ingin membaca lagi.

Apakah kegunaan Decocort Cream

Decocort Cream digunakan untuk rawatan jangkitan kulat disertai dengan keradangan, ruam yang dijangkiti oleh kulat atau bakteria positif gram.

Bagaimana Decocort Cream berfungsi

Ubat ini mengandungi *Miconazole Nitrate* yang mempunyai sifat anti-kulat.

Sebelum menggunakan Decocort Cream

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Decocort Cream:

- jika anda dalam terapi warfarin
- jika anda alahan kepada Miconazole Nitrate dan Hydrocortisone
- bahan-bahan kandungan yang tersenarai pada hujung risalah ini.
- dalam bakteria atau luka yang tidak dirawat, jerawat dan ruam peluh

-Sebelum mula menggunakan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda:

- Jika anda hamil, menyusui atau bercadang untuk kehamilan, beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan Decocort Cream. Jika anda telah memaklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda, ikut arahan beliau berhati-hati.

-Jika menggunakan ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda tentang semua ubat-ubatan yang lain dan produk kulit yang anda gunakan, termasuk ubat-ubatan dipreskripsikan dan tanpa preskripsi, vitamin, makanan tambahan herba, dan kosmetik. Tiada jenis interaksi ubat dengan Decocort Cream telah dilaporkan.

Cara menggunakan Decocort Cream

-Berapa banyak harus digunakan

- Jangkitan kulit: Sapukan sekali atau dua kali sehari sehingga jangkitan pada kulit hilang.
- Jangkitan kuku: Sapukan sekali sehari dan tutup dengan pembalut. Teruskan rawatan sehingga kesan sembuh dapat dilihat.

Penggunaan Pediatrik: Jangan gunakan pada kanak-kanak di bawah 2 tahun kecuali di bawah nasihat perubatan

Penggunaan jangka panjang Miconazole boleh menyebabkan peningkatan terlalu banyak organisma yang tidak mudah terdedah.

Kesan sistemik seperti penindasan adrenal (pengeluaran hormon yang tidak mencukupi oleh kelenjar adrenal), gula tinggi dalam darah, gula dalam air kencing dan Cushing Syndrome (tahap kortisol yang tidak normal) akan berlaku apabila jumlah kortikosteroid yang banyak diserap ke dalam badan.

-Bila perlu digunakan

Rawatan harus dimulakan secepat mungkin selepas jangkitan pertama.

-Berapa lama perlu digunakan

Jika kawasan yang terjejas masih tidak sembuh selepas tempoh rawatan, penggunaan krim harus dihentikan dengan segera dan beritahu doktor anda. Jika keadaan menjadi lebih teruk atau tidak bertambah baik selepas penggunaan produk ini seperti yang diarahkan, dapatkan nasihat doktor.

-Jika terlupa menggunakan

Gunakan ia sebaik sahaja anda ingat. Kemudian kembali ke jadual biasa anda. Jika telah sampai masa untuk dos seterusnya, gunakan hanya 1 dos, dan terus dengan jadual biasa anda.

Jangan menggandakan penggunaan dos bagi dos yang tertinggal. Jika anda terlepas beberapa dos, beritahu doktor anda.

-Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika anda menggunakannya terlalu banyak, sila berbincang dengan doktor anda atau pergi ke hospital secepat mungkin.

Semasa menggunakan Decocort Cream

-Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda akan mula menggunakan sebarang ubat baru yang lain, ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi dan ubat-ubatan herba, beritahu doktor atau ahli farmasi anda bahawa anda menggunakan Decocort Cream.

Hubungi doktor jika anda mengalami penglihatan yang kabur atau gangguan penglihatan yang lain.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Decocort Cream tidak digalakkan untuk digunakan pada mata dan membran mukus. Decocort Cream boleh menyebabkan kerengsaan kulit. Jika anda tidak pasti, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakannya.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Perhatian khusus perlu diambil untuk mengelakkan penggunaan dengan tidak sengaja ke dalam mata. Jika kerengsaan atau sensitiviti berlaku, rawatan perlu dihentikan.

Dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor jika tiada tanda untuk sembuh.

Kesan-kesan sampingan Decocort Cream

Penggunaan Decocort Cream boleh menyebabkan kesan sampingan seperti:

- kulit kering, kerengsaan, rasa pedih
- penipisan tisu kulit
- dalam kegunaan berpanjangan, penghasilan hormon kortikal boleh berlaku
- keradangan pada folikel rambut, pertumbuhan rambut yang berlebihan
- jerawat, mengurangkan warna kulit
- ruam di sekitar mulut, sakit kulit akibat alahan
- melembutkan dan memecah kulit akibat dedahan lembapan
- regangan kulit
- ruam peluh
- penglihatan kabur

Jika kesan sampingan menjadi semakin teruk atau anda mengalami kesan sampingan yang tidak dinyatakan di dalam risalah ini, maklumkan doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Decocort Cream

-Penyimpanan

Simpan pada 2°C hingga 8°C. Jauhi daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Lupuskan ubat selepas tarikh luput. Sila dapatkan nasihat ahli farmasi tentang cara pelupusan sebarang ubat yang tidak digunakan lagi. Guna sebelum tarikh luput yang tertera pada bungkus.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna

Decocort Cream adalah krim putih dalam tiub aluminium bersaiz 15g.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan-bahan aktif:

Miconazole Nitrate dan *Hydrocortisone*

-Bahan-bahan tidak aktif:

Chlorocresol, Propylene Glycol, Cetomacrogol 1000, White Soft Paraffin, Cetostearyl Alcohol, Liquid Paraffin dan *Purified water*.

-Nombor MAL:

MAL19986503AZ

Pengilang:

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6,
Bandar Sultan Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
MALAYSIA.

Pemegang Pendaftaran Produk:

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6,
Bandar Sultan Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
MALAYSIA.

Tarikh kemaskini RiMUP

06/10/2022

Serial Number:

NPRA(R4/1)311018/00320