HOE GENTAMICIN CREAM

Gentamicin Sulphate (0.17%w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Hoe Gentamicin
2. Bagaimana Hoe Gentamicin berfungsi
3. Sebelum menggunakan Hoe Gentamicin
4. Cara menggunakan Hoe Gentamicin
5. Semasa menggunakan Hoe Gentamicin
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Hoe Gentamicin
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Risalah ini menjawab beberapa soalan lazim tentang Hoe Gentamicin. Ia tidak mengandungi semua maklumat yang tersedia. Ia juga tidak menggantikan tempat ahli farmasi atau doktor anda.

Semua ubat mempunyai risiko dan manfaat. Ahli farmasi atau doktor anda telah mempertimbangkan risiko anda menggunakan Hoe Gentamicin berbanding manfaat yang mereka jangka untuk anda.

Jika anda mempunyai sebarang kemusykilan tentang penggunaan ubat ini, tanya ahli farmasi atau doktor anda.

Simpan risalah ini bersama ubat. Anda mungkin perlu membacanya lagi.

Apakah kegunaan Hoe Gentamicin

Hoe Gentamicin digunakan sebagai rawatan topikal untuk merawat pelbagai jenis kulit yang berpunca dari jangkitan bakteria umum.
Doktor anda mungkin telah mencadangkan ubat ini untuk keadaan yang lain daripada yang disenaraikan dalam risalah ini. Jika anda belum berbincang dengan doktor anda atau tidak pasti mengapa anda diberikan ubat ini, bercakap dengan doktor anda.

Bagaimana Hoe Gentamicin berfungsi

Hoe Gentamicin tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dikenali sebagai antibiotik. Antibiotik dalam produk ini ialah *Gentamicin Sulphate* yang memberi aktiviti antibakteria terhadap kuman (bakteria) pada kulit.

Tanya ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang ubat ini.

Sebelum menggunakan Hoe Gentamicin

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Hoe Gentamicin

- Jika anda sensitif atau mangalami tanda-tanda tindak balas alahan kepada sebarang bahan-bahan yang berkaitan dengan ubat in.

Sebahagian daripada tanda-tanda tindak balas alahan termasuk sesak nafas, semput atau kesukaran bernafas, bengkak muka, bibir, lidah atau bahagian-bahagian badan yang lain; ruam, gatal-gatal pada kulit.

-Sebelum mula menggunakan

Maklumkan ahli farmasi atau doktor:

- Sekiranya anda mempunyai jangkitan pada kulit dan nyatakan kawasan jangkitan.
- Keadaan perubatan anda atau alahan yang anda mungkin ada, dan apa-apa fakta yang penting tentang kesihatan anda

Kehamilan dan penyusuan:

- Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum penggunaan ubat ini sekiranya anda hamil, bercadang untuk hamil atau menyusu badan.
- Tiada rekod menunjukkan ubat ini selamat digunakan semasa kehamilan dan laktasi (penyusuan).

-Jika menggunakan ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda tentang semua ubat-ubatan yang lain dan produk kulit yang anda gunakan, termasuk ubat-ubatan preskripsi dan bukan preskripsi, vitamin, makanan tambahan herba, dan kosmetik.

Cara mennggunakan Hoe Gentamicin

-Berapa banyak harus digunakan

Gunakan ubat 3 – 4 kali sehari pada bahagian kulit yang terjejas.
Mengenai dos ubat yang diperlukan, rujuk doktor atau ahli farmasi anda:

- berapa banyak Hoe Gentamicin untuk disapukan, dan
- berapa tebal untuk menyapu Hoe Gentamicin

-Bila perlu digunakan

Gunakan ubat 3 – 4 kali sehari. Sentiasa mencuci tangan anda selepas menggunakan Hoe Gentamicin

-Berapa lama perlu digunakan

Jika anda tidak pasti berapa lama anda perlu menggunakan Hoe Gentamicin, atau jangkitan anda tidak bertambah baik selepas kursus

rawatan, atau jika ia menjadi lebih teruk, hubungi doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Sila gunakan ubat ini seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Jika anda terlupa untuk menyapu ubat ini, sapu ia sebaik sahaja anda ingat. Jika ia hampir masa untuk penggunaan seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan terus dengan jadual biasa anda.

-Jika menggunakan berlebihan (terlebih dos)

Penggunaan berlebihan Hoe Gentamicin jarang berlaku. Jika anda mengesyaki bahawa anda terlebih dos, sila rujuk doktor atau ahli farmasi anda. Bawa baki ubat dengan anda.

Semasa menggunakan Hoe Gentamicin

-Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda bersedia untuk memulakan penggunaan ubat baru yang lain, maklumkan ahli farmasi atau doktor anda yang anda sedang menggunakan Hoe Gentamicin.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan teruskan penggunaan Hoe Gentamicin sekiranya anda mengalami iritasi atau sensitif selepas menggunakan ubat ini.

Jangan berikan ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai gejala yang sama seperti anda. Ianya boleh membahayakan orang lain jika tidak dipreskripsi oleh doktor.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Ubat ini tidak boleh digunakan di dalam atau kawasFan berhampiran mata. Jika ini berlaku, basuh mata anda dengan pencuci mata. Mata anda mungkin pedih. Sekiranya anda mengalami sebarang masalah penglihatan, hubungi doktor anda dengan segera.

Jangan gunakan ubat ini dalam jangka masa yang lama, melainkan doktor atau ahli farmasi anda telah memberitahu anda.

Jangan telan ubat ini.

Kesan-kesan sampingan

Keracunan pada bahagian dalam telinga dan buah pinggang telah dilaporkan sering berlaku ketika rawatan topikal akibat pembakaran teruk dengan gentamicin.

Seperti ubat-ubatan lain, Hoe Gentamicin boleh menyebabkan beberapa kesan sampingan. Walau bagaimanapun, kebiasaannya ia tidak serius. Sesetengah mungkin serius dan memerlukan perhatian perubatan.

Berhenti mengambil ubat ini dan mendapatkan nasihat doktor dengan segera jika anda mengalami gejala berikut. Anda mungkin mempunyai reaksi alergi.

- kegatalan, ruam dan irritasi (termasuk kesakitan, kepanasan, rasa pedih and kemerahan kulit) yang teruk dan secara mendadak.
- loya atau muntah-muntah
- bengkak muka , bibir , mulut, lidah atau tekak dengan kesukaran bernafas.

Jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan ini, walaupun yang tidak dinyatakan di dalam risalah ini, maklumkan doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npra.moh.gov.my (Consumers→Reporting→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Hoe Gentamicin

-Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30 ℃.
Tutup dengan rapat dan betul.
Lindungi daripada cahaya terik.
Jauhi daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Lupuskan ubat selepas tarikh luput.
Sila dapatkan nasihat ahli farmasi tentang cara pelupusan sebarang ubat yang tidak digunakan lagi.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna Hoe Gentamicin
Hoe Gentamicin adalah krim putih dan boleh didapati dalam 15g tiub aluminium.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan-bahan aktif:
Gentamicin Sulphate 0.17%w/w

Bahan-bahan tidak aktif:
Methylparaben, Propylparaben, White Soft Paraffin, Liquid Paraffin, Propylene Glycol, Cetostearyl Alcohol, Cetomacrogol 1000, Sodium Dihydrogen Phosphate, Phosphoric Acid, Sodium Edetate dan *Purified Water*.

-*Nombor MAL:* MAL19970907AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd. Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6, Bandar Sultan Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

19/2/2020

Serial number

NPRA(R4/1)211218/00379