

DECOZOL ORAL GEL

Miconazole (2% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Decozol Oral Gel
2. Bagaimana Decozol Oral Gel berfungsi
3. Sebelum menggunakan Decozol Oral Gel
4. Cara menggunakan Decozol Oral Gel
5. Semasa menggunakan Decozol Oral Gel
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Decozol Oral Gel
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Risalah ini menjawab beberapa soalan lazim tentang Decozol Oral Gel. Ia tidak mengandungi semua maklumat yang tersedia. Ia juga tidak menggantikan tempat ahli farmasi atau doktor anda.

Semua ubat mempunyai risiko dan manfaat. Ahli farmasi atau doktor anda telah mempertimbangkan risiko anda mengambil Decozol Oral Gel berbanding manfaat yang mereka jangka untuk anda.

Jika anda mempunyai sebarang kemusykilan tentang pengambilan ubat ini, tanya ahli farmasi atau doktor anda.

Simpan risalah ini bersama ubat. Anda mungkin perlu membacanya lagi.

Apakah kegunaan Decozol Oral Gel

Decozol Oral Gel digunakan untuk merawat jangkitan kulat dalam mulut, tekak, perut atau usus dewasa atau kanak-kanak yang berumur 6 bulan dan ke atas. Untuk kanak-kanak yang berumur antara 4 hingga

6 bulan, pastikan mereka tidak mempunyai sebarang masalah menelan sebelum memberikan rawatan dengan gel oral ini.

Bagaimana Decozol Oral Gel berfungsi

Decozol Oral Gel mengandungi *miconazole* yang mempunyai aktiviti anti-kulat terhadap *dermatophytes* dan yis serta aktiviti antibakteria terhadap sesetengah bakteria.

Jika anda mempunyai sebarang kemusykilan tentang pengambilan ubat ini, tanya ahli farmasi atau doktor anda.

Sebelum menggunakan Decozol Oral Gel

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Decozol Oral Gel:

- jika anda ada alahan terhadap *miconazole* atau apa-apa bahan dalam ubat ini.
- jika anda mengalami masalah hati

Jangan menggunakan ubat ini jika anda mengalami mana-mana keadaan yang disenaraikan di atas. Jika anda tidak pasti, sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan Decozol Oral Gel.

Jangan menggunakan Decozol Oral Gel jika anda sedang melalui terapi menggunakan *warfarin*.

-Sebelum mula menggunakan

Jika anda memberikan gel untuk bayi atau kanak-kanak, pastikan gel tidak menghalang kerongkong kerana mereka boleh tercekik.

Kehamilan dan penyusuan:

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum penggunaan ubat ini sekiranya anda hamil atau menyusu.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda sedang mengambil apa-apa produk lain (misalnya ubat yang dibeli tanpa preskripsi doktor, ubat yang dipreskripsikan dan produk-produk herba).

Penggunaan Decozol Oral Gel bersama ubat penggumpalan darah seperti *warfarin* tertakluk kepada metabolisme oleh CYP2C9 (enzim) perlu dipantau dengan teliti.

Cara menggunakan Decozol Oral Gel

-Berapa banyak harus digunakan

Doktor anda akan memberitahu anda kuantiti Decozol Oral Gel yang diperlukan dan untuk berapa lama anda perlu mengambilnya. Doktor anda mungkin akan mencadangkan kursus rawatan yang berikut:

Jangkitan mulut dan tekak:

Dewasa dan kanak-kanak berumur 2 tahun dan ke atas: 1/2 sudu penyukat penuh (2.5 mL) gel, disapu empat kali sehari selepas makan;

Kanak-kanak 6 bulan hingga 2 tahun: 1/4 sudu penyukat penuh (1.25 mL) gel, disapu empat kali sehari selepas makan. Bahagikan setiap dos kepada bahagian yang lebih kecil dan sapu pada kawasan terabit dengan menggunakan jari yang bersih.

Jangkitan perut dan usus dengan atau tanpa jangkitan mulut atau tekak: Dos bergantung pada berat badan.

Jangan melebihi 2 sudu penyukat penuh (10 mL) empat kali sehari.

- Berat badan ≤ 11.9 kg: 1/4 sudu penyukat penuh (1.25 mL) gel, disapu empat kali sehari;
- Berat badan dari 12-24.9kg: 1/2 sudu penyukat penuh (2.5 mL) gel, disapu empat kali sehari;
- Berat badan dari 25- 36.9 kg: 1 sudu penyukat penuh (5 mL) gel, disapu empat kali sehari;
- Berat badan dari 37- 49.9 kg: 1 1/2 sudu penyukat penuh (7.5 mL) gel, disapu empat kali sehari;
- Berat badan ≥ 50 kg: 2 sudu penyukat penuh (10 mL) gel, disapu empat kali sehari.

Gel ini tidak boleh ditelan serta-merta, tetapi perlu kemam di dalam mulut selama mungkin.

Jika bayi berusia 4-6 bulan ke bawah dan mempunyai tumbesaran yang perlahan, periksa dengan doktor anda sebelum menggunakan ubat ini.

-Bila perlu digunakan

Decozol Oral Gel haruslah diambil selepas makan.

-Berapa lama perlu digunakan

Rawatan ini perlu diteruskan selama sekurang-kurangnya seminggu selepas gejala telah hilang.

-Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda mengingatinya. Jangan menggandakan dos untuk mengganti dos yang tertinggal.

-Jika menggunakan berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengesyaki anda terlebih dos, sila berjumpa ahli farmasi atau doktor anda. Bawa bersama baki ubat yang tidak digunakan.

Semasa menggunakan Decozol Oral Gel

-Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda bersedia untuk memulakan penggunaan ubat baru yang lain, maklumkan ahli farmasi atau doktor anda yang anda sedang menggunakan Decozol Oral Gel.

Sila beritahu doktor anda sebelum menggunakan Decozol Oral Gel jika anda hamil, fikir anda mungkin hamil atau merancang untuk hamil. Anda masih boleh menggunakan Decozol Oral Gel jika doktor anda berpendapat anda perlu mengambilnya.

Minta nasihat doktor anda jika anda menyusu atau mungkin menyusu anak selama penggunaan ubat.

Manfaat Decozol Oral Gel perlu dinilai terhadap kesan yang mungkin dibawa kepada anak anda.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil Decozol Oral Gel untuk mengubati aduan-aduan yang lain, melainkan jika doktor anda benarkan.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda mengalami masalah hati, rujuk kepada doktor anda sebelum mengambil Decozol Oral Gel.

Kesan-kesan sampingan

Dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai sebarang kebimbangan terhadap kesan-kesan mengambil Decozol Oral Gel.

Kadang-kadang, Decozol Oral Gel boleh menyebabkan kesan sampingan berikut:

- ketidakselesaan gastrousus
- loya
- muntah

- cirit-birit
- reaksi alahan

Jika kesan sampingan menjadi semakin serius, atau jika anda mengalami kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Decozol Oral Gel

-Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C. Jauhi daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Lupuskan ubat selepas tarikh luput. Sila dapatkan nasihat ahli farmasi tentang cara pelupusan sebarang ubat yang tidak digunakan lagi.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Decozol Oral Gel adalah gel putih dengan perisa oren, boleh didapati dalam 10g dan 15g tiub aluminium.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif:
Miconazole 2%w/w

-Bahan tidak aktif:
Methylparaben, Propylparaben, Orange Flavour, Pregelatinised Potato Starch, Saccharin Sodium, Xanthan Gum, Propylene Glycol, Polysorbate 20 dan Purified Water.

-Nombor MAL:
MAL07010892AZ

**Pengilang dan Pemegang
Pendaftaran Produk**

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6,
Bandar Sultan Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP
24/4/2025

Nombor siri
NPRA(R2/1)250423/1465