

ELOSONE CREAM

Mometasone Furoate (0.1%w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan ELOSONE CREAM
2. Bagaimana ELOSONE CREAM berfungsi
3. Sebelum mengambil ELOSONE CREAM
4. Cara menggunakan ELOSONE CREAM
5. Semasa menggunakan ELOSONE CREAM
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan ELOSONE CREAM
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Risalah ini menjawab beberapa soalan lazim tentang ELOSONE CREAM. Ia tidak mengandungi semua maklumat yang tersedia. Ia juga tidak menggantikan tempat ahli farmasi atau doktor anda.

Semua ubat mempunyai risiko dan manfaat. Ahli farmasi atau doktor anda telah mempertimbangkan risiko anda mengambil ELOSONE CREAM berbanding manfaat yang mereka jangka untuk anda.

Simpan risalah ini bersama ubat. Anda mungkin perlu membacanya lagi.

Apakah kegunaan ELOSONE CREAM

ELOSONE CREAM digunakan untuk merawat penyakit kulit yang menunjukkan ciri radang/inflamasi. Masalah kulit ini responsif terhadap kortikosteroid.

Bagaimana ELOSONE CREAM berfungsi

ELOSONE CREAM mengandungi ubat yang dipanggil *Mometasone Furoate*. *Mometasone Furoate* ialah

kortikosteroid yang mempunyai tindakan anti-inflamatori, anti kegatalan dan pengecutan salur darah.

Jika anda mempunyai sebarang kemusykilan tentang pengambilan ubat ini, tanya ahli farmasi atau doktor anda.

Sebelum menggunakan ELOSONE CREAM

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan gunakan ELOSONE CREAM sekiranya:

- Anda alergi (hipersensitif) terhadap *Mometasone Furoate*, kortikosteroid yang lain atau apa-apa bahan dalam ubat ini.

-Sebelum menggunakan Elosone Cream

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda:

- Jika anda mempunyai jangkitan pada kulit anda dan nyatakan di kawasan yang dijangkiti.
- Jika anda menggunakan mana-mana produk kulit.

Kehamilan dan penyusuan:

- Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum penggunaan ubat ini sekiranya anda hamil atau menyusui.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda sedang mengambil apa-apa produk lain (misalnya ubat yang dibeli tanpa preskripsi doktor, ubat yang dipreskripsikan dan produk-produk herba).

Cara menggunakan ELOSONE CREAM

Selalu menggunakan ELOSONE CREAM seperti yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa banyak harus digunakan

Sapukan satu lapisan yang nipis pada bahagian kulit yang terjejas sekali sehari sebagaimana yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

-Bila perlu digunakan

Guna ubat apabila kawasan yang terjejas telah kering dan bersih.

-Berapa lama perlu digunakan

Gunakan sekali sehari sehingga luka sembuh atau sepanjang tempoh 3 minggu, yang mana lebih awal.

-Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk menggunakan krim pada masa yang betul, ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda mengingatnya. Jangan menggandakan dos untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Steroid boleh meresap melalui kulit anda. Terlalu banyak ELOSONE CREAM yang meresap melalui kulit anda boleh menghasilkan kesan sistemik seperti penindasan kelenjar adrenal, manifestasi sindrom Cushing, peningkatan paras gula dalam darah dan kehadiran gula dalam air kencing.

Jika anda mengambil terlalu banyak ubat ini, rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda. Bawa sebarang baki ubat bersama anda.

Semasa menggunakan ELOSONE CREAM

-Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda bersedia untuk memulakan penggunaan ubat baru yang lain, maklumkan ahli farmasi atau doktor anda yang anda sedang menggunakan ELOSONE CREAM.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan menggunakan lebih daripada dos yang disarankan melainkan dibenarkan oleh doktor anda.

Jangan gunakan di dalam mata.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Hentikan penggunaan jika berlaku kerengsaan atau sensitiviti.

Langkah berjaga-jaga yang sesuai perlu diambil semasa rawatan yang berpanjangan, apabila merawat kawasan permukaan badan yang luas, apabila menggunakan teknik oklusif dan apabila merawat bayi atau kanak-kanak (disebabkan nisbah jumlah luas permukaan kepada berat badan yang lebih besar).

Kesan-kesan sampingan

Sperti semua ubat, ELOSONE CREAM boleh mendatangkan kesan sampingan walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Reaksi advers tempatan yang dilaporkan termasuk sensasi badan yang tidak normal seperti kebas, kesemutan, atau pedih, gatal dan tanda-tanda penipisan kulit.

Jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan ini, walaupun yang tidak dinyatakan di dalam risalah ini, maklumkan doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan

Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan ELOSONE CREAM

-Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.
Tutup dengan rapat dan betul.
Lindungi daripada cahaya.
Jauhi daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Lupuskan ubat selepas tarikh luput.
Sila dapatkan nasihat ahli farmasi tentang cara pelupusan sebarang ubat yang tidak digunakan lagi.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna ELOSONE CREAM

ELOSONE CREAM adalah krim putih dan boleh didapati dalam 5g dan 15g tiub aluminium.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan-bahan aktif:
Mometasone Furoate 0.1%w/w

Bahan-bahan tidak aktif:
Propylparaben, Methylparaben, White Soft Paraffin, Liquid Paraffin, Propylene Glycol, Macrogol Cetostearyl Ether, Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate, Cetostearyl Alcohol, Phosphoric Acid 85% dan Purified Water.

-Nombor MAL: MAL07090928AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6,
Bandar Sultan Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

27/03/2023

Nombor siri:

BPFK(R4/1)160216/00037