

TEFIN TERBINAFINE HCL SPRAY 10mg/g

Terbinafine Hydrochloride (1% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g
2. Bagaimana Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g berfungsi
3. Sebelum menggunakan Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g
4. Cara menggunakan Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g
5. Semasa menggunakan Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Risalah ini menjawab beberapa soalan lazim tentang Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g. Ia tidak mengandungi semua maklumat yang tersedia. Ia juga tidak menggantikan tempat ahli farmasi atau doktor anda.

Semua ubat mempunyai risiko dan manfaat. Ahli farmasi atau doktor anda telah mempertimbangkan risiko anda mengambil Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g berbanding manfaat yang mereka jangka untuk anda.

Simpan risalah ini bersama ubat.

Anda mungkin perlu membacanya lagi.

Apakah kegunaan Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g
Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g digunakan untuk merawat jangkitan kulat pada kulit bagi pelbagai jenis kurap di kaki atlet, gatal jock dan ruam merah berbentuk bulat rata didapati pada badan. Ia juga digunakan untuk melawan dermatofit, yis dan kulat.

Bagaimana Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g berfungsi

Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g mengandungi bahan aktif Terbinafine Hydrochloride (1% w/w).

Terbinafine Hydrochloride ialah ejen yang bertindak terhadap pelbagai kulat.

Tanya ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang ubat ini.

Sebelum menggunakan Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g sekiranya:

- Anda alah (hipersensitif) kepada Terbinafine Hydrochloride atau kepada mana-mana bahan lain di dalam ubat ini.

Kehamilan dan penyusuan badan:

- Kegunaan Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g untuk wanita hamil dan wanita yang cuba hamil mesti berunding dengan doktor atau ahli farmasi untuk nasihat dan penyeliaan lanjut doktor.
- Pada trimester pertama kehamilan, Terbinafine Hydrochloride hanya boleh digunakan apabila dijangka bermanfaat untuk ibu tersebut. Tidak diketahui sama ada kandungan Terbinafine Hydrochloride terdapat dalam susu ibu atau mempunyai kesan bahaya kepada bayi.
- Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum pengambilan ubat ini sekiranya anda hamil atau menyusui badan.

-Jika menggunakan ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda tentang semua ubat-ubatan yang lain dan produk kulit yang anda guna, termasuk ubat-ubatan yang perlukan preskripsi dan tidak perlukan preskripsi, vitamin,

makanan tambahan herba, dan kosmetik. Tiada interaksi ubat dengan Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g telah dilaporkan.

Cara menggunakan Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g

-Berapa banyak harus digunakan

Jangan berikan ubat ini kepada kanak-kanak yang berumur bawah 2 tahun.

Rujuk kepada doktor anda sekiranya anda ingin memberikan ubat ini kepada kanak-kanak yang berumur bawah 2 tahun.

Jika cara penggunaan Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g telah ditetapkan oleh doktor anda, sila ikut arahan doktor.

Jika anda membeli produk ini tanpa arahan cara penggunaan daripada doktor atau ahli farmasi, anda boleh mengikut cara penggunaan seperti berikut:

- Goncang botol ulang-alik dengan membalikkan botol sebelum digunakan.
- Cuci and keringkan bahagian jangkitan kulat. Sembur Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g di sekitar bahagian yang terjangkit dengan berhati-hati, sekali sehari.

-Bila perlu digunakan

Satu kali sehari selepas bersihkan dan keringkan bahagian jangkitan. Penggunaan yang berterusan diperlukan untuk keberkesanan.

-Berapa lama perlu digunakan

Rawatan perlu digunakan sekurang-kurangnya selama 2 minggu berterusan walaupun selepas kehilangan tanda-tanda jangkitan bagi mengelakkan jangkitan semula.

Sila hubungi doktor anda jika gejala tidak bertambah pulih dalam 4 minggu (kaki atlet) and 2 minggu (gatal jock).

TEFIN TERBINAFINE HCL SPRAY 10mg/g

Terbinafine Hydrochloride (1% w/w)

-Jika terlupa menggunakan

Guna Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g dengan segera dan kemudian terus rawatan anda seperti biasa.

-Jika menggunakan berlebihan (terlebih dos)

Tiada maklumat yang berkenaan dengan penggunaan yang berlebihan pada manusia dilaporkan.

Semasa menggunakan Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g

-Perkara yang perlu dilakukan

Untuk lebih berkesan bagi rawatan jangkitan kulat, anda boleh mengikuti langkah-langkah mudah bantu diri seperti berikut:

- Anda tidak digalakkan menggaru walaupun terasa kegatalan di bahagian jangkitan. Menggaru akan mencederakan permukaan kulit dan menyebabkan jangkitan merebak ke bahagian lain.
- Jaga kebersihan di bahagian jangkitan terutama bahagian lipatan dan kaki.
- Pastikan bahagian jangkitan sentiasa kering, tetapi kurangkan geseran pada permukaan kulit.
- Jangan berkongsi tuala, tikar mandi, dan lain-lain dengan orang lain kerana anda boleh menyebarkan jangkitan kepada mereka.
- Pastikan anda membasuh tangan selepas merawat jangkitan untuk mengelakkan ia daripada merebak.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g bagi kegunaan luaran sahaja. Produk ini tidak boleh dimakan. Jika anda tidak sengaja termakan, sila hubungi doktor dengan segera atau hubungi Jabatan Kemalangan dan Kecemasan hospital terdekat. Jika anda tidak sengaja terkena semburan ubat di mata atau mulut, bilas segera dengan air dan hubungi doktor anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika iritasi atau sensitiviti berlaku, rawatan perlu dihentikan.

Kesan-kesan sampingan

Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Seperti semua ubat-ubatan, sesetengah orang mungkin alah kepada ubat ini. Jika anda mengalami reaksi alahan, berhenti menggunakan Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g dan sila hubungi doktor anda dengan segera atau hubungi Jabatan Kemalangan dan Kecemasan hospital terdekat. Tanda-tanda alahan termasuk:

- Ruam.
- Kesukaran bernafas.
- Bengkak muka, lidah, atau tekak.

Selepas anda menggunakan ubat ini, anda mungkin mengalami:

- Gatal-gatal, lepuh, bengkak, kepedihan, kemerahan, gegata atau kulit mengelupas.

Jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan ini, walaupun yang tidak dinyatakan di dalam risalah ini, maklumkan doktor atau ahli farmasi anda dengan segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g

-Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C. Jauhi daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Lupuskan ubat selepas tarikh luput. Sila dapatkan nasihat ahli

farmasi tentang cara pelupusan sebarang ubat yang tidak digunakan lagi.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna

Tefin Terbinafine HCl Spray 10mg/g ialah cecair tanpa warna. Ia boleh didapati dalam botol 15ml.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan-bahan aktif:
Terbinafine Hydrochloride
1% w/w.

-Bahan-bahan tidak aktif:
Alcohol (25% w/w), Propylene Glycol, Macrogol Cetostearyl Ether, Purified Water.

-Nombor MAL:

MAL18086095X

Pengilang

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6,
Bandar Sultan Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk:

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6,
Bandar Sultan Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

19/10/2023

Nombor siri:

NPRA(R2/1)231018/1161