

COUNTERPAIN PATCH AROMA R

Glycol Salicylate 5.0% w/w, l-Menthol 1.5% w/w, Tocopherol Acetate 2.0% w/w, Glycyrrhetic Acid 0.18% w/w

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan COUNTERPAIN PATCH AROMA R
2. Bagaimana COUNTERPAIN PATCH AROMA R berfungsi
3. Sebelum menggunakan COUNTERPAIN PATCH AROMA R
4. Cara menggunakan COUNTERPAIN PATCH AROMA R
5. Semasa menggunakan COUNTERPAIN PATCH AROMA R
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan COUNTERPAIN PATCH AROMA R
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan COUNTERPAIN PATCH AROMA R

COUNTERPAIN PATCH AROMA R digunakan untuk melegakan sengal-sengal dan kesakitan yang berkaitan dengan sakit pinggang, lebam, terseliuh, bahu tegang, sakit bahu, sakit belakang, otot letih.

Bagaimana COUNTERPAIN PATCH AROMA R berfungsi

COUNTERPAIN PATCH AROMA R mengandungi bahan-bahan aktif Glycol Salicylate 5.0% w/w, l-Menthol 1.5% w/w, Tocopherol Acetate 2.0% w/w dan Glycyrrhetic Acid 0.18% w/w.

Glycol Salicylate ialah derivatif salicylic acid digunakan sama seperti methyl salicylate dalam persediaan rubefacient topikal untuk melegakan sakit otot dan reumatik.

l-Menthol adalah sejenis bahan organik yang wujud secara semula jadi dalam tumbuh-tumbuhan pudina, tetapi ia juga boleh dibuat secara sintetik.

Apabila menthol digunakan pada kulit, ia mengembangkan saluran darah dan menyebabkan rasa sejuk diikuti oleh kesan analgesik.

Tocopherol Acetate adalah antioksidan yang kuat yang memainkan peranan dalam fungsi imun, memperbaiki DNA, dan penstabilan sel-membran.

Glycyrrhetic Acid mempunyai sifat antiosidan dan anti-radang yang menjadikannya sesuai dalam aplikasi dermatologi.

Sebelum menggunakan COUNTERPAIN PATCH AROMA R

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan COUNTERPAIN PATCH AROMA R:

- Jika anda alah kepada produk untuk kegunaan luaran atau mana-mana bahan aktif yang terkandung di dalam ubat ini.

- Sebelum mula menggunakan COUNTERPAIN PATCH AROMA R

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda:

- Jika anda alah kepada Glycol Salicylate atau l-Menthol atau Tocopherol Acetate atau Glycyrrhetic Acid atau salisilat lain (contohnya Salsalate); atau jika anda mempunyai sebarang alahan lain.

Kehamilan dan penyusuan badan:

- Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum pengambilan ubat ini sekiranya anda hamil atau menyusu badan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda sedang mengambil apa-apa ubat lain (misalnya ubat yang dibeli tanpa preskripsi doktor, ubat yang dipreskripsikan dan produk-produk herba).

Cara menggunakan COUNTERPAIN PATCH AROMA R



Pastikan tempat yang terjejas adalah bersih dan kering. Tanggalkan filem

yang lebih kecil dan lekatkan koyok yang terdedah pada tempat yang terjejas.



Lekatkan bahagian koyok yang selebihnya dengan menanggalkan

filem. Boleh digunakan sehingga 4 ke 6 jam.

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak yang berumur melebihi 7 tahun: Gunakan beberapa kali sehari (maksimum 4 kali/hari).

Rujuk kepada doktor anda sekiranya anda ingin menggunakan ubat ini pada kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah.

Jangan gunakan pada kanak-kanak yang berumur bawah 7 tahun.

Sebelum guna, lekatkan sebahagian kecil koyok pada kulit bawah lengan untuk pastikan agar tiada tanda-tanda seperti letusan, kemerahan, kegatalan dan ruam berlaku.

- Bila perlu digunakan

Apabila tanda-tanda sakit otot atau sendi muncul.

- Berapa lama perlu digunakan

Beritahu doktor anda jika kesakitan anda tidak berkurangan selepas 5 hingga 6 hari penggunaan.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda mengingatinya.

Jika mengguna berlebihan (terlebi dos)

Tiada kes berkaitan dos berlebihan telah dilaporkan. Namun, jika dos berlebihan berlaku disusuli dengan tanda-tanda klinikal yang jelas, hentikan penggunaan dan rujuk doktor atau ahli farmasi.

**Semasa menggunakan
COUNTERPAIN PATCH AROMA R**

- Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda ingin mula menggunakan ubat baru yang lain, maklumkan ahli farmasi atau doktor anda yang anda sedang menggunakan COUNTERPAIN PATCH AROMA R.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan ubat ini untuk kulit yang cedera atau gatal-gatal (e.g. luka, ruam dan terjemur).

Jangan gunakan ubat ini di sekeliling mata, selaput berlendir, atau ekzema.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika kulit anda sensitif, elakkan penggunaan berulang-kali pada bahagian yang sama.

Kesan-kesan sampingan

COUNTERPAIN PATCH AROMA R mungkin mempunyai kesan sampingan yang tidak diingini pada sesetengah orang.

Berhenti menggunakan ubat ini dan beritahu doktor anda dengan segera jika ada antara kesan-kesan sampingan berikut berlaku:

- Ruam
- Kegatalan

- Kemerahan
- Letusan

Jika anda mendapati kesan lain yang tidak disenaraikan di atas, hubungi doktor atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

**Cara penyimpanan dan pelupusan
COUNTERPAIN PATCH AROMA R**

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.
Simpan di tempat yang terlindung daripada cahaya.
Simpan jauh daripada jangkauan kanak-kanak.
Selepas dibuka, lipat bahagian yang terbuka untuk simpanan.

- Pelupusan

Lupuskan ubat selepas tarikh luput.
Sila dapatkan nasihat ahli farmasi tentang cara pelupusan sebarang ubat yang tidak digunakan lagi.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

COUNTERPAIN PATCH AROMA R adalah plaster bersaiz 10cm × 7cm.

COUNTERPAIN PATCH AROMA R boleh didapati dalam 4 patch sekotak.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Setiap plaster mengandungi 5.0% w/w Glycol Salicylate, 1.5% w/w l-Menthol, 2.0% w/w Tocopherol Acetate dan 0.18% w/w Glycyrrhetic Acid.

Bahan tidak aktif:

Styrene, Isoprene dan Styrene Block Copolymer, Polyisobutylene, Liquid Paraffin, Ester Gum, 2-Mercaptobenzimidazole,

Dibutylhydroxytoluene dan Fragrance (Rose Bouquet)

- Nombor MAL

MALXXXXXXX

Pengilang

TOKUHON Corporation, Saitama, JAPAN

Pemegang Pendaftaran Produk

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6,
Bandar Sultan Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

-15/06/2023

Nombor Siri

NPRA (R2) 23/095