

LAXSTOO 800MG/5ML

Magnesium Hydroxide (800mg/5ml)

ORAL

SUSPENSION

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan LAXSTOO
2. Bagaimana LAXSTOO berfungsi
3. Sebelum mengambil LAXSTOO
4. Cara menggunakan LAXSTOO
5. Semasa menggunakan LAXSTOO
6. Kesan- kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan LAXSTOO
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Risalah ini menjawab beberapa soalan lazim tentang LAXSTOO. Ia tidak mengandungi semua maklumat yang tersedia. Ia juga tidak menggantikan tempat ahli farmasi atau doktor anda.

Semua ubat mempunyai risiko dan manfaat. Ahli farmasi atau doktor anda telah mempertimbangkan risiko anda mengambil LAXSTOO berbanding manfaat yang mereka jangka untuk anda.

Simpan risalah ini bersama ubat.

Anda mungkin perlu membacanya lagi.

Apakah kegunaan LAXSTOO

LAXSTOO digunakan untuk melegakan dari masalah sembelit sekali-sekala.

Bagaimana LAXSTOO berfungsi

Magnesium Hidroksida dalam LAXSTOO berfungsi dengan menarik air ke dalam usus, suatu kesan yang membantu untuk menyebabkan pergerakan usus.

Tanya ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang ubat ini.

Sebelum mengambil LAXSTOO

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil LAXSTOO sekiranya anda:

- mengalami masalah buah pinggang.
- Mengalami sakit di bahagian perut, berasa loya, muntah-muntah, perubahan tabiat membuang air besar lebih dari 2 minggu
- mengamalkan diet terhadap Magnesium, menggunakan pelawas lebih dari seminggu atau pendarahan rektum.
- mempunyai sejarah hipersensitif kepada Magnesium Hydroxide atau komponen-komponen lain dalam produk.

-Sebelum mula mengambil

Kehamilan dan penyusuan badan:

Penggunaan semasa hamil dan sedang menyusu sepatutnya dielakkan melainkan dengan nasihat doktor. Tanya doktor anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil ubat-ubatan.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda sedang mengambil ubat lain, termasuk yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan. Interaksi boleh diminimumkan dengan menjarakkan Magnesium Hydroxide dan sebarang ubat lain selama 2-3 jam.

Cara menggunakan LAXSTOO

-Berapa banyak harus digunakan

Kanak-kanak < 2 tahun:
Dapatkan nasihat doktor.

2-5 tahun:

5ml (1 sudu teh) atau seperti yang diarahkan oleh doctor.

6-11 tahun:

5ml hingga 10ml (1 hingga 2 sudu teh).

≥12 tahun dan orang dewasa:

10ml hingga 20ml (2 hingga 4 sudu teh).

-Bila perlu digunakan

LAXSTOO patut diambil sekali sehari, sebaiknya diambil sebelum tidur.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaa ubat ini untuk tempoh tidak melebihi 3 hari melainkan disyor oleh doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Gejala kerengsaan gastrousus dan cirit-birit berair, penurunan tahap Magnesium dalam darah (gejala yang termasuk loya, muntah, memerah, dahaga, tekanan darah rendah, mengantuk, kekeliruan, kehilangan refleks tendon, otot lemah, kesukaran pernafasan, degupan jantung tidak sekata, koma dan degupan jantung berhenti secara tiba-tiba.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa.

Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan LAXSTOO

-Perkara yang perlu dilakukan

Goncang botol sebelum guna.

Minum segelas penuh air (8 oz) untuk setiap dos. Jika anda akan mula mengambil ubat baru yang lain, maklumkan ahli farmasi atau doktor anda yang anda sedang mengambil LAXSTOO.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil melebihi dos yang dinyatakan.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhenti menggunakan ubat ini jika anda mempunyai pendarahan rektum atau tiada pergerakan usus selepas 6 jam mengambil produk ini.

Gejala ini boleh menjadi tanda kepada satu keadaan serius.

Kesan-kesan sampingan

Mungkin menyebabkan cirit-birit, sesuatu kesan bergantung kepada dos dan peningkatan tahap Magnesium dalam darah mungkin berlaku, biasanya pada orang dengan kerosakan buah pinggang.

Sangat jarang, kesan serius yang berlaku seperti ketidakseimbangan elektrolit, kekeliruan, degupan jantung tidak sekata, kekejangan otot, dan keletihan dan rasa lemah atau letih luar biasa.

Lain-lain kesan sampingan termasuk kembung, loya, pembentukan gas dan selalu rasa haus.

Jika anda mengalami kesan sampingan maklumkan doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan LAXSTOO

-Penyimpanan

Simpan pada suhu kurang daripada 30°C. Simpan jauh daripada jangkauan kanak-kanak. Pastikan bekas sentiasa ditutup rapat dan di tempat yang kering. Jangan dibekukan.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

LAXSTOO adalah cecair likat berwarna putih kekuningan legap dengan perasa raspberi dalam botol plastik 100ml.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif:
Setiap 5ml mengandungi 800mg *Magnesium Hydroxide*.

-Bahan-bahan tidak aktif:
Xylitol, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Potassium Citrate, Raspberry flavour dan *Purified water*.

-Nombor MAL:
MAL11085006X

Pengilang:

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6,
Bandar Baru Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk:

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6,
Bandar Baru Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP :
06/12/2022

Nombor Siri:
NPRA(R4/1)281118/00359