

COUNTERPAIN PATCH HOT

Glycol Salicylate 2.0% w/w, l-Menthol 1.0% w/w, 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl Nonylic Acide Amide 0.013% w/w, Tocopherol Acetate 0.8% w/w

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Counterpain Patch Hot
2. Bagaimana Counterpain Patch Hot berfungsi
3. Sebelum menggunakan Counterpain Patch Hot
4. Cara menggunakan Counterpain Patch Hot
5. Semasa menggunakan Counterpain Patch Hot
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Counterpain Patch Hot
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Risalah ini menjawab beberapa soalan lazim tentang Counterpain Patch Hot. Ia tidak mengandungi semua maklumat yang tersedia. Ia juga tidak menggantikan tempat ahli farmasi atau doktor anda.

Semua ubat mempunyai risiko dan manfaat. Ahli farmasi atau doktor anda telah mempertimbangkan risiko anda mengambil Counterpain Patch Hot berbanding manfaat yang mereka jangka untuk anda.

Jika anda mempunyai sebarang kemusykilan tentang pengambilan ubat ini, tanya ahli farmasi atau doktor anda.

Simpan risalah ini bersama ubat. Anda mungkin perlu membacanya lagi.

Apakah kegunaan Counterpain Patch Hot

Counterpain Patch Hot digunakan untuk melegakan sengal-sengal dan kesakitan yang berkaitan dengan sakit pinggang, lebam, terseliuh, bahu tegang, arthralgia, sakit otot, otot letih, bengkak disebabkan kesejukan, sakit tulang patah.

Bagaimana Counterpain Patch Hot berfungsi

Counterpain Patch Hot mengandungi bahan-bahan aktif Glycol Salicylate 2.0% w/w, l-Menthol 1.0% w/w, 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl Nonylic Acide Amide 0.013% w/w dan Tocopherol Acetate (Vitamin E) 0.8% w/w.

Glycol Salicylate ialah derivatif salicylic acid digunakan sama seperti methyl salicylate dalam persediaan rubefacient topikal untuk melegakan sakit otot dan reumatik.

l-Menthol adalah sejenis bahan organik yang wujud secara semula jadi dalam tumbuh-tumbuhan pudina, tetapi ia juga boleh dibuat secara sintetik. Apabila menthol digunakan pada kulit, ia mengembangkan saluran darah dan menyebabkan rasa sejuk diikuti oleh kesan analgesik.

4 - Hydroxy - 3 - methoxybenzyl Nonyl Acide Amide memberikan rasa panas pada kulit. Ia merangsang tempat yang terjejas dan berkesan dalam membantu melancarkan peredaran darah.

Tocopherol Acetate adalah antioksidan yang kuat yang memainkan peranan dalam fungsi imun, memperbaiki DNA, dan penstabilan sel-membran.

Sebelum mengguna Counterpain Patch Hot

- Bila tidak boleh menggunakannya

Jangan mengguna Counterpain Patch Hot:

- Jika anda alah kepada produk untuk kegunaan luaran atau mana-mana bahan aktif yang terkandung di dalam ubat ini.

- Sebelum mula menggunakannya

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda:

- Jika anda alah kepada Glycol Salicylate atau l-Menthol atau 4-Hydroxy - 3 - menthoxybenzyl Nonylic Acide Amide atau Tocopherol Acetate atau salisilat lain (contohnya salsalate); atau jika anda mempunyai sebarang alahan lain

Kehamilan dan penyusuan badan

- Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum pengambilan ubat ini sekiranya anda hamil atau menyusu badan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda sedang mengambil apa-apa ubat lain (misalnya ubat yang dibeli tanpa preskripsi doktor, ubat yang dipreskripsikan dan produk-produk herba).

Cara menggunakan Counterpain Patch Hot



Pastikan tempat yang terjejas adalah bersih dan kering.

Tanggalkan filem yang lebih kecil dan lekatkan koyok yang terdedah pada tempat yang terjejas.



Lekatkan bahagian koyok yang selebihnya dengan

menanggalkan filem. Boleh digunakan sehingga 4 ke 6 jam.

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak yang berumur melebihi 13 tahun: Gunakan beberapa kali sehari (maksimum 4 kali/hari).

Jangan gunakan pada kanak-kanak yang berumur bawah 13 tahun.

Sebelum guna, lekatkan sebahagian kecil ubat ini pada kulit bawah lengan untuk pastikan agar tiada tanda-tanda seperti letusan, kemerahan, kegatalan dan ruam berlaku.

- Bila perlu digunakan

Apabila tanda-tanda sakit otot atau sendi muncul.

- Berapa lama perlu digunakan

Beritahu doktor anda jika kesakitan anda tidak berkurangan selepas 5 hingga 6 hari penggunaan.

- Jika terlupa menggunakannya

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda mengingatinya.

- Jika menggunakan berlebihan (terlebih dos)

Tiada kes berkaitan dos berlebihan telah dilaporkan. Namun, jika dos berlebihan berlaku disusuli dengan tanda-tanda klinikal yang jelas, hentikan penggunaan dan rujuk doktor atau ahli farmasi.

Semasa menggunakan Counterpain Patch Hot

- Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda ingin mula menggunakan ubat baru yang lain, maklumkan ahli farmasi atau doktor anda yang anda sedang menggunakan Counterpain Patch Hot.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan ubat ini untuk kulit yang cedera atau gatal-gatal (e.g. luka, ruam dan terjemur).

Jangan gunakan ubat ini di sekeliling mata, selaput berlendir, atau ekzema.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika kulit anda sensitif, elakkan penggunaan berulang-kali pada bahagian yang sama.

Kesan-kesan sampingan

Counterpain Patch Hot mungkin mempunyai kesan sampingan yang tidak diingini pada sesetengah orang.

Berhenti menggunakan ubat ini dan beritahu doktor anda dengan segera jika ada antara kesan-kesan sampingan berikut berlaku:

- Ruam
- Kegatalan
- Kemerahan
- Letusan

Jika anda mendapati kesan lain yang tidak disenaraikan di atas, hubungi doktor atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumers → Reporting).

Cara penyimpanan dan pelupusan Counterpain Patch Hot

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.

Simpan di tempat yang terlindung daripada cahaya.

Simpan jauh daripada jangkauan kanak-kanak.

Selepas dibuka, lipat bahagian yang terbuka untuk simpanan.

- Pelupusan

Lupuskan ubat selepas tarikh luput. Sila dapatkan nasihat ahli farmasi tentang cara pelupusan sebarang ubat yang tidak digunakan lagi.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna

Counterpain Patch Hot adalah plaster bersaiz 10cm × 7cm yang berwarna antara putih hingga kuning cair dengan aroma menthol.

Counterpain Patch Hot boleh didapati dalam 4 patch sekotak.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan-bahan aktif:

Setiap plaster mengandungi 2.0% w/w Glycol Salicylate, 1.0% w/w 1-Menthol, 0.013% w/w 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl Nonylic Acide Amide dan 0.8% w/w Tocopherol Acetate (Vitamin E).

Bahan-bahan tidak aktif:

Styrene-isoprene-styrene block copolymer, Polyisobutylene, Liquid paraffin, Macrogol 400, Ester gum, Titanium oxide, Silicon dioxide, 2-Mercaptobenzimidazole, and Dibutylhydroxytoluene.

- Nombor MAL

MAL15085067X

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

- Pengilang

TOKUHON Corporation, Saitama, JAPAN.

- Pemegang Pendaftaran Produk

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.
Lot 10, Jalan Sultan Mohd. 6,
Bandar Sultan Suleiman,
42000 Port Klang, Selangor,
MALAYSIA.

Tarikh kemaskini RiMUP

14/01/2025

Nombor Siri:

NPRA(R2/1)250107/1405