

QURIC EFFERVESCENT GRANULES

Sodium Bicarbonate/ Sodium Citrate Anhydrous/ Anhydrous Citric Acid/ Tartaric Acid (1.76g/ 630mg/720mg/890mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan QURIC
2. Bagaimana QURIC berfungsi
3. Sebelum mengambil QURIC
4. Cara menggunakan QURIC
5. Semasa menggunakan QURIC
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan QURIC
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan QURIC

- Melegakan ketidakselesaan akibat UTI ringan
- Membantu melegakan rasa sakit dan pedih ketika buang air kecil
- Meningkatkan tindakan antibiotik tertentu terutamanya beberapa sulfonamida
- Sebagai pengalkali air kencing untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout dan membantu melarutkan batu karang asid urik

Bagaimana QURIC berfungsi

QURIC berfungsi sebagai pengalkali air kencing yang meningkatkan tahap pH air kencing yang menggalakkan pembubaran batu asid urik dan melegakan simptom hiperasiditi.

Sebelum mengambil QURIC

- Bila tidak boleh mengambil

Jika anda alah kepada citric acid, sodium bicarbonate, sodium citrate, sodium carbonate atau mana-mana bahan-bahan lain QURIC .

Jika anda mempunyai gejala yang teruk atau air kencing keruh.

Jika anda hamil atau menyusui bayi.
Jika anda menghidap penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kencing manis atau penyakit buah pinggang.
Jika diet anda hanya membolehkan anda mempunyai sedikit garam.

- Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor anda jika anda alah kepada mana-mana ubat-ubatan lain, makanan, pewarna atau bahan pengawet.
Beritahu doktor anda jika anda mengandung atau merancang untuk hamil.

Doktor anda akan membincangkan tentang risiko dan faedah mengambil QURIC semasa mengandung.
Beritahu doktor anda jika anda sedang menyusukan atau ingin menyusukan bayi.
Beritahu doktor anda jika anda mempunyai atau telah mempunyai mana-mana masalah perubatan yang berikut:
-ulser peptik
-masalah buah pinggang
- mengambil antibiotik quinolone

Beritahu doktor anda jika anda dalam diet natrium terhad.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

QURIC harus dielakkan semasa mengambil antacid, ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin dan salicylates.
Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan QURIC

-Berapa banyak harus digunakan

Anda perlu menyemak dengan profesional penjagaan kesihatan anda jika anda tidak pasti bagaimana untuk mengambil QURIC .

Dos biasa ialah 4-8g (1 hingga 2 sachet) dilarutkan dalam air sejuk empat kali sehari

-Bila perlu digunakan

Sachet diambil 4 kali sehari pada jarak waktu tetap sepanjang hari.

- Berapa lama perlu digunakan

Terus mengambil QURIC selama yang profesional penjagaan kesihatan anda memberitahu anda.

Rawatan panjang dengan QURIC akan bergantung kepada berapa cepat gejala anda bertambah baik.

-Jika terlupa menggunakan

Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa. Jika anda mempunyai soalan lanjut mengenai penggunaan produk ini, sila tanya profesional penjagaan kesihatan anda.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Pengambilan garam natrium yang berlebihan boleh menyebabkan gangguan elektrolit yang serius. Pengambilan natrium sitrat yang berlebihan akan mengganggu mukosa gastrousus & boleh menyebabkan cirit-birit, loya, muntah-muntah, bengkak dan sawan.

Jika anda mengambil terlalu banyak QURIC secara tidak sengaja, anda harus berunding

QURIC EFFERVESCENT GRANULES

Sodium Bicarbonate/ Sodium Citrate Anhydrous/ Anhydrous Citric Acid/ Tartaric Acid (1.76g/ 630mg/720mg/890mg)

dengan profesional penjagaan kesihatan atau pergi ke hospital secepat mungkin.

Semasa menggunakan

QURIC

- Perkara yang perlu dilakukan

Minum air yang banyak. Kencing dengan kerap. Jangan berlengah ke tandas. Mengelap dari depan ke belakang selepas membuang air besar.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Tidak mengambil QURIC untuk merawat sebarang aduan lain melainkan profesional penjagaan kesihatan anda memberitahu anda untuk berbuat demikian.

Jangan berikan QURIC kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda.

Jangan berhenti mengambil QURIC, atau guna dos yang lebih rendah, sila semak dengan profesional penjagaan kesihatan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika gejala berterusan selepas rawatan 48 jam selesai, sila berunding dengan profesional penjagaan kesihatan anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, QURIC boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mendapat mereka. Mengambil QURIC boleh menyebabkan kembung perut. Jika anda notis ini atau dapat apa-apa kesan lain, sila berhenti mengambil produk ini dan memberitahu penjagaan kesihatan anda profesional atau ahli farmasi.

Pengambilan QURIC yang berlebihan boleh menyebabkan cirit-birit, loya, muntah dan membawa kesan laksatif

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan QURIC

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30C. Melindungi dari kelembapan. Jauhkan dari jangkauan kanak-kanak. Jangan gunakan QURIC selepas tarikh luput yang dinyatakan pada sachet tersebut. Tarikh luput merujuk kepada hari yang terakhir bulan tersebut.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak Diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Serbuk berwarna putih. yang larut dalam 200 ml air memberikan larutan jernih tidak berwarna.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

Sodium Bicarbonate, Sodium Citrate Anhydrous, Anhydrous Citric Acid, Tartaric Acid

- Bahan tidak aktif:

Flavor Lemon Dry (fresh lemon lime)

-Nombor MAL: MAL25046045XC

Pengilang

Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd.
19,20 and 21, Sector-6A, IIE,
SIDCUL, Ranipur, Haridwar-
249403, Uttarakhand, India

Pemegang Pendaftaran Produk

Regulatory Dynamic Enterprise
12 Jalan Tekukur 2, Bandar Puchong
Jaya, 47170 Puchong, Selangor

Tarikh kemaskini RiMUP

26/03/2026

Nombor Siri

NPRA (R2)24/175