

EDMARK MED RUB BALM

Methyl Salicylate 23.5%w/w, Menthol 10%w/w, Camphor 5%w/w

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Edmark Med Rub Balm
2. Bagaimana Edmark Med Rub Balm berfungsi
3. Sebelum menggunakan Edmark Med Rub Balm
4. Cara menggunakan Edmark Med Rub Balm
5. Semasa menggunakan Edmark Med Rub Balm
6. Kesan- kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Edmark Med Rub Balm
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Edmark Med Rub Balm

Ia digunakan untuk melegakan sakit otot, sakit reumatik dan sakit urat.

Bagaimana Edmark Med Rub Balm berfungsi

Methyl salicylate, *menthol* dan *camphor* adalah analgesik luaran yang merangsang rasa kehangatan dan/ atau sejuk. Ini menghasilkan tindakbalas yang merengsa yang memberikan kelegaan sementara sakit ringan pada otot dan sendi yang berkaitan dengan sakit belakang, artritis, ketegangan dan seliuh.

Sebelum menggunakan Edmark Med Rub Balm

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna sekiranya anda alah terhadap sebarang bahan kandungan lain dalam Edmark Med Rub Balm.

- Sebelum menggunakan

Pada mulanya sapu kuantiti yang kecil pada kawasan kulit yang terhad dan memerhati sama ada ketidakselesaan atau gatal berlaku sebelum sapu pada kawasan kulit yang lebih besar. Jika iritasi kulit berlaku, sila berhenti gunakannya.

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi tentang ubat lain yang anda sedang ambil.

Penyapuan yang berlebihan oleh pesakit yang mengambil warfarin mungkin meningkatkan risiko perdarahan.

Cara menggunakan Edmark Med Rub Balm

- Berapa banyak harus digunakan

Sapu pada bahagian terabit 2 hingga 3 kali sehari.

Untuk kegunaan luar sahaja. Tidak boleh dimakan.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Teruskan menggunakannya seperti yang diarahkan oleh doktor anda atau ikut arahan pada label pek.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Keracunan salisilat kronik ringan atau salisilisme biasanya berlaku hanya selepas penggunaan berulang kali dengan dos yang besar. Salisilisme juga boleh berlaku berikutan penggunaan salisilat topikal yang berlebihan. Gejala termasuk pening, tinitus, pekak, sumpah, mual dan muntah, sakit kepala dan kekeliruan. Ini boleh dikawal dengan mengurangkan dos.

Semasa menggunakan Edmark Med Rub Balm

- Perkara yang perlu dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Ubat ini tidak sesuai untuk bayi di bawah umur 2 tahun dan perhatian perlu diberikan kepada kanak- kanak berumur 2 tahun ke atas apabila menggunakannya. Sapu ubat yang mengandungi camphor pada hidung kanak- kanak adalah berbahaya kerana boleh menyebabkan pengsan.

Elakkan bersentuhan dengan mata dan membran mukus. Jangan sapukan pada luka atau kulit yang rosak. Elakkan penggunaan yang berlebihan semasa kehamilan dan penyusuan. Jangan gunakan secara meluas pada bahagian badan atau membalut.

Produk ini mengandungi *methyl salicylate* dan apabila digunakan pada kulit, boleh meresap masuk ke dalam saluran darah. Untuk pesakit yang mengambil warfarin, penggunaan berlebihan pada kawasan kulit untuk sakit otot atau sendi boleh meningkatkan potensi pendarahan.

Tanya penjaga perubatan kesihatan anda apa-apa soalan yang anda mungkin ada tentang bagaimana untuk menggunakan Edmark Med Rub Balm.

Kesan-kesan sampingan

Iritasi kulit, kemerahan, bengkak, rasa pedih berlaku. Reaksi buruk jarang berlaku, symptom pening, loya boleh berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Edmark Med Rub Balm

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya. Jauhkan daripada capaian kanak- kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Product Description

- Rupa dan warna produk

Salap yang berwarna putih dan berbau istimewa.

Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Methyl salicylate, menthol, camphor

- Bahan tidak aktif
Nutmeg oil, eucalyptus oil, hard paraffin, white soft paraffin, microcrystalline wax

- Nombor MAL:

MALXXXXXXC

Pemegang Pendaftaran Produk

Edmark Industries Sdn.Bhd
No 20, Jalan BK 1/13,
Kinrara Industrial Park,
47180 Puchong, Selangor, Malaysia.

Pengilang

Wellmetech Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.
Lot 8058, Kota Samarahan Industrial Park,
94300 Samarahan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

21/06/2023

Nombor Siri

NPRA(R2)23/088