

MEPRESIN 20 (OLMESARTAN MEDOXOMIL 20MG TABLET)

MEPRESIN 40 (OLMESARTAN MEDOXOMIL 40MG TABLET)

Olmesartan Medoxomil 20mg/40mg Tablet

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan MEPRESIN
2. Bagaimana MEPRESIN berfungsi
3. Sebelum mengambil MEPRESIN
4. Cara menggunakan MEPRESIN
5. Semasa menggunakan MEPRESIN
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan MEPRESIN
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan MEPRESIN

Olmesartan Medoxomil digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi *essential*. 'Essential' bermaksud tekanan darah tinggi yang tidak disebabkan oleh keadaan lain.

Bagaimana MEPRESIN berfungsi

Olmesartan Medoxomil tergolong dalam kelas ubat yang dikenali sebagai antagonis reseptor *angiotensin II*. *Angiotensin II* adalah bahan yang dihasilkan di dalam badan anda yang menyebabkan saluran darah anda sempit, sehingga meningkatkan tekanan darah anda. *Olmesartan Medoxomil* menghalang kesan *angiotensin II* supaya saluran darah menjadi lebih tenang, dan tekanan darah anda diturunkan.

Sebelum mengambil MEPRESIN

- *Bila anda tidak boleh mengambilnya*

Jangan ambil MEPRESIN jika anda:

- alah kepada *Olmesartan Medoxomil* atau kepada mana-mana bahan kandungan MEPRESIN yang lain.
- berada dalam trimester kedua dan ketiga kehamilan
- mengalami masalah dengan saluran hempedu dari pundi hempedu (sekatan biliarr).

- mempunyai kencing manis atau gangguan fungsi buah pinggang dan anda

dirawat dengan tekanan darah menurunkan ubat yang mengandungi *aliskiren*.

Mengandung dan menyusukan anak
Jangan ambil MEPRESIN jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil MEPRESIN jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- *Sebelum mula mengambil*

Sebelum anda mengambil MEPRESIN, beritahu doktor anda. Jika anda:

- mempunyai cirit-birit, muntah, atau anda sedang menjalani rawatan dengan dos ubat diuretik yang tinggi atau diet rendah garam
- mengambil ubat yang memberi kesan kepada sistem *renin-angiotensin-aldosterone*
- mengalami masalah buah pinggang atau mendapat pemindahan buah pinggang baru-baru ini
- mempunyai penyakit hati
- mempunyai tahap kalium yang rendah dalam darah
- menggunakan ubat dari kelas *ACE-inhibitors*, *angiotensin II receptor blockers*, *aliskiren*, atau *lithium*
- mengalami penyakit kegagalan jantung atau masalah dengan injap jantung atau otot jantung anda
- mempunyai *Conn's syndrome* (pengeluaran aldosteron yang berlebihan)
- mempunyai intoleransi pada galaktosa, kekurangan *Lapp-lactase* atau malabsorpsi glukosa-galaktosa

Seperti mana-mana ubat yang mengurangkan tekanan darah, penurunan tekanan darah yang tinggi pada pesakit yang mempunyai gangguan aliran darah dalam jantung atau otak boleh mengakibatkan serangan jantung atau

strok. Oleh itu doktor anda akan memeriksa tekanan darah anda dengan berhati-hati.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat lain, termasuk mana-mana yang anda beli tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan, terutamanya yang berikut:

- Suplemen kalium, pengganti garam yang mengandungi kalium, ubat diuretik *potassium-sparing* atau *heparin* (untuk penipisan darah). Menggunakan ubat ini pada masa yang sama seperti MEPRESIN boleh meningkatkan tahap kalium dalam darah anda.
- *Lithium* (ubat yang digunakan untuk merawat perubahan "angin" dan beberapa jenis kemurungan) yang digunakan pada masa yang sama seperti MEPRESIN dapat meningkatkan ketoksikan *lithium*. Sekiranya anda perlu mengambil *lithium*, doktor anda akan mengukur tahap *lithium* dalam darah anda.
- Ubat *Non-Steroidal Anti-Inflammatory (NSAIDs)* (digunakan untuk melegakan kesakitan, pembengkakan dan lain-lain gejala keradangan, termasuk arthritis) yang digunakan pada masa yang sama dengan MEPRESIN boleh meningkatkan risiko kegagalan ginjal dan kesan MEPRESIN dapat dikurangkan oleh *NSAIDs*.
- Lain-lain ubat kuran tekanan darah (*ACE-inhibitors*, *angiotensin II receptor blockers* atau *aliskiren*), kerana kesan MEPRESIN akan ditingkatkan.
- Sesetengah antasid (digunakan untuk senak), kerana kesan MEPRESIN boleh sedikit berkurang.
- *Colesevelam hydrochloride*, ubat yang menurunkan tahap kolesterol dalam darah anda, kerana kesan MEPRESIN mungkin berkurang. Doktor anda boleh menasihati anda untuk mengambil MEPRESIN sekurang-kurangnya 4 jam sebelum *colesevelam hydrochloride*

MEPRESIN 20 (OLMESARTAN MEDOXOMIL 20MG TABLET)

MEPRESIN 40 (OLMESARTAN MEDOXOMIL 40MG TABLET)

Olmesartan Medoxomil 20mg/40mg Tablet

Cara menggunakan MEPRESIN

- Berapa banyak harus digunakan

Dos biasa adalah 20mg sekali sehari. Dos boleh meningkat kepada 40mg sekali sehari. Jika anda mempunyai masalah buah pinggang atau hati, dos maksimum adalah 20mg sekali sehari.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini.

Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan tekanan darah rendah dan melambatkan denyutan jantung.

Semasa menggunakan MEPRESIN

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor. Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan MEPRESIN. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda. Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda. Jangan berkongsi MEPRESIN dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Kanak-kanak dan remaja (di bawah 18 tahun)

MEPRESIN tidak disyorkan untuk kanak-kanak dan remaja di bawah umur 18 tahun.

- Pesakit berkulit hitam

Seperti ubat lain yang lain, kesan kekurangan tekanan darah MEPRESIN agak kurang pada pesakit berkulit hitam.

- Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin menyebabkan anda mengantuk atau pening kepala. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

- Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain MEPRESIN) boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kesan sampingan biasa:

Pening, sakit kepala, mual, senak, cirit-birit, sakit perut, jangkitan dalam perut keletihan, sakit tekak, hidung berair atau tersumbat, bronkitis, simptom seperti selesema, batuk, sakit, sakit di dada, belakang, tulang atau sendi, jangkitan pada saluran kencing, bengkak pergelangan kaki, kaki, tangan, atau lengan, darah dalam air kencing.

Beberapa perubahan dalam keputusan ujian darah juga telah dilihat dan termasuk yang berikut: Peningkatan tahap lemak, meningkatkan kadar asid urik, peningkatan urea darah, peningkatan keputusan ujian fungsi hati dan otot.

Kesan sampingan tidak biasa

Bilangan platelet yang rendah; Bengkak muka, bersama-sama dengan gatal-gatal dan ruam (reaksi *anaphylactic*); pening; sakit dada; muntah; alahan pada kulit, kemerahan kulit, ruam, gatal; sakit otot; muka bengkak; tenaga berkurangan;

Kesan sampingan jarang:

Tahap kalium yang tinggi dalam darah; tekanan darah menurun terlalu rendah; kulit bengkak; otot kejang; masalah buah pinggang; letih; *creatinine* dalam darah meningkat

Kesan sampingan sangat jarang: Cirit-birit yang kronik menyebabkan berat badan menurun

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web

MEPRESIN 20 (OLMESARTAN MEDOXOMIL 20MG TABLET)

MEPRESIN 40 (OLMESARTAN MEDOXOMIL 40MG TABLET)

Olmesartan Medoxomil 20mg/40mg Tablet

<http://nptra.moh.gov.my/> (Public →
Reporting Medicinal Problems / Side Effects
/ AEFI)

Cara penyimpanan dan pelupusan

MEPRESIN

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.
Simpan di bawah suhu 30°C dan lindungi
daripada cahaya matahari

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui
air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk
kepada ahli farmasi anda mengenai cara
yang betul untuk melupuskan ubat yang
tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini
dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Untuk 20mg: Putih ke pudar putih, 8.60 mm
± 0.3mm berbentuk bulat, tablet bersalut
filem diukir dengan 'OLM' pada satu belah
dan '20' pada belah lain.

Untuk 40mg: Putih ke pudar putih, 15.10
mm ± 0.3mm berbentuk bujur, tablet
bersalut filem diukir dengan 'OLM' pada
satu belah dan '40' pada belah lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Olmesartan Medoxomil

- Bahan-bahan tidak aktif

- *Lactose Monohydrate, cellulose
microcrystalline, Low substituted hydroxyl
propyl cellulose, Hydroxypropyl cellulose,
Stearic Acid, Magnesium Stearate, Opadry
white*

- Nombor MAL

20MG: MAL20126124AZ

40MG: MAL20126123AZ

Pengilang

ALKEM LABORATORIES LTD.
Village Thana, Baddi, Dist. Solan (H.P),
India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Ascend Laboratories Sdn Bhd
Level 25, Menara Hong Leong,
No. 6, Jalan Damanlela,
50490 Bukit Damansara
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

13th Dec 2022

Nombor Siri

NPRA (R2) 19/133