

Mycokem Capsule 250 mg (MYCOPHENOLATE MOFETIL CAPSULES USP)

Mycophenolate Mofetil (250mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Mycokem
2. Bagaimana Mycokem berfungsi
3. Sebelum mengambil Mycokem
4. Cara menggunakan Mycokem
5. Semasa menggunakan Mycokem
6. Kesan-kesan sampingan
5. Cara penyimpanan & pelupusan Mycokem
6. Maklumat Lanjut
7. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
8. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan Mycokem

KAPSUL MYCOKEM digunakan untuk mencegah badan anda menolak organ yang dipindahkan, buah pinggang, jantung atau hati. KAPSUL MYCOKEM digunakan bersama-sama dengan ubat-ubatan lain yang dikenali sebagai ciclosporin dan kortikosteroid.

Bagaimana Mycokem berfungsi

Kapsul gelatin keras ini mengandungi bahan aktif 250mg Mycophenolate mofetil. Ini tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil "immunosuppressants". Ubat ini berfungsi dengan mengurangkan aktiviti sistem imun badan anda.

Sebelum mengambil Mycokem

Bila tidak boleh mengambil:

- KAPSUL MYCOKEM tidak boleh diberikan kepada wanita yang boleh melahirkan anak yang tidak menggunakan kontraseptif yang amat berkesan
- Rawatan Mycokem tidak boleh dimulakan pada wanita yang berumur sesuai untuk mengandung tanpa memberikan hasil ujian kehamilan untuk mengelakkan penggunaan yang tidak diinginkan semasa hamil
- KAPSUL MYCOKEM tidak boleh digunakan semasa hamil melainkan jika tidak ada rawatan alternatif yang sesuai untuk mengelakkan penolakan pemindahan organ.
- KAPSUL MYCOKEM tidak boleh diberikan kepada wanita yang menyusukan anak.

Jika mana-mana di atas berkaitan dengan anda (atau anda tidak pasti), berbincang dengan doktor anda dengan segera sebelum mengambil MYCOKEM KAPSUL.

Jika mengambil ubat-ubatan lain

Sila maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil/menggunakan ubat-ubatan lain atau baru-baru mengambil /menggunakan ubat-ubatan lain, walaupun ini telah diperolehi tanpa preskripsi.

Adakah anda mengambil ubat-ubatan yang mengandungi

-Acyclovir, ganciclovir (untuk rawatan jangkitan virus)

-colestyramine (untuk rawatan pesakit dengan kolesterol darah tinggi)

-rifampicin, norfloxacin,

Metronidazole, ciprofloxacin,

amoxicillin + clavulanic acid

(antibiotik)

-antacids

-Ciclosporin A, Tacrolimus

(immunosuppressants)

- Pengikat -phosphate (digunakan pada pesakit dengan kegagalan buah pinggang kronik untuk mengurangkan penyerapan fosfat)

-Atau sebarang ubat lain (termasuk yang anda boleh membeli tanpa preskripsi), yang doktor anda tidak ketahui?

• Adakah anda memerlukan vaksin (live vaccine)? Doktor anda akan memberi nasihat pemvaksinan yang sesuai untuk anda.

Mengandung dan menyusukan anak
Jangan mengambil KAPSUL MYCOKEM jika anda sedang menyusukan bayi.

Anda tidak boleh menggunakan KAPSUL MYCOKEM semasa mengandung kecuali dinyatakan dengan jelas oleh doktor anda. Doktor anda perlu menasihati anda tentang menggunakan kontrasepsi sebelum mengambil KAPSUL MYCOKEM, di samping mengambil KAPSUL MYCOKEM, dan untuk 6 minggu selepas anda berhenti mengambil KAPSUL MYCOKEM.

Ini kerana KAPSUL MYCOKEM boleh menyebabkan keguguran spontan atau kerosakan, termasuk masalah dengan pertumbuhan telinga pada bayi anda yang belum dilahirkan. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung, menyusukan bayi, hamil atau merancang untuk memulakan sebuah keluarga dalam masa terdekat.

Memandu dan menggunakan mesin
KAPSUL MYCOKEM tidak menunjukkan untuk menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin

Cara menggunakan

Mycokem

• Telan KAPSUL anda secara keseluruhan dengan segelas air. Dos permulaan Mycokem perlu diberikan secepat mungkin selepas pemindahan buah pinggang, jantung dan hati.

• Jangan pecahkan kapsul atau mengambil sebarang kapsul yang telah pecah terbuka. Elakkan daripada tersentuh dengan serbuk yang keluar dari kapsul yang rosak. Jika kapsul terpecah buka, basuhkan sebarang serbuk dari kulit anda dengan sabun dan air. Jika serbuk masuk ke dalam mata atau mulut anda, bilaskan dengan dengan banyak air.

Berapa banyak hanya digunakan

Pemindahan buah pinggang

Dewasa: Dos harian yang disyorkan adalah 2 gram sehari. (1gram dua kali sehari)

Pemindahan

Jantung

Dewasa: Dos harian yang disyorkan adalah 3 gram sehari (1.5 gram dua kali sehari)

Pemindahan hati

Dewasa: Dos harian yang disyorkan adalah 3 gram sehari (1.5 gram dua kali sehari)

Berapa lama perlu digunakan

Rawatan ini akan berterusan selagi anda perlukan pengurangan aktiviti sisten imun badan untuk mengelakkan organ dipindahka anda daripada ditolak.

Jika terlupa menggunakan

Sebaik sahaja anda ingat, ambil dos yang tertinggal, melainkan jika ia hampir masa untuk dos seterusnya. Jangan ambil dua dos pada masa yang sama.

Jika anda mengambil berlebihan (terlebih dos)

Beritahu doktor anda atau hubungi hospital yang terdekat dengan mengambil ubat atau risalah ini dengan anda.

Mycokem Capsule 250 mg (MYCOPHENOLATE MOFETIL CAPSULES USP)

Mycophenolate Mofetil (250mg)

Semasa menggunakan Mycokem
Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan berikan ubat ini kepada orang lain, walaupun tanda-tanda mereka kelihatan serupa dengan anda.

Jangan gunakan KAPSUL MYCOKEM untuk merawat sebarang masalah lain melainkan jika doktor anda memberitahu anda.

Jangan mengambil KAPSUL MYCOKEM jika anda mengandung atau menyusukan bayi. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda berfikir anda hamil.

Kesan cahaya matahari

Mycophenolate mengurangkan pertahanan badan anda. Hasilnya, terdapat peningkatan risiko kanser kulit. Hadkan jumlah cahaya matahari dan UV cahaya yang anda dapat. Pakai pakaian perlindungan yang meliputi kepala, leher, tangan dan kaki sambil menggunakan pelindung matahari dengan faktor perlindungan yang tinggi.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Sila maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil atau baru-baru mngambil sebarang ubat lain, walaupun mereka yang tidak ditetapkan melalui preskripsi seperti tertera di seksyen *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Mycokem boleh mempunyai kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapat mereka.

Sebahagian daripada masalah yang lebih biasa adalah cirit-birit, kekurangan sel-sel putih dan/atau sel darah merah di dalam darah, jangkitan dan muntah-muntah. Doktor akan melakukan ujian darah yang kerap untuk memantau sebarang perubahan dalam bilangan sel-sel darah atau perubahan di peringkat mana-mana bahan-bahan yang dibawa di dalam darah anda, contohnya gula, lemak, kolesterol.

Mycokem mengurangkan mekanisme pertahanan badan anda sendiri untuk menghentikan badan menolak buah pinggang jantung atau hati yang dipindahkan.

Akibatnya badan anda tidak akan menjadi baik seperti biasa untuk melawan jangkitan. Jadi, jika anda mengambil Mycokem anda boleh mendapat jangkitan lebih daripada yang biasa, seperti jangkitan otak, kulit, mulut, perut dan usus, paru-paru dan saluran kencing.

Seperti yang berlaku dalam pesakit yang mengambil jenis perubatan ini, jumlah yang sangat kecil pesakit Mycokem telah mendapat kanser tisu limfoid dan kulit.

Kanak-kanak berusia kurang daripada 6 tahun mungkin lebih cenderung daripada orang dewasa untuk mendapat kesan sampingan seperti cirit-birit, jangkitan, kekurangan sel-sel putih dan sel darah merah dalam darah. Pesakit warga tua yang berumur lebih daripada 65 tahun mungkin lebih cenderung untuk mempunyai kesan sampingan seperti jangkitan, pendarahan di kawasan perut dan air dalam paru-paru.

beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mendapati mana-mana yang berikut: demam, sakit sendi dan sakit otot.

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi semakin serius, atau jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini semasa anda mengambil Mycokem, sila beritahu doktor atau ahli farmasi. Walau bagaimanapun, jangan berhenti mengambil ubat anda melainkan anda telah berbincang dengan doktor anda terlebih dahulu.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my (Consumers > Reporting > Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI))

Cara penyimpanan dan pelupusan Mycokem

Jauhkan dari jangkauan dan penglihatan kanak-kanak. Jangan simpan melebihi 30°C. Simpan dalam bungkusan asal untuk melindungi dari kelembapan.

Ubat- ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar

Maklumat Lanjut

Rupa dan Warna produk

Serbuk berbutir putih-keputihan yang diisi dalam kapsul bersaiz “1” yang berwarna biru untuk sarung dan perang untuk badan kapsul gelatin keras dengan “266” diukir pada badan kapsul dengan dakwat hitam

Mycokem KAPSUL boleh didapati dalam saiz pek 1 x 10 & 10 x 10 KAPSUL.

Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif

Mycophenolate mofetil.

Bahan tidak Aktif

Croscarmellose sodium, Povidone K-90, Pre gelatinized maize starch, Magnesium Stearate, dan saiz '1' kapsul kosong

Nombor MAL: MAL17055011AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Pengilang

Alkem Laboratories Ltd, Village Thana, Baddi, Dist: Solan, Himachal Pradesh, 173205 India
H.O: Alkem House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, 400013 India

Pemegang Pendaftaran Produk

Ascend Laboratories Sdn Bhd, Level 25, Menara Hong Leong, No. 6, Jalan Damanlela, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh Kemaskini RIMUP

04/05/2022

Nombor Siri

NPRA(R2/2)220413/870