

Mycokem Tablet 500 mg

Mycophenolate Mofetil (500mg)

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Mycokem
2. Bagaimana Mycokem berfungsi
3. Sebelum mengambil Mycokem
4. Cara menggunakan Mycokem
5. Semasa menggunakan Mycokem
6. Kesan-kesan sampingan
5. Cara penyimpanan & pelupusan Mycokem
6. Maklumat Lanjut
7. Pengilang dan pemegang pendaftaran produk
8. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan Mycokem

TABLET MYCOKEM digunakan untuk mencegah badan anda menolak organ yang dipindahkan, buah pinggang, jantung atau hati. TABLET MYCOKEM digunakan bersama-sama dengan ubat-ubatan lain yang dikenali sebagai ciclosporin dan kortikosteroid.

Bagaimana Mycokem berfungsi

Tablet ini mengandungi bahan aktif 500mg Mycophenolate mofetil. Ini tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil "*immunosuppressants*". Ubat ini berfungsi dengan mengurangkan aktiviti sistem imun badan anda.

Sebelum mengambil Mycokem

Bila tidak boleh mengambil:

- TABLET MYCOKEM tidak boleh diberikan kepada wanita yang boleh melahirkan anak yang tidak menggunakan kontraseptif yang amat berkesan
- Rawatan Mycokem tidak boleh dimulakan pada wanita yang berumur sesuai untuk mengandung tanpa memberikan hasil ujian kehamilan untuk mengelakkan penggunaan yang tidak diingini semasa hamil
- TABLET MYCOKEM tidak boleh digunakan semasa hamil melainkan jika tidak ada rawatan alternatif yang sesuai untuk mengelakkan penolakan pemindahan organ.
- TABLET MYCOKEM tidak boleh diberikan kepada wanita yang menyusukan anak.

Jika mana-mana di atas berkaitan dengan anda (atau anda tidak pasti), berbincang dengan doktor anda dengan segera sebelum mengambil MYCOKEM TABLET.

Jika mengambil ubat-ubatan lain

Sila maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil/menggunakan ubat-ubatan lain atau baru-baru mengambil/menggunakan ubat-ubatan lain, walaupun ini telah diperolehi tanpa preskripsi.

Adakah anda mengambil ubat-ubatan yang mengandungi

-*Acyclovir, ganciclovir* (untuk rawatan jangkitan virus)

-*colestyramine* (untuk rawatan pesakit dengan kolesterol darah tinggi)

-*rifampicin, norfloxacin,*

Metronidazole, ciprofloxacin,

amoxicillin + clavulanic acid

(antibiotik)

-*antacids*

-*Ciclosporin A, Tacrolimus*

(*immunosuppressants*)

- Pengikat -phosphate (digunakan pada pesakit dengan kegagalan buah pinggang kronik untuk mengurangkan penyerapan fosfat)

-Atau sebarang ubat lain (termasuk yang anda boleh membeli tanpa preskripsi), yang doktor anda tidak ketahui?

- Adakah anda memerlukan vaksin (*live vaccine*)? Doktor anda akan memberi nasihat pemvaksin yang sesuai untuk anda.

Mengandung dan menyusukan anak
Jangan mengambil TABLET MYCOKEM jika anda sedang menyusukan bayi.

Anda tidak boleh menggunakan TABLET MYCOKEM semasa mengandung kecuali dinyatakan dengan jelas oleh doktor anda. Doktor anda perlu menasihati anda tentang menggunakan kontrasepsi sebelum mengambil TABLET MYCOKEM, di samping mengambil TABLET MYCOKEM, dan untuk 6 minggu selepas anda berhenti mengambil TABLET MYCOKEM.

Ini kerana TABLET MYCOKEM boleh menyebabkan keguguran spontan atau kerosakan, termasuk masalah dengan pertumbuhan telinga pada bayi anda yang belum dilahirkan. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung, menyusukan bayi, hamil atau merancang untuk memulakan sebuah keluarga dalam masa terdekat.

Memandu dan menggunakan mesin
TABLET MYCOKEM tidak menunjukkan untuk menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin

Cara menggunakan Mycokem

- Telan TABLET anda secara keseluruhan dengan segelas air. Dos permulaan Mycokem perlu diberikan secepat mungkin selepas pemindahan buah pinggang, jantung dan hati.

Berapa banyak hanya digunakan

Pemindahan buah pinggang

Dewasa: Dos harian yang disyorkan adalah 2 gram sehari. (1gram dua kali sehari)

Pemindahan Jantung

Dewasa: Dos harian yang disyorkan adalah 3 gram sehari (1.5 gram dua kali sehari)

Pemindahan hati

Dewasa: Dos harian yang disyorkan adalah 3 gram sehari (1.5 gram dua kali sehari)

Berapa lama perlu digunakan

Rawatan ini akan berterusan selagi anda perlukan pengurangan aktiviti sisten imun badan untuk mengelakkan organ dipindahka anda daripada ditolak.

Jika terlupa menggunakan

Sebaik sahaja anda ingat, ambil dos yang tertinggal, melainkan jika ia hampir masa untuk dos seterusnya. Jangan ambil dua dos pada masa yang sama.

Jika anda mengambil berlebihan (terlebih dos)

Beritahu doktor anda atau hubungi hospital yang terdekat dengan mengambil ubat atau risalah ini dengan anda.

Semasa menggunakan Mycokem

Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan berikan ubat ini kepada orang lain, walaupun tanda-tanda mereka kelihatan serupa dengan anda.

Jangan gunakan TABLET MYCOKEM untuk merawat sebarang masalah lain melainkan jika doktor anda memberitahu anda.

Jangan mengambil TABLET MYCOKEM jika anda mengandung atau menyusukan bayi. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda berfikir anda hamil.

Mycokem Tablet 500 mg

Mycophenolate Mofetil (500mg)

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

Kesan cahaya matahari

Mycophenolate mengurangkan pertahanan badan anda. Hasilnya, terdapat peningkatan risiko kanser kulit. Hadkan jumlah cahaya matahari dan UV cahaya yang anda dapat. Pakai pakaian perlindungan yang meliputi kepala, leher, tangan dan kaki sambil menggunakan pelindung matahari dengan faktor perlindungan yang tinggi.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Sila maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil atau baru-baru mngambil sebarang ubat lain, walaupun mereka yang tidak ditetapkan melalui preskripsi seperti tertera di seksyen *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Mycokem boleh mempunyai kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapat mereka.

Sebahagian daripada masalah yang lebih biasa adalah cirit-birit, kekurangan sel-sel putih dan/atau sel darah merah di dalam darah, jangkitan dan muntah-muntah. Doktor akan melakukan ujian darah yang kerap untuk memantau sebarang perubahan dalam bilangan sel-sel darah atau perubahan di peringkat mana-mana bahan-bahan yang dibawa di dalam darah anda, contohnya gula, lemak, kolesterol.

Mycokem mengurangkan mekanisme pertahanan badan anda sendiri untuk menghentikan badan menolak buah pinggang jantung atau hati yang dipindahkan. Akibatnya badan anda tidak akan menjadi baik seperti biasa untuk melawan jangkitan. Jadi, jika anda mengambil Mycokem anda boleh medapat jangkitan lebih daripada yang biasa, seperti jangkitan otak, kulit, mulut, perut dan usus, paru-paru dan saluran kencing.

Seperti yang berlaku dalam pesakit yang mengambil jenis perubatan ini, jumlah yang sangat kecil pesakit Mycokem telah mendapat kanser tisu limfoid dan kulit.

Kanak-kanak berusia kurang daripada 6 tahun mungkin lebih cenderung daripada orang dewasa untuk mendapat kesan sampingan seperti cirit-birit, jangkitan,

kekurangan sel-sel putih dan sel darah merah dalam darah.

Pesakit warga tua yang berumur lebih daripada 65 tahun mungkin lebih cenderung untuk mempunyai kesan sampingan seperti jangkitan, pendarahan di kawasan perut dan air dalam paru-paru

beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mendapati mana-mana yang berikut: demam, sakit sendi dan sakit otot.

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi semakin serius, atau jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini semasa anda mengambil Mycokem, sila beritahu doktor atau ahli farmasi. Walau bagaimanapun, jangan berhenti mengambil ubat anda melainkan anda telah berbincang dengan doktor anda terlebih dahulu.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nptra.moh.gov.my (*Consumers > Reporting > Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*)

Cara penyimpanan dan pelupusan Mycokem

Jauhkan dari jangkauan dan penglihatan kanak-kanak. Jangan simpan melebihi 30°C. Simpan dalam bungkusan asal untuk melindungi dari kelembapan. Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar

Maklumat Lanjut

Rupa dan Warna produk Dwicembung caplet bersalut filem yang berwarna lavender dengan “265” diukir pada satu sisi dan biasa pada sisi lain.

Mycokem TABLET boleh didapati dalam saiz pek 1 x 10 & 5 x 10 TABLET.

Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif

Mycophenolate mofetil.

Bahan tidak Aktif

Croscarmellose sodium, Povidone K-90, Microcrystalline cellulose, Magnesium Stearate, dan Instacoat ICG-U-10130.

Nombor MAL: MAL17055012AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Pengilang

Alkem Laboratories Ltd, Village Thana, Baddi, Dist: Solan, Himachal Pradesh, 173205 India
H.O: Alkem House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, 400013 India

Pemegang Pendaftaran Produk

Ascend Laboratories Sdn Bhd, Level 25, Menara Hong Leong, No. 6, Jalan Damanlela, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh Kemaskini RIMUP

04/05/2022

Nombor Siri

NPRA(R2/2)220413/869