

AETOS KENAZOR CREAM 2% w/w

Ketoconazole (2% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Aetos Kenazor Cream 2% w/w
2. Bagaimana Aetos Kenazor Cream 2% w/w berfungsi
3. Sebelum menggunakan Aetos Kenazor Cream 2% w/w
4. Cara menggunakan Aetos Kenazor Cream 2% w/w
5. Semasa menggunakan Aetos Kenazor Cream 2% w/w
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Aetos Kenazor Cream 2% w/w
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Aetos Kenazor Cream 2% w/w

Aetos Kenazor Cream 2% w/w adalah ubat untuk merawat jangkitan kulit yang disebabkan oleh kulat atau yis.

Ia digunakan untuk merawat jangkitan kulit pada badan, lipatan paha, kaki atau tangan. Aetos Kenazor Cream 2% w/w ini juga digunakan untuk merawat jangkitan kulit yang biasanya berlaku pada muka dan di dada dengan tompok coklat kemerahan dan bersisik kuning atau putih (dermatitis seboarea).

Bagaimana Aetos Kenazor Cream 2% w/w berfungsi

Aetos Kenazor Cream 2% w/w berfungsi dengan membunuh kulat yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan Aetos Kenazor Cream 2% w/w

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Aetos Kenazor Cream 2% w/w jika anda tahu anda hipersensitif (alergi) kepadanya. Simptom hipersensitiviti termasuk kegatalan dan kulit merah yang mungkin berlaku selepas anda menyapu Aetos Kenazor Cream 2% w/w.

- Sebelum menggunakan Aetos Kenazor Cream 2% w/w

Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat ini:

- Jika anda baru-baru ini menggunakan krim, salap atau losyen yang mengandungi steroid pada kulit jangkitan anda: Anda perlu terus menyapu krim, salap, atau losyen yang mengandungi steroid sederhana (seperti hidrokortison) pada waktu pagi manakala menyapu Aetos Kenazor Cream 2% w/w pada waktu malam. Rawatan steroid yang sederhana boleh kemudian dihentikan secara beransur-ansur dalam tempoh 2 – 3 minggu.

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai pemberhentian losyen, salap atau krim steroid anda, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Mengandung dan menyusukan anak

Tiada risiko yang diketahui dengan menggunakan Aetos Kenazor Cream 2% w/w dalam kehamilan atau menyusukan badan.

Kanak-kanak dan remaja

Aetos Kenazor Cream 2% w/w tidak disyorkan untuk digunakan oleh kanak-kanak bawah 18 tahun.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Jika anda juga menggunakan kortikosteroid (ubat jenis kortison dalam krim, salap atau losyen), periksa dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum memulakan rawatan dengan Aetos Kenazor Cream 2% w/w. Anda mungkin mula menggunakan Aetos Kenazor Cream 2% w/w secara serta merta, tetapi jangan berhenti menggunakan kortikosteroid.

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Meneruskan rawatan anda seperti berikut:

- Gunakan kortikosteroid pada waktu pagi dan Aetos Kenazor Cream 2% w/w pada waktu malam selama 1 minggu
- Selepas itu, sapukan kortikosteroid pada waktu pagi setiap 2 atau 3 hari dan Aetos Kenazor Cream 2% w/w pada setiap malam untuk 1 hingga 2 minggu
- Kemudian berhenti menggunakan kortikosteroid dan, jika perlu teruskan dengan Aetos Kenazor Cream 2% w/w sahaja.

Jika anda mempunyai sebarang soalan, sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Cara menggunakan Aetos Kenazor Cream 2% w/w

- Berapa banyak harus digunakan

Anda perlu sapukan Aetos Kenazor Cream 2% w/w sekali atau dua kali sehari seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Bergantung kepada jenis jangkitan, rawatan boleh bertahan selama 2 hingga 6 minggu. Biasanya anda akan melihat tanda penambahbaikan selepas 4 minggu. Jika ini tidak berlaku, berbincang dengan doktor anda.

Bagi jangkitan kulit pada badan, lipatan paha, kaki dan tangan, sapukan Aetos Kenazor Cream 2% w/w sekali sehari.

Bagi jangkitan kulit yang biasanya berlaku pada muka dan di dada dengan tompok coklat kemerahan dan bersisik kuning atau putih (dermatitis seboarea), sapukan Aetos Kenazor Cream 2% w/w sekali atau dua kali sehari.

Jangkitan kulit biasanya akan menjadi lebih baik selepas 2 hingga 4 minggu dan selepas itu anda boleh terus menggunakan Aetos Kenazor Cream 2% w/w sekali atau dua kali seminggu.

- Untuk membuka tiub, buka penutup dan kemudian tusuk penutup tiub menggunakan pin pada bahagian atas penutup.

AETOS KENAZOR CREAM 2% w/w

Ketoconazole (2% w/w)

- Bersihkan kulit yang dijangkiti dan lapkan sehingga kering.
- Gosok Aetos Kenazor Cream 2% w/w perlahan-lahan di kawasan yang dijangkiti dan kawasan di sekitar kawasan yang dijangkiti dengan hujung jari anda.
- Basuh tangan anda dengan berhati-hati selepas anda menggunakan Aetos Kenazor Cream 2% w/w, kecuali jika rawatan tersebut untuk tangan anda.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Jangan berhenti menggunakan krim ini sehingga beberapa hari selepas semua simptom hilang sepenuhnya.

Teruskan penggunaan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Jangan menggunakan dos kedua untuk menggantikan dos yang lupa.

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa.

- Jika menggunakan secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda

mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Apabila terlalu banyak Aetos Kenazor Cream 2% w/w disapukan atau Aetos Kenazor Cream 2% w/w digunakan lebih kerap daripada yang diarahkan oleh doktor anda, ia boleh menyebabkan kepedihan, kemerahan atau bengkak. Jika ini berlaku, berhenti menggunakan Aetos Kenazor Cream 2% w/w serta merta.

Aetos Kenazor Cream 2% w/w tidak boleh ditelan. Jika Aetos Kenazor Cream 2% w/w ditelan secara tidak sengaja, hubungi doktor anda.

Semasa menggunakan Aetos Kenazor Cream 2% w/w

- Perkara yang perlu dilakukan

Basuh tangan anda berhati-hati selepas anda menyapukan Aetos Kenazor Cream 2% w/w.

Simpan tuala dan flanel yang berasingan untuk kegunaan anda sendiri untuk mengelakkan menjangkiti orang lain.

Menukar pakaian yang bersentuhan dengan kulit dijangkiti dengan kerap untuk mengelakkan jangkitan semula kepada diri sendiri.

Guna ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Aetos Kenazor Cream 2% w/w.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan sapukan Aetos Kenazor Cream 2% w/w pada mata.

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Aetos Kenazor Cream 2% w/w kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera
Aetos Kenazor Cream 2% w/w kemungkinan tidak menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mana-mana alat atau mesin.

Aetos Kenazor Cream 2% w/w mengandungi propylene glycol. Ini mungkin mengakibatkan kerengsaan kulit.

Aetos Kenazor Cream 2% w/w mengandungi cetyl alcohol dan stearyl alcohol. Ini boleh menyebabkan reaksi kulit seperti dermatitis sentuh.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Aetos Kenazor Cream 2% w/w boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang akan mendapatnya. Beritahu doktor anda jika anda mendapati mana-mana kesan sampingan yang berikut semasa menggunakan Aetos Kenazor Cream 2% w/w:

- Kepedihan kulit terbakar, kegatalan atau kemerahan
- Reaksi hiper-sensitiviti (alergi), ruam, eczema, gatal-gatal, kerengsaan atau reaksi kulit setempat yang lain

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda menyedari sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

AETOS KENAZOR CREAM 2% w/w

Ketoconazole (2% w/w)

Cara penyimpanan dan pelupusan Aetos Kenazor Cream 2% w/w

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C.

Jangan sapu ubat ini selepas tarikh luput atau jika penutup muncung tiub telah rosak atau tiub telah bocor.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Pemegang Pendaftaran Produk

Abiotide Sdn Bhd
121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
30010 Ipoh, Perak.

Diedarkan oleh

Aetos Pharma Sdn Bhd
No. 66B, Tingkat 2, Jalan Cerdas,
Taman Connaught, 56000
Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

17/04/2024

Nombor Siri

NPRA(R2/2)240222/1210

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim legap yang berwarna putih sehingga hampir putih.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Ketoconazole (micronized)
- Bahan tidak aktif
Purified Water
Liquid Paraffin
Propylene Glycol
Stearyl Alcohol
Cetyl Alcohol
Polysorbate 80
Polysorbate 60
Sorbitan Monooleate
Butylated Hydroxytoluene
Disodium EDTA
Triethanolamine

- Nombor MAL

MAL23116007AZ

Pengilang

Hovid Berhad
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar)
30010 Ipoh, Perak.