

METOCLODE SYRUP 5MG/5ML

Metoclopramide hydrochloride (5mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Metocloode
2. Bagaimana Metocloode berfungsi
3. Sebelum menggunakan Metocloode
4. Cara menggunakan Metocloode
5. Semasa menggunakan Metocloode
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Metocloode
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Metocloode

Ia digunakan untuk mencegah loya dan muntah orang dewasa, akibat migrain, selepas rawatan radiasi atau atas sebab lain. Ia adalah rawatan barisan kedua dalam mencegah loya dan muntah akibat daripada rawatan ubat pada kanak-kanak berumur 1 – 18 tahun.

Bagaimana Metocloode berfungsi

Metoclopramide hydrochloride bertindak pada otak yang mencegah loya atau muntah.

Sebelum menggunakan Metocloode

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan guna Metocloode jika anda mempunyai
- alahan kepada metoclopramide dan bahan lain yang terkandung dalam Metocloode.
- pendarahan, sekatan atau pesuk pada perut atau usus.
- ketumbuhan berhampiran buah pinggang yang dikenali sebagai *pheochromocytoma*.
- sejarah pergerakan tak terkawal akibat daripada ubat penenang atau metoclopramide.
- sawan
- penyakit *Parkinson*
- komninsi dengan levodopa atau agonis dopaminergic.
- sejarah *methemoglobinemia* (gangguan darah apabila sel-sel kekurangan oksigen) disebabkan oleh metoclopramide atau kekurangan sesuatu enzim
- Tidak boleh digunakan untuk kanak-kanak berumur kurang daripada setahun.

Kehamilan dan Penyusuan

Keselamatan penggunaan oleh wanita hamil atau ibu menyusu belum dipastikan. Metoclopramide harus dielakkan dalam peringkat akhir kehamilan. Metoclopramide boleh dikesan di dalam susu badan. Jadi, ia tidak disyorkan untuk ibu yang menyusu.

- Sebelum menggunakan Metocloode

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami:

- masalah saraf
- masalah jantung
- gangguan buah pinggang
- gangguan hati

- Jika mengambil ubat-ubat lain

- Tidak boleh diambil bersama dengan:
- neuroleptik (ubat penenang)
- digoxin (ubat untuk masalah jantung)
- ciclosporin (ubat untuk masalah system imun)
- aspirin dan paracetamol (ubat tahan sakit)
- ubat untuk keresahan

- morphine (ubat tahan sakit yang kuat)
 - phenothiazine (ubat untuk merawat gangguan mental dan emosi)
 - ubat antihistamina atau kemurungan yang menyebabkan rasa mengantuk
- Sila beritahu doktor jika anda mengambil ubat-ubatan lain yang dibeli dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Metocloode

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: 10ml sehingga tiga kali sehari. Dos maksima harian: 30ml atau 0.5ml/kg berat badan.
Kanak-kanak 1-18 tahun: 0.1-0.15ml/kg berat badan sehingga tiga kali sehari. Dos maksima harian: 0.5ml/kg berat badan.
Warga tua: Pengurangan dos berdasarkan pada fungsi hati dan buah pinggang.
 Gangguan buah pinggang:
 - tahap akhir, kurang dos harian sebanyak 75%.
 - tahap sederhana hingga teruk dan gangguan hati, kurangkan dos sebanyak 50%.

Umur (tahun)	Berat badan	Dos	Kekerapan
1-3	10-14kg	1ml	Sehingga 3 kali sehari
3-5	15-19kg	2ml	
5-9	20-29kg	2.5ml	
9-18	30-60kg	5ml	
15-18	> 60kg	10ml	

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi. Jarakkan masa pengambilan sekurang-kurangnya 6 jam, walaupun anda muntah.

- Berapa lama perlu digunakan

Tempoh rawatan sehingga 5 hari.

- Jika terlupa menggunakan

Minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat. Anda mungkin memerlukan rawatan segera. Gejala-gejala terlebih dos: pengecutan otot rahang, leher, belakang, berjalan dengan menyeret kaki, kepala dan muka tersentak-sentak, tangan mengeletar, kekeliruan, mengantuk, khayal atau masalah jantung dan pernafasan.

Semasa menggunakan Metocloode

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat mengikut arahan doktor anda. Maklumkan kepada doktor, doktor gigi dan ahli farmasi bahawa anda sedang mengambil Metocloode. Beritahu doktor dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor. Jangan mengambil ubat yang baru tanpa berbincang dengan doktor. Jangan berikan Metocloode kepada sesiapa, walaupun mempunyai

simptom yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Metoclopramide boleh menyebabkan mengantuk. pening, pengecutan otot tak terkawal dan gangguan pergerakan yang mempengaruhi penglihatan dan keupayaan anda memandu dan mengendalikan mesin. Jangan memandu atau mengendalikan mesin semasa mengambil ubat ini.

Kesan-kesan sampingan

Hubungi doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami kesan sampingan ubat ini. Sembelit, cirit-birit, tekanan darah rendah, mengantuk, pengecutan otot dan pergerakan tak terkawal, kegelisahan dan depresi boleh berlaku. Kesan-kesan lain ialah kelemahan, denyutan jantung perlahan, rembesan susu ibu, pening, hipersensitif, agitasi, kekeliruan, khayalan, *Torsade de Pointes* (ritma jantung luar biasa), jantung henti berfungsi, tanda-tanda penyakit *Parkinson*, reaksi alergi serius, *methemoglobinemia*, tekanan darah tinggi, konvulsi dan ruam kulit.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Metocloode

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin dan kering, bawah suhu 30°C. Jauhkan dari cahaya. Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang tidak diperlukan.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sirap tanpa warna berperisa nenas.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: metoclopramide hydrochloride
- Bahan-bahan tidak aktif: methyl parabens, propyl parabens, perisa nenas, citric acid, sodium citrate, propylene glycol, glycerin, sorbitol dan air.

- Nombor MAL

MAL19890366AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
 1505, Lorong Perusahaan Utama 1
 Taman Perindustrian Bukit Tengah
 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

15/05/2026

Nombor siri

NPRA(R4/1)161020/00137