

MICOZOL CREAM 2% W/W

Miconazole nitrate (2%w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Micozol
2. Bagaimana Micozol berfungsi
3. Sebelum menggunakan Micozol
4. Cara menggunakan Micozol
5. Semasa menggunakan Micozol
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Micozol
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Micozol

Ia digunakan untuk merawat jangkitan kulat pada kulit dan kuku, termasuk candidiasis, tinea and pityriasis versicolor (jangkitan kulat pada kulit).

Bagaimana Micozol berfungsi

Micozol membunuh kulat yang menyebabkan jangkitan dan sesetengah bakteria pada tempat jangkitan.

Sebelum menggunakan Micozol

- Bila tidak boleh mengguna
Jika ada alahan terhadap miconazole, atau ramuan-ramuan lain Micozol.

- Sebelum mula mengguna
Elakkan penggunaan ubat pada mata. Jangan pakai pembalut luka di atas ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor. Jangan diguna pada kanak-kanak bawah 2 tahun kecuali dengan nasihat dan penyeliaan doktor. Jika iritasi berterusan dan tiada kelegaan dalam masa 4 minggu, Penggunaan dihentikan dan hubungi doktor atau ahli farmasi. Keselamatan penggunaan semasa kehamilan atau menyusukan anak belum dipastikan lagi. Jadi, sila beritahu doktor jika hamil atau menyusukan anak.

- Jika mengambil ubat-ubat lain
Ubat ini adalah untuk kegunaan luar sahaja dan biasanya kurang kesan ke atas ubat-ubat lain. Walaupun demikian, sila beritahu doktor jika anda sedang mengambil ubat warfarin.

Cara menggunakan Micozol

- Berapa banyak harus diguna
Jangkitan kulit: Sapukan pada bahagian kulit satu atau dua kali sehari sehingga jangkitan sembuh.
Jangkitan kuku: Sapukan pada bahagian kuku dua kali sehari, ditambah dengan ubat makan untuk hilang kulat atau luka dibalut, jika perlu. Penggunaan ubat

diteruskan untuk jangka rawatan lengkap bagi mengurangkan jangkitan berulang, biasanya 2 minggu.

- Bila perlu diguna
Sila ikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

- Berapa lama perlu diguna
Perlu mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

- Jika terlupa mengguna
Guna sebaik sahaja teringat. Selepas itu, gunakan semula mengikut jadual biasa anda.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)
Jika terlebih dos, hubungi doktor, jabatan kecemasan atau pusat racun dengan segera.

Semasa menggunakan Micozol

- Perkara yang perlu dilakukan
Beritahu doktor ubat yang sedang diambil.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan berhenti mengambil ubat sebaik sahaja berasa lega selepas beberapa hari, sambung sehingga jangka rawatan selesai.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Jikalau hamil atau menyusukan anak, elak gunakan ubat kecuali atas arahan doktor.

Kesan-kesan sampingan

Iritasi setempat dan kadangkala kesensitifan mungkin berlaku. Jika berlaku sebarang kesan sampingan serius atau tidak tertera dalam risalah ini, sila hubungi doktor atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Micozol

- Penyimpanan
Simpan di tempat yang dingin dan kering, bawah 30°C. Jauhkan dari cahaya. Jauhkan dari kanak-kanak.

- Pelupusan
Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang ingin dibuang.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk
Krim warna putih.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: miconazole nitrate
- Bahan tidak aktif: cetomacrogol emulsifying wax, white soft paraffin, liquid paraffin, chlorocresol, sodium citrate, disodium edetate dan air.

- Nombor MAL:
MAL19900276AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
1505, Lorong Perusahaan Utama 1
Taman Perindustrian Bukit Tengah
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP
30/05/2022

Nombor siri
BPFK(R4/1)190417/00086