

HYPERSOR TABLET

Metoprolol tartrate 100mg

Apakah yang ada pada risalah ini

- Apakah kegunaan *Hypersor*
- Bagaimana *Hypersor* berfungsi
- Sebelum mengambil *Hypersor*
- Cara menggunakan *Hypersor*
- Semasa menggunakan *Hypersor*
- Kesan-kesan sampingan
- Cara penyimpanan dan pelupusan *Hypersor*
- Maklumat lanjut
- Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
- Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Hypersor*

Untuk rawatan sakit dada dan penyakit darah tinggi, dan rawatan profilaktik serangan jantung.

Bagaimana *Hypersor* berfungsi

Metoprolol mempunyai sifat menghalang kesakitan jantung dan pengurangan tekanan darah. Kesan penghalangnya adalah akibat pengurangan keperluan oksigen otot jantung dan kesan pengurangan tekanan darah adalah akibat pengurangan keluaran jantung, pengurangan aliran keluar ke saluran darah pinggiran dan rencatan pengeluaran enzim renin oleh ginjal.

Sebelum mengambil *Hypersor*

Bila tidak boleh mengambil

Metoprolol menyebabkan denyutan jantung perlahan, tanda gangguan aliran arteri pinggiran dan reaksi alergi serius, yang menyebabkan kerumitan bernafas atau pening. Perlu dijaga untuk pesakit dengan alergi atau depresi mental, asma, kegagalan jantung kongestif, hipoglisemia, ketidaksempurnaan serius fungsi hati dan ginjal.

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor jika jelas terdapat kegagalan jantung atau kadar denyutan jantung kurang daripada 45 denyutan/min dan masalah darah serius kaki dan tangan, Alahan kepada metoprolol atau ubat penghalang beta lain. Berhati-hati semasa mengendalikan kerja-kerja yang memerlukan perhatian kerana kemungkinan berlakunya pening.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Penggunaan serentak dengan anestetik am mungkin meningkatkan risiko depresi otot jantung dan tekanan darah rendah. Penggunaan bersama agen penyekat terusan kalsium atau klonidin mungkin meningkatkan kesan antihipersensitif. Terapi bersama dengan amina simpatomimetik dengan aktiviti rangsangan adrenergik beta mungkin mengakibatkan rencatan saling kesan terapeutik.

Cimetidine mungkin meningkatkan kesan metoprolol kerana peningkatan kepekatan darah akibat rencatan enzim hepatic dan pengurangan aliran darah hepatic.

Cara menggunakan *Hypersor*

Berapa banyak harus diambil

Dewasa: Antianginal: oral, biasanya metoprolol 50 - 100mg dua atau tiga kali sehari. Antihipertensif: Oral, mulanya 100 mg setiap hari dalam dos tunggal atau terbahagi, dos ditingkatkan dalam kala seminggu, sehingga ke jumlah 450mg setiap hari, jika perlu.

Bila perlu diambil

Ambil metoprolol mengikut arahan oleh doktor.

Berapa lama perlu diambil

Perlu mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

Jika terlupa mengambil

Jangan mengambil dos berganda sebagai gantian dos yang terlepas.

Jika mengambil berlebihan(terlebih dos)

Tanda-tanda lebih dos ialah denyutan jantung perlahan, hipotensi, kerumitan bernafas, kegagalan jantung, warna kebiruan kuku atau tapak tangan dan kekejangan. Perlu dapatkan rawatan segera doktor jikalau terdapat tanda-tanda terlebih dos.

Semasa menggunakan *Hypersor*

Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor ubat yang sedang diambil. Dapatkan nasihat doktor sebelum hentikan pengambilan ubat, pengurangan dos perlu dilakukan secara beransuran.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Pengambilan ubat mestilah seperti yang diarahkan.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Beritahu doktor jikalau hamil atau penyusuan semasa rawatan, metoprolol tidak boleh diambil tanpa arahan doktor. Ini adalah kerana tiada maklumat mengenai risiko kepada bayi dalam kandungan.

Kesan-kesan sampingan

Paling biasa adalah keletihan, gangguan perut-usus (loya, muntah atau sakit abdomen) dan gangguan tidur. Kesan jantung yang dilaporkan seperti denyutan jantung perlahan, tekanan darah rendah, kegagalan jantung, terasa denyutan nadi, denyutan jantung tak teratur adalah jarang, Aliran darah ke jari tangan dan kaki kurang menyebabkan rasa kebas dan pucat,

bengkak pinggiran and sakit bawah jantung. Ruam kulit dan antibodi positif anti-nuklear (tiada kaitan dengan SLE) jarang berlaku, sensitif cahaya, peluh dan keguguran rambut pernah dilaporkan. Kerumitan bernafas, iritasi hidung dan tambahan berat badan, pengurangan platelet menyebabkan peningkatan risiko pendarahan atau lebam, gangguan penglihatan, konjunktivitis, desiran telinga dan mata kering. Depresi mental, kurang upaya seks, pening, lemah, sakit kepala, denyutan jantung tak teratur, penat, peluh, dan kegigilan pernah berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel:03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety).

Cara penyimpanan dan pelupusan *Hypersor*

Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin dan kering, bawah 30°C. Jauhkan dari cahaya. Jauhkan dari kanak-kanak.

Pelupusan

Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang ingin dibuang.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet putih, bulat, rata dan permukaan atas skor.

Bahan-bahan kandungan

laktos monohidrat, tepung jagung, polivinilpirolidon, magnesium stearat, dan silicon dioxida.

MAL NO

MAL19930048AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
1505, Lorong Perusahaan Utama 1
Taman Perindustrian Bukit Tengah
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

09/01/2018