

ROXIM CAPSULE

Piroxicam (10mg, 20mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Roxim capsule
2. Bagaimana Roxim capsule berfungsi
3. Sebelum menggunakan Roxim capsule
4. Cara menggunakan Roxim capsule
5. Semasa menggunakan Roxim capsule
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Roxim capsule
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Roxim capsule

Ia digunakan untuk melegakan sakit dan keradangan akibat daripada osteoarthritis (penyakit degeneratif sendi), arthritis reumatoid (penyakit keradangan yang mempengaruhi sendi), spondilitis mengankilosis (penyakit inflamasi kronik pada spina).

Bagaimana Roxim capsule berfungsi

Roxim Capsule mengandungi bahan aktif piroxicam yang tergolong dalam kumpulan ubat *non-steroid anti-inflammatory drugs* (NSAIDs). Ubat ini membantu mengurangkan kesakitan dan keradangan.

Sebelum menggunakan Roxim capsule

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Roxim Capsule jika anda:

- alahan terhadap piroxicam dan ramuan-ramuan lain Roxim capsule.
- mempunyai sejarah reaksi alahan (bengkak mata atau mulut, sesak nafas, ruam) kepada ubat-ubat penahan sakit yang serupa seperti aspirin, ibuprofen atau ubat NSAIDs yang lain.

- Sebelum menggunakan Roxim capsule

- Beritahu doktor sebelum memulakan rawatan.
- Jika anda mempunyai atau pernah mempunyai masalah ulser, pendarahan dan penembusan pada perut dan usus.
 - Jika terdapat masalah jantung, hati atau ginjal.
 - Jika usia meningkat.
 - Jika minum alkohol.
 - Jika anda menghadapi penyakit tekanan darah tinggi.
 - Jika anda menghadapi dispepsia (Ketidakselesaan pada bahagian epigastik disebabkan oleh masalah pencernaan).
 - Roxim capsule mungkin menyebabkan tindakbalas kulit serius seperti *exfoliative dermatitis*, *toxic epidermal necrolysis*, *Steven-Johnson Syndrome*. Simptom ialah kulit melepuh dan mengelupas, yang

merupakan tanda-tanda keadaan serius. Jika keadaan ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

- Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan. Sesetengah ubat dan Roxim Capsule boleh bertindak balas antara satu sama lain. Ini termasuk:
- diuretik ("pil air") seperti furosemide.
 - ubat tahan sakit seperti aspirin, non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) seperti ibuprofen.
 - ubat untuk kemurungan seperti lithium.
 - ubat untuk menghentikan pembekuan darah (seperti warfarin dan heparin).

Cara menggunakan Roxim capsule

- Berapa banyak harus digunakan

Dos tunggal 20mg setiap hari. Sila ikut arahan doktor anda.

- Bila perlu digunakan

Roxim capsule diambil mengikut arahan doktor. Jika tidak pasti, semak semula dengan doktor atau ahli farmasi.

- Berapa lama perlu digunakan

Perlu mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi. Tempoh penggunaan Roxim Capsule adalah tidak melebihi 14 hari berturut-turut.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan(terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan ketidakselesaan pada perut dan usus.

Semasa menggunakan Roxim capsule

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda

bahawa anda sedang menggunakan Roxim capsule.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi ubat ini kepada sesiapa yang mempunyai tanda-tanda penyakit yang serupa, kerana mungkin mendatangkan mudarat.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati ketika memandu kenderaan atau mengendalikan mesin sehingga anda mengetahui kesan Roxim capsule terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

Gangguan perut dan usus, pening, ulser perut, pendarahan perut dan usus, sakit kepala, mengantuk, gangguan penglihatan, ruam kulit atau gatal-gatal kulit dan bunyi berdengung. Sesetengah kesan sampingan mungkin serius dan memerlukan perhatian segera. Ini biasanya lebih membimbangkan dengan penggunaan ubat ini untuk jangka masa panjang dan biasanya tidak bermasalah dengan penggunaan jangka masa pendek atau penggunaan sekali-sekala. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami kesan-kesan sampingan yang berikut:

- sakit dada
 - najis yang hitam dan melekit
- Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Roxim capsule

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin dan kering, bawah 30°C. Jauhkan daripada cahaya. Jauhkan daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Roxim capsule 10: Kapsul warna merah manggis dan biru pucat.

Roxim capsule 20: Kapsul warna merah manggis.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: piroxicam

- Bahan tidak aktif: cornstarch, lactose monohydrate, magnesium stearate, talc, croscarmellose sodium dan colloidal silicon dioxide.

- Nombor MAL:

Roxim capsule 10: MAL19950261AZ

Roxim capsule 20: MAL19950262AZ

Pengilang dan Pemegang pendaftaran keluaran

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.

1505, Lorong Perusahaan Utama 1

Taman Perindustrian Bukit Tengah

14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang

Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

03/06/2025

Nombor siri

BPFK(R4/1)030615/00140