

ZADIMIN SYRUP

Ketotifen hydrogen fumarate 1mg/5ml

What is in this leaflet

- What is *Zadimin* used for
- How *Zadimin* work
- Before you use *Zadimin*
- How to take *Zadimin*
- While you are using *Zadimin*
- Side effects
- After using *Zadimin*
- Product description
- Manufacturer
- Marketing authorization holder
- Date of revision

What *Zadimin* is used for

Long term prevention of all forms of asthma, allergic inflammation of airways, asthmatic symptoms associated with hay fever. Prevention or treatment of other allergies, allergic rhinitis and allergic skin reactions.

How *Zadimin* work

Ketotifen has antiallergic properties and has been used similarly to sodium cromoglycate in the preventive treatment of asthma. It also has the properties of an antihistamine.

Before you use *Zadimin*

When you must not take it

If you are allergic to the drug.

Before you start to take it

Zadimin may increase the effects of central nervous system depressants, antihistamines and alcohol. Care should therefore be exercised when driving a vehicle, operating machinery, etc. Blood platelets counts should be carried out if you are taking medication for diabetes.

Taking other medications

This drug may increase the effects of central nervous system depressants, antihistamines and alcohol. Drugs used to treat asthma should never be withdrawn abruptly when long term treatment with *Zadimin* is begun.

How to take *Zadimin*

How much to take

Adult: 1 – 2 teaspoonfuls twice daily. In susceptible patients, start with ½ teaspoonful twice daily.

Children: more than 3 years old: 1

teaspoonful twice daily. 6 months to 3 years: ½ teaspoonful twice daily.

When to take it

Take ketotifen exactly as your doctor has told you.

How long to take it

You should check with your doctor or pharmacist.

If you forget to take it

Do not take a double dose to make up for a forgotten tablet.

If you take too much (overdose)

Signs of overdose include include abdominal pain, nausea, vomiting, tiredness and drowsiness. A syndrome of coma, increased blood levels of potassium with irregular heartbeats, high body temperature and respiratory & renal failure was reported following major overdosage. For treatment of overdose, consult doctor immediately if symptoms exist.

While you are using *Zadimin*

Things you must do

Inform doctor of medications you are taking. Check with doctor before discontinuing medication.

Things you must not do

You must take your medication as directed.

Things to be careful of

Although there is no evidence of any risks to unborn baby, *Zadimin* should be given to pregnant and nursing women only under compelling circumstances.

Side effects

Increased appetite and weight gain have been reported. A reversible fall in the platelet count has been observed in a few patients receiving ketotifen concomitantly with oral antidiabetic agents and it has been suggested that this combination should be avoided. Sedation and rarely dry mouth or slight dizziness may occur at the beginning of treatment but usually disappear spontaneously with continued medication.

After using *Zadimin*

Storage

Store in cool, dry place below 30°C. Protect from light. Keep out of reach of children.

Disposal

Do not dispose via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required.

Product description

What it looks like

Plain, banana flavoured syrup.

Ingredients

ketotifen hydrogen fumarate, liquid glucose, methyl parabens, propyl parabens, banana flavour, purified water and syrup.

MAL NO: MAL19970977A

Manufacturer

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.

1505, Lorong Perusahaan Utama 1

Taman Perindustrian Bukit Tengah

14000 Bukit Mertajam, Penang, Malaysia.

Date of revision

17-04-2012

Marketing Authorization Holder

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.

Penang, Malaysia.

ZADIMIN SYRUP

Ketotifen hydrogen fumarate 1mg/5ml

Apakah yang ada pada risalah ini

- Apakah kegunaan *Zadimin*
- Bagaimana *Zadimin* berfungsi
- Sebelum mengambil *Zadimin*
- Cara menggunakan *Zadimin*
- Semasa menggunakan *Zadimin*
- Kesan-kesan sampingan
- Cara penyimpanan dan pelupusan *Zadimin*
- Maklumat lanjut
- Pengilang
- Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Zadimin*

Untuk pencegahan jangka panjang semua jenis penat, keradangan akibat alahan saluran pernafasan, tanda-tanda penat berkaitan dengan resdung. Rawatan atau pencegahan semua jenis alahan, dan alahan kulit.

Bagaimana *Zadimin* berfungsi

Ketotifen mempunyai sifat-sifat antialergi dan pernah digunakase seperti natrium kromoglikat dalam rawatan pencegahan penat. Ia juga mempunyai sifat-sifat antihistamin.

Sebelum mengambil *Zadimin*

Bila tidak boleh mengambil

Jikalau ada kesan alergi kepada ubat ini.

Sebelum mula mengambil

Zadimin mungkin meningkatkan kesan ubat depresi system saraf pusat, antihistamin dan alkohol. Harus berhati-hati semasa memandu, mengendalikan mesin dan lain-lain. Kiraan platelet darah patut dimonitor sebelum memulakan rawatan, jika diambil bersama dengan ubat untuk rawatan kencing manis.

Jika mengambil ubat-ubat lain *Zadimin* mungkin meningkatkan kesan ubat depresi system saraf pusat, antihistamin dan alkohol.. Ubat untuk rawatan penat tidak boleh diberhentikan serta-merta apabila rawatan jangka panjang *Zadimin* dimulakan.

Cara menggunakan *Zadimin*

Berapa banyak harus diambil

Dewasa: 1 – 2 camca teh dua kali sehari. Untuk pesakit yang berisiko, mula dengan ½ camca teh dua kali sehari.

Kanak-kanak lebih daripada 3 years: 1 camca teh dua kali sehari. 6 bulan – 3 tahun: ½ camca teh dua kali sehari.

Bila perlu diambil

Amil ketotifen mengikut arahan oleh doktor.

Berapa lama perlu diambil

Perlu mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

Jika terlupa mengambil

Jangan mengambil dos berganda sebagai gantian dos yang terlepas.

Jika mengambil berlebihan(terlebih dos)

Tanda-tanda lebih dos ialah sakit abdomen, loya, muntah, keletihan dan mengantuk. Tanda koma, peningkatan kalium darah dengan denyutan nadi tak seragam, suhu badan tinggi dan kegagalan hati dan ginjal pernah jadi dengan lebih dos yang serius. Hubungi doktor dengan segera jika berlaku lebih dos.

Semasa menggunakan *Zadimin*

Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor ubat yang sedang diambil.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Pengambilan ubat mestilah seperti yang diarahkan.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Walaupun tiada bukti menunjukkan kesan risiko *Zadimin* pada bayi, ia hanya digunakan pada wanita hamil atau menyusui dalam keadaan terdesak.

Kesan-kesan sampingan

Peningkatan selera makan dan berat badan dilaporkan. Penurunan bilangan platelet darah untuk pesakit yang menerima ketotifen bersama dengan ubat kencing manis. Gabungan kedua-dua ubat ini harus dielakkan. Kesan mengantuk, mulut kering atau pening mungkin berlaku pada awal rawatan tetapi akan hilang dalam rawatan seterusnya.

Cara penyimpanan dan pelupusan *Zadimin*

Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin dan kering, bawah 30°C. Jauhkan dari cahaya. Jauhkan dari kanak-kanak.

Pelupusan

Jangan dibuang dalam air sisa atau sisa buangan. Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang ingin dibuang.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Sirap tanpa warna perisa pisang.

Bahan-bahan kandungan

ketotifen hidrogen fumarat, glukos cair, metil paraben, propil paraben, perisa pisang, air dan sirap.

MAL NO: MAL19970977A

Pengilang

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
1505, Lorong Perusahaan Utama 1
Taman Perindustrian Bukit Tengah
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

17-04-2012

Pemegang pendaftaran keluaran

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
Pulau Pinang, Malaysia.