

BEVARATE-N

(betamethasone 0.1% w/w and neomycin 0.5% w/w)

15gmc^{cream}

Indication : Dermatitis (including *seborrheic dermatitis*, *lichen simplex* and *lichen planus*), eczema (including *atopic* and *discoid eczema*), *psoriasis*, insect bites, *anal/genital intertrigo* and other inflammatory skin conditions, where corticosteroid is indicated and bacterial infection is present or suspected.

Application : Apply sparingly to affected area 2-3 times daily. Upon improvement, application is reduced to once daily or less. Duration is less than 7 days unless under medical supervision. For children, duration is limited to less than 5 days.

Kegunaan : Dermatitis (termasuk *seborrheic dermatitis*, *lichen simplex* dan *lichen planus*), ekzema (termasuk *atopic* dan *discoid eczema*), *psoriasis*, gigitan serangga, *anal/genital intertrigo* dan keadaan inflamatori kulit lain, di mana corticosteroid diperlukan dan jangkitan bakteria wujud atau disyaki.

Cara guna : Sapu di bahagian berkenaan 2-3 kali sehari. Bila beransur baik, ia dikurangkan ke sekali sehari atau kurang. Jangka rawatan kurang daripada 7 hari kecuali diarahkan. Untuk kanak-kanak, jangka rawatan kurang daripada 5 hari.

Please refer enclosed leaflet for further details

Contents:

Betamethasone 17-valerate
(eq. to betamethasone 0.1%).. 0.12% w/w

Neomycin sulphate 0.5% w/w

Preservative: Chlorocresol 0.1% w/w

Store in a cool, dry place at 30°C. Protect from light.
Simpan di tempat yang dingin dan kering pada 30°C.
Jauhkan dari cahaya.

**KEEP AWAY FROM CHILDREN
JAUHKAN DARI KANAK-KANAK**

**FOR EXTERNAL USE ONLY
UNTUK KEGUNAAN LUAR SAHAJA**

Controlled Medicine

Reg. No : MAL06061318AZ

X
X
X
X



Manufactured & Distributed by:

PRIME PHARMACEUTICAL SDN. BHD.

1505, Lorong Perusahaan Utama 1, Taman Perindustrian Bukit Tengah,
14000 Bukit Mertajam, Penang, Malaysia.

XXXX – No. kelompok, tarikh dikilang dan tarikh luput akan tertera pada hujung tiub semasa pengisian tiub oleh mesin.