

PRI-CALCIUM TABLETS

Calcium lactate (300mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pri-calcium
2. Bagaimana Pri-calcium berfungsi
3. Sebelum menggunakan Pri-calcium
4. Cara menggunakan Pri-calcium
5. Semasa menggunakan Pri-calcium
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Pri-calcium
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Pri-calcium

Ia digunakan sebagai suplemen untuk wanita hamil, ibu yang menyusukan anak dan selepas putus haid, kekurangan kalsium dan keadaan yang memerlukan lebih pengambilan kalsium.

Bagaimana Pri-calcium berfungsi

Kalsium diperlukan untuk proses dalam badan, seperti saraf, pengecutan otot jantung dan badan, fungsi buah pinggang, pernafasan, pembekuan darah dan fungsi-fungsi lain.

Sebelum menggunakan Pri-calcium

- Bila tidak boleh menggunakan
Jangan mengambil Pri-calcium:
- jika ada alahan kepada calcium lactate atau bahan-bahan dalam tablet.
- jika terdapat kandungan kalsium tinggi dalam darah, batu karang dalam buah pinggang dan denyutan jantung tak teratur.
- Sebelum menggunakan Pri-calcium
- Berhati-hati jika terdapat masalah fungsi buah pinggang dan pernah mengalami batu karang dalam buah pinggang.
- Jika mengambil ubat-ubat lain
Beritahu doktor jika anda mengambil:
- antibiotik tetracycline. Tidak dinasihatkan mengambil kalsium dalam 1– 3 jam sebelum/selepas mengambil tetracycline.

Cara menggunakan Pri-calcium

- Berapa banyak harus digunakan
Dewasa: oral, satu hingga dua tablet tiga kali sehari dengan makanan atau seperti yang diperlukan.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Tablet diambil dengan makanan.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini seperti yang diarahkan oleh doktor.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan(terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Dos berlebihan mungkin mengakibatkan sembelit, sakit abdomen, lemah otot, kekeliruan dan batu karang dalam buah pinggang.

Semasa menggunakan Pri-calcium

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor. Maklumkan doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Pri-calcium. Beritahu doktor dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda. Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda. Jangan memberi Pri-calcium kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Ia tidak seharusnya diambil untuk jangka masa panjang tanpa nasihat pakar perubatan.

Kesan-kesan sampingan

Sembelit, gangguan gastro usus dan rasa kapur mungkin berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Pri-calcium

- Penyimpanan

Simpan di tempat dingin dan kering, bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya. Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bulat warna putih dan bergaris pada satu permukaan,

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: calcium lactate
- Bahan tidak aktif: lactose monohydrate, cornstarch, polyvinylpyrrolidone, magnesium stearate, perisa strawberi dan microcrystalline cellulose.

- Nombor MAL

MAL19912089X

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
1505, Lorong Perusahaan Utama 1
Taman Perindustrian Bukit Tengah
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

17/06/2020

Nombor Siri

NPRA(R4/1)181218/00376