

PHENYLIN SYRUP

Brompheniramine maleate 2mg/5ml

Phenylephrine hydrochloride 5mg/5ml

Apakah yang ada pada risalah ini

- Apakah kegunaan *Phenylin*
- Bagaimana *Phenylin* berfungsi
- Sebelum menggunakan *Phenylin*
- Cara menggunakan *Phenylin*
- Semasa menggunakan *Phenylin*
- Kesan-kesan sampingan
- Cara penyimpanan dan pelupusan *Phenylin*
- Maklumat lanjut
- Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
- Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Phenylin*

Untuk melegakan kesesakan hidung akibat selesema dan keadaan alahan, terutama sekali **rinitis**.

Bagaimana *Phenylin* berfungsi

Brompheniramine maleate adalah antihistamin yang memberikan kesan mengantuk. Ia digunakan untuk melegakan tanda-tanda alahan seperti **rinitis** dan **konjunktivitis**. Ia adalah ramuan yang biasa dalam ubat batuk dan selesema. *Phenylephrine hydrochloride* adalah ubat yang melegakan **kesesakan** hidung dan menyenangkan pernafasan.

Sebelum menggunakan *Phenylin*

Bila tidak boleh menggunakan Alahan kepada ramuan-ramuan *Phenylin*. Ia juga tidak sesuai dalam rawatan asma.

Sebelum mula menggunakan

Ia tidak boleh digunakan untuk kanak-kanak di bawah 2 tahun. Awas penggunaannya untuk kanak-kanak 2 hingga 6 tahun. Awas semasa memandu atau mengendalikan kerja-kerja yang memerlukan perhatian kerana kemungkinan berlakunya pening. Jauhi daripada minuman beralkohol.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda sedang menggunakan sebarang ubat lain, termasuk *alcohol*, *barbiturates*, *tricyclic antidepressants*, *narcotic analgesics*, *monoamine oxidase (MAO) inhibitors* atau *atropine* yang mungkin menambahkan kesan ubat. Juga termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan *Phenylin*

Berapa banyak harus diambil

Dewasa: 2 **sudu** teh (10ml) setiap 4 – 6 jam. Kanak-kanak: 6 – 12 tahun: 1 **sudu** teh (5ml) setiap 4 – 6 jam. Kanak-kanak: 2 – 6 tahun: ½ **sudu** teh (2.5ml) setiap 4 – 6 jam.

Bila perlu digunakan

Perlu mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan *Phenylin* untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda lupa menggunakan ubat ini. Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

Jika mengambil berlebihan(terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan *Phenylin*

Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor ubat yang sedang diambil.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Pengambilan ubat mestilah seperti yang diarahkan.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Jikalau hamil atau menyusukan anak semasa rawatan, *Phenylin* tidak sepatutnya diambil.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Phenylin* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan paling biasa ialah depresi sistem saraf pusat, termasuk rasa lesu, pening dan ketakselarasan yang mungkin hilang selepas rawatan beberapa hari. Kesan-kesan seperti sakit kepala, mulut kering, **rembesan pekat saluran pernafasan**, kabur penglihatan, retensi kencing, sembelit dan masalah gastrik seperti loya, muntah, cirit atau sakit ulu hati. Alahan dan ruam mungkin berlaku. Pendarahan atau lebam pernah dilaporkan. Kesan-kesan lain termasuk konvulsi, peluh, sakit otot, tremor, gangguan tidur, depresi, kekeliruan, telinga berdesing, tekanan darah rendah dan rambut gugur. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumers → Reporting)

Cara penyimpanan dan pelupusan *Phenylin*

Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin dan kering, bawah 30°C. Jauhkan dari cahaya. Jauhkan dari kanak-kanak.

Pelupusan

Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang ingin dibuang.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Sirap warna biru dan rasa anggur.

Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: *brompheniramine maleate* dan *phenylephrine hydrochloride*.

- Bahan tidak aktif: glukos cair, pewarna biru, *sodium benzoate*, perasa anggur, asid sitrik, *sodium citrate*, air dan sirap.

MAL NO: MALXXXXXXXXXA

Pengilang dan Pemegang

Pendaftaran Keluaran

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
1505, Lorong Perusahaan Utama 1
Taman Perindustrian Bukit Tengah
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini

19-08-2014