

AMMELTZ YOKO YOKO

Methyl Salicylate / Menthol / Camphor (5% w/v / 5.2% w/v / 5.2%w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Ammeltz Yoko Yoko
2. Bagaimana Ammeltz Yoko Yoko berfungsi
3. Sebelum menggunakan Ammeltz Yoko Yoko
4. Cara menggunakan Ammeltz Yoko Yoko
5. Semasa menggunakan Ammeltz Yoko Yoko
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Ammeltz Yoko Yoko
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Ammeltz Yoko Yoko

Ketegangan, sakit otot, sakit sendi, lenguh anggota badan, lebam, terseliuh, sakit pinggang dan (bengkak kecil yang gatal yang disebabkan oleh kesejukan).

Bagaimana Ammeltz Yoko Yoko berfungsi

Ammeltz Yoko Yoko mengandungi bahan-bahan aktif berikut iaitu methyl salicylate, menthol dan camphor (kapur barus).

Methyl salicylate ialah analgesik topikal (penahan sakit) manakala menthol dan kapur barus mempunyai kesan penyejukan pada kulit yang mengalihkan tumpuan anda daripada rasa sakit pada otot dan sendi anda.

Sebelum menggunakan Ammeltz Yoko Yoko

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan ubat ini jika :

-anda mempunyai alahan terhadap Methyl salicylate, Menthol, Camphor atau mana-mana bahan yang lain di dalam ubat ini (disenaraikan dalam maklumat lanjut).

-bayi di bawah 2 tahun.

-Sebelum mula menggunakan Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor anda jika anda

mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Berhati-hati semasa menggunakan ubat ini jika anda mengambil warfarin. (Sapuan berlebihan boleh meningkatkan risiko pendarahan)

Cara menggunakan Ammeltz Yoko Yoko

Gunakan untuk orang dewasa & kanak-kanak berumur 2 tahun ke atas.

Untuk kegunaan luaran sahaja.

-Berapa banyak harus digunakan

Sapukan pada kawasan yang sakit dengan secukupnya.

-Bila perlu digunakan

Sapukan 2 hingga 3 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

-Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Ammeltz Yoko Yoko untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi.

-Jika terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan bantuan perubatan segera.

Semasa menggunakan Ammeltz Yoko Yoko

-Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doktor. Beritahu doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Ammeltz Yoko Yoko.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

Basuh tangan selepas menyapu ubat

untuk mengelakkan sebarang kerengsaan pada mata.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Elakkan daripada terkena pada mata. Bilas dengan air secukupnya jika terkena mata.

Jangan sapukan pada luka atau kulit yang rosak.

Jangan berikan Ammeltz Yoko Yoko kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Kulit mungkin akan kelihatan merah pada mulanya, terutama apabila digunakan oleh individu yang mempunyai kulit sensitif, tetapi ini akan segera hilang.

Elakkan sapuan terus ke dalam lubang hidung kanak-kanak. Ini adalah kerana ubat ini mengandungi kapur barus. Walaupun kuantiti yang sedikit digunakan dengan cara ini boleh menyebabkan sawan. Perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak berumur 2 tahun ke atas apabila menggunakan ubat ini.

Kesan-kesan sampingan

Ruam, kemerahan, bengkak dan kegatalan mungkin berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Ammeltz Yoko Yoko

-Penyimpanan

-Jauhkan daripada cahaya dan api.

-Simpan pada suhu di bawah 30°C. Jauhi daripada kanak-kanak. Jangan gunakan Ammeltz Yoko Yoko selepas tarikh luput.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

AMMELTZ YOKO YOKO

Methyl Salicylate / Menthol / Camphor (5% w/v / 5.2% w/v / 5.2%w/v)

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Cecair jernih tidak berwarna yang berbau unik.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif

Methyl Salicylate, Menthol,
Camphor

-Bahan tidak aktif

Vanillylamide Nonylate, 8-
Acetylsucrose Denatured Alcohol (95
v/v %), Propylene Glycol, Purified
Water

-Nombor MAL:

MAL19973753X

Pengilang

SENDAI KOBAYASHI Pharmaceutical
Co., Ltd.

4-3, Matsusakadaira, Taiwa-cho,
Kurokawa-gun, Miyagi, Japan.

Pemegang Pendaftaran Produk

KOBAYASHI Healthcare (Malaysia)
Sdn. Bhd.

50-2-2A, Level 2, Wisma UOA
Damansara, No. 50 Jalan Dungun,
Damansara Heights, 50490 Kuala
Lumpur, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

-03/03/2023

Nombor Siri

NPRA(R4/1)221122/00103