

Aziswift Tablets

Azithromycin 250mg

Azithromycin 500mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Aziswift Tablets
2. Bagaimana Aziswift Tablets berfungsi
3. Sebelum mengambil Aziswift Tablets
4. Cara mengambil Aziswift Tablets
5. Semasa mengambil Aziswift Tablets
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Aziswift Tablets
8. Maklumat Lanjutan
9. Pengilang and Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini

1. Apakah kegunaan Aziswift Tablets

Aziswift Tablets digunakan dalam situasi apabila jangkitan bakteria disebabkan oleh 'mikro-organisma' yang sensitif terhadap azithromycin:

- Jangkitan dada, tekak atau hidung (seperti bronkitis, radang paru-paru, tonsillitis, sakit tekak dan sinusitis)
- Jangkitan telinga
- Jangkitan kulit dan tisu lembut
- Jangkitan uretra serviks yang disebabkan oleh *Chlamydia trachomatis* (bakteria).

2. Bagaimana Aziswift Tablets berfungsi

Azithromycin adalah sejenis ubat antibiotik. Ia tergolong didalam kumpulan ubat antibiotik yang dipanggil 'macrolides'.

3. Sebelum mengambil Aziswift Tablets

Bila tidak boleh mengambil

- anda alah (hipersensitif) terhadap azithromycin dihydrate, erythromycin atau sebarang bahan kandungan ubat ini (tersenarai di seksyen 8)
- anda alah (hipersensitif) terhadap sebarang ubat antibiotik dalam

kumpulan *macrolide* atau *ketolide*.

- Jangan mengambil ubat ini jika ianya berkaitan dengan anda. Jika anda tidak pasti, hubungi doktor anda atau ahli farmasi sebelum mengambil Aziswift Tablets.

Sebelum mula mengambil

Patuhi semua arahan yang diberikan oleh doktor anda dengan teliti, walaupun ianya berbeza dengan maklumat yang terkandung di dalam risalah ini.

Jika mengambil ubat-ubatan lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil, akan mengambil atau telah mengambil ubat-ubatan lain baru-baru ini.

Antasid

digunakan untuk pedih ulu hati dan senak. Aziswift Tablets perlu diambil sekurang-kurangnya 1 jam sebelum atau 2 jam selepas mengambil ubat antasid.

Fluconazole

digunakan untuk merawat jangkitan kulit

Zidovudine atau nelfinavir

digunakan untuk merawat jangkitan HIV.

Rifabutin

digunakan untuk merawat batuk kering (TB)

Terfenadine

digunakan untuk merawat demam alergi

Cimetidine

digunakan dalam rawatan pedih ulu hati dan ulser perut

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda ada mengambil mana-mana ubat yang berikut. Aziswift Tablets boleh meningkatkan kesan ubat-ubatan lain yang diambil. Doktor mungkin perlu menukar sukatan dos anda:

Derivatif *Ergotamine* digunakan untuk migrain

Digoxin

digunakan untuk merawat masalah jantung

Warfarin atau ubat-ubatan yang serupa digunakan sebagai pencair darah.

Cyclosporin

digunakan untuk menghentikan penolakan terhadap pemindahan organ.

Theophylline

digunakan untuk masalah pernafasan seperti asma dan penyakit paru-paru kronik (COPD).

Trimethoprim / sulfamethoxazole

digunakan untuk merawat jangkitan

Atorvastatin

digunakan untuk merawat kolesterol tinggi

Carbamazepine

digunakan untuk merawat serangan epilepsi dan sakit saraf

Cetirizine

digunakan dalam rawatan demam alergi, alahan, angioedema, dan kegatalan kulit

Didanosins

digunakan untuk merawat HIV

Efavirenz, Indinavir

digunakan bersama-sama dengan ubat-ubatan lain untuk merawat HIV

Methylprednisolone

digunakan untuk merawat keadaan seperti alahan, arthritis, penyakit *lupus* dan penyakit keradangan usus

Sildenafil

digunakan untuk merawat disfungsi erektile

Triazolam, midazolam (sedatif)

Aziswift Tablets

Azithromycin 250mg

Azithromycin 500mg

4. Cara mengambil Aziswift Tablets

Berapa banyak harus diambil

Dewasa dengan berat badan 45 kg dan ke atas:

Jumlah dos biasa ialah 1500 mg. Ia boleh diambil dengan dua cara. Doktor anda akan memberitahu anda cara untuk mengambilnya:

- Selama tiga hari: sebiji tablet 500 mg diambil setiap hari.
- atau
- Selama lima hari: sebiji tablet 500 mg pada hari pertama dan kemudian sebiji tablet 250 mg pada hari ke- 2, 3, 4 dan 5. Dos pengambilan akan berbeza jika anda mempunyai masalah radang pada saluran pundi kencing atau saluran yang menghubungkan rahim ke vagina (serviks). Doktor anda akan mencadangkan anda untuk mengambil dos tunggal sebanyak 1000 mg.

Kanak-kanak dan remaja dengan berat badan di bawah 45 kg:

Penggunaan tablet ini tidak disyorkan. Mereka yang mempunyai berat badan kurang daripada 45 kg boleh mengambil ubat ini dalam bentuk cecair contohnya *azithromycin suspension*.

Pesakit dengan masalah buah pinggang atau hati

Anda perlu memaklumkan kepada doktor jika anda mempunyai masalah buah pinggang atau hati kerana doktor anda mungkin perlu mengubah sukatan dos anda.

Bila perlu diambil

Patuhi pengambilan ubat ini mengikut arahan doktor. Hubungi doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti mengenainya.

Cara pengambilan ubat ini

- Telan tablet dengan segelas air minuman.
- Jangan hancurkan atau mengunyah tablet.
- Tablet 500 mg tablet boleh dibelah

dua.

Berapa lama perlu diambil

Doktor atau ahli farmasi anda akan memaklumkan berapa lama anda perlu terus mengambil ubat ini. Anda perlu berjumpa dengan doktor anda dari semasa ke semasa untuk membolehkannya memantau keadaan penyakit anda.

Jika terlupa mengambil

- Jika anda terlupa mengambil satu dos, ambil dos tersebut sebaik sahaja anda teringat.
- Tetapi, jika ia telah hampir dengan dos yang seterusnya, langkau dos yang tertinggal tersebut.
- Jangan gantikan dos anda untuk menggantikan dos yang tertinggal.
- Jika anda perlu melangkau satu dos, teruskan mengambil semua tablet mengikut waktu yang ditetapkan. Ini bermakna tempoh rawatan anda akan berakhir lewat sehari.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil Aziswift Tablets lebih daripada yang sepatutnya, hubungi doktor anda atau kunjungi hospital yang berdekatan dengan segera. Bawa kotak ubat bersama-sama dengan anda.

5. Semasa mengambil Aziswift Tablets

Perkara yang perlu dilakukan

Patuhi semua arahan yang telah diberikan oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dengan maklumat yang terdapat di dalam risalah ini.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Pengambilan Azithromycin tidak disyorkan sekiranya anda sedang hamil atau merancang untuk hamil. Azithromycin hanya boleh digunakan ketika hamil sekiranya ia sangat diperlukan. Penyusuan bayi semasa pengambilan Azithromycin tidak digalakkan, kerana risiko kepada bayi yang disusukan tidak

boleh dikecualikan. Minta nasihat doktor anda sebelum mengambil sebarang ubat. Jika ubat anda menyebabkan rasa mengantuk atau mempunyai kesan sampingan yang menjejaskan daya tumpuan anda, jangan memandu kenderaan atau mengendalikan mesin.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Maklumkan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Aziswift Tablets jika:

- anda mempunyai masalah hati: doktor anda mungkin perlu memantau fungsi hati anda atau menghentikan rawatan.
- anda mempunyai masalah buah pinggang yang teruk.
- anda mempunyai masalah jantung yang teruk atau masalah denyutan jantung seperti sindrom QT yang panjang (mengikut bacaan pada kardiogram elektro atau mesin ECG)
- tahap kalium atau magnesium dalam darah terlalu rendah
- anda mengalami tanda-tanda jangkitan yang lain
- anda mengalami masalah saraf (neurologikal) atau masalah kesihatan mental (psikatrik)

6. Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Berhenti mengambil Aziswift Tablets dan jumpa doktor dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan yang serius berikutnya.

- Gangguan darah
- Kehilangan pendengaran
- Cirit-birit, loya, gangguan pencernaan, sakit perut, pedih hulu hati, perut kembung, sembelit
- Hilang selera makan
- Sakit kepala, pening, insomnia
- Perubahan dalam deria rasa
- Ruam kulit, kegatalan, edema
- Sakit sendi

Aziswift Tablets

Azithromycin 250mg

Azithromycin 500mg

- Jaundis, hepatitis
- degupan jantung yang tidak teratur
- Keletihan dan berasa lemah

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda mendapat sebarang kesan sampingan hubungi doktor atau ahli farmasi.

Ia merangkumi sebarang kesan sampingan yang mungkin tidak tersenarai di dalam risalah ini. Doktor anda mungkin akan mengurangkan dos atau menghentikan rawatan.

Aziswift Tablets boleh menyebabkan alahan yang teruk dan tindak balas kulit yang serius.

Berhenti menggunakan Aziswift Tablets dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami mana-mana gejala berikut:

- kemerahan kulit, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata

Jika anda perasan kanak-kanak itu muntah dan/atau kerengsaan semasa menyusu berlaku, hubungi doktor dengan segera kerana ia mungkin disebabkan oleh *Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis* (IHPS).

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers* → *Reporting*).

7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan Aziswift Tablets

- Simpan ubat ini pada suhu dibawah 30°C. Jauhi ubat daripada kanak-kanak.
- Produk ini tidak memerlukan tempat penyimpanan yang khas.

Jangan guna ubat ini selepas tarikh luput yang dicetak pada label (EXP). Tarikh luput yang dinyatakan merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

Jangan lupuskan sebarang ubat- ubatan melalui sistem air buangan atau buangan

isi rumah. Tanya ahli farmasi cara untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Kaedah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

8. Maklumat Lanjutan

Rupa dan warna produk **Aziswift 250mg Tablets**

Tablet bujur bersalut, berwarna putih ke putih pudar, bertanda 'AZ' dan '250' pada satu permukaan dan kosong pada permukaan yang lain..

Aziswift 500 mg Tablets Tablet bujur bersalut, berwarna putih ke putih pudar, bertanda 'AZ' dan '500' serta tanda belahan pada satu permukaan dan kosong pada permukaan yang lain.

Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif: *Azithromycin dihydrate*

Bahan tidak aktif:

Calcium Hydrogen Phosphate Anhydrous Ph. Eur., Croscarmellose Sodium Ph. Eur., Starch Pregelatinised Ph. Eur., Hypromellose Ph. Eur., Sodium Lauryl Sulfate Ph. Eur., Magnesium Stearate Ph. Eur., Opadry white, Purified Water Ph Eur.

Nombor MAL

Aziswift 250mg Tablets:
MAL16035024ACZ

Aziswift 500 mg Tablets:
MAL16035025ACZ

9. Pengilang and Pemegang Pendaftaran Produk

Pengilang

Jubilant Generics Ltd.,
Village Sikandarpur Bhainswal, Roorkee-Dehradun Highway, Bhagwanpur, Roorkee, District Haridwar, Uttarakhand 247 661, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Generic Health Sdn. Bhd.
Upper Penthouse, Wisma RKT, No. 2,
Jalan Raja Abdullah,

Off Jalan Sultan Iismail,
50300, Kuala Lumpur, Malaysia

10. Tarikh kemaskini

06/12/2023

Nombor Siri:

NPRA(R2/1)240517/1274