

RINVOQ® 15 mg, 30mg & 45mg Extended-Release Film Coated Tablets

Upadacitinib (15 mg, 30mg, 45mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan RINVOQ®
2. Bagaimana RINVOQ® berfungsi
3. Sebelum menggunakan RINVOQ®
4. Cara menggunakan RINVOQ®
5. Semasa menggunakannya
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan RINVOQ®
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan RINVOQ®

RINVOQ® digunakan untuk merawat orang dewasa dengan penyakit di bawah:

- *Rheumatoid arthritis* pada peringkat sederhana hingga teruk. *Rheumatoid arthritis* adalah penyakit yang menyebabkan keradangan sendi.
- *Active psoriatic arthritis*. *Psoriatic Arthritis* adalah penyakit yang menyebabkan keradangan sendi dan psoriasis.
- *Non-radiographic axial spondyloarthritis*. *Non-radiographic axial spondyloarthritis* adalah penyakit yang menyebabkan keradangan tulang belakang.
- *Active ankylosing spondylitis*. *Ankylosing spondylitis* adalah penyakit yang menyebabkan keradangan tulang belakang.
- *Giant cell arteritis*. *Giant cell arteritis* adalah penyakit yang menyebabkan keradangan saluran darah yang umumnya mempengaruhi arteri sederhana

dan besar di kepala, leher, dan lengan.

- *Ulcerative colitis*. *Ulcerative colitis* adalah penyakit keradangan pada usus besar. RINVOQ® digunakan untuk merawat *Ulcerative colitis* pada orang dewasa yang tidak bertindakbalas atau bertoleransi terhadap rawatan sebelumnya
- *Crohn's disease*. *Crohn's disease* adalah penyakit keradangan pada sebahagian saluran penghadaman tetapi paling kerap pada usus. RINVOQ® digunakan untuk merawat *Crohn's disease* pada orang dewasa yang tidak bertindakbalas atau bertoleransi terhadap rawatan sebelumnya

RINVOQ® digunakan untuk merawat orang dewasa dan remaja yang berumur melebihi 12 tahun dengan penyakit *atopic dermatitis*, yang mana ianya juga dikenali sebagai eczema atopik pada tahap sederhana hingga teruk. RINVOQ® boleh digunakan dengan ubat lain yang disapu pada kulit atau digunakan secara tunggal.

Bagaimana RINVOQ® berfungsi

RINVOQ® berfungsi dengan mengurangkan aktiviti enzim dalam badan yang dikenali sebagai *Janus kinase*.

Rheumatoid arthritis

RINVOQ® boleh membantu untuk mengurangkan kesakitan, kekejangan dan bengkak pada sendi, mengurangkan keletihan, serta membantu untuk memperlahankan kerosakan kepada tulang dan tulang rawan pada sendi. Kesan ini dapat memudahkan anda melakukan aktiviti

harian dengan normal dan meningkatkan kualiti hidup anda.

Psoriatic arthritis

RINVOQ® boleh membantu untuk mengurangkan kesakitan, kekejangan dan bengkak pada sendi, kesakitan dan kekejangan pada tulang belakang, ruam kulit psoriatik, dan keletihan, serta ia boleh memperlahankan kerosakan kepada tulang dan tulang rawan pada sendi. Kesan ini dapat memudahkan anda melakukan aktiviti harian dengan normal dan meningkatkan kualiti hidup anda.

Atopic Dermatitis

Pengambilan RINVOQ® boleh memperbaiki keadaan kulit anda dan mengurangkan kegatalan serta keradangan. RINVOQ® boleh mengurangkan simptom kesakitan, kegelisahan dan kemurungan yang biasa dirasa oleh pesakit dermatitis atopik. RINVOQ® boleh memperbaiki masalah tidur dan kualiti hidup keseluruhan.

Non-radiographic axial spondyloarthritis dan Ankylosing spondylitis

RINVOQ® membantu mengurangkan sakit belakang kekejangan dan keradangan pada tulang belakang. Kesan ini dapat memudahkan anda melakukan aktiviti harian dengan normal dan meningkatkan kualiti hidup anda.

Giant cell arteritis

RINVOQ® membantu mengawal tanda-tanda dan gejala *giant cell arteritis* termasuk sakit kepala, kelembutan kulit kepala, sakit rahang, dan keletihan. Kesan ini dapat membantu anda melakukan aktiviti

RINVOQ® 15 mg, 30mg & 45mg Extended-Release Film Coated Tablets

Upadacitinib (15 mg, 30mg, 45mg)

harian biasa dan meningkatkan kualiti hidup yang berkaitan dengan kesihatan anda.

Giant cell arteritis biasa dirawat dengan ubat-ubatan yang dipanggil steroid. Mereka biasanya berkesan, tetapi boleh menyebabkan kesan sampingan jika digunakan pada dos yang tinggi untuk tempoh yang lama. Mengurangkan dos steroid juga boleh menyebabkan suar *giant cell arteritis*. Menambah RINVOQ® kepada rawatan bermakna steroid boleh digunakan untuk tempoh yang lebih pendek, sementara masih mengawal *giant cell arteritis*.

Ulcerative colitis

RINVOQ® boleh membantu mengurangkan tanda dan simptom penyakit termasuk najis berdarah, kesakitan abdomen, dan keperluan kecemasan serta kekerapan pergi ke tandas. Kesan ini memudahkan anda melakukan aktiviti harian dan mengurangkan keletihan.

Crohn's disease

RINVOQ® boleh membantu mengurangkan tanda dan symptom penyakit termasuk keperluan kecemasan serta kekerapan pergi ke tandas, kesakitan abdomen dan keradangan pada lapisan usus. Kesan ini memudahkan anda melakukan aktiviti harian dan mengurangkan keletihan

Sebelum menggunakan RINVOQ® - Bila tidak boleh mengambil

- jika anda alah kepada upadacitinib atau mana-mana bahan lain dalam ubat ini. Simptom seperti ruam (*hives*), sesak nafas, rasa pening, bibir, lidah atau tekak bengkak mungkin disebabkan anda alah

kepada RINVOQ® seperti yang pernah dilihat pada sesetengah orang. Sebahagian reaksi ini mungkin serius. Jika anda mengalami simptom seperti yang dinyatakan, berhenti mengambil RINVOQ® dan dapatkan rawatan kecemasan dengan segera.

- jika anda mempunyai jangkitan yang teruk (seperti pneumonia atau jangkitan kulit bakteria)
- jika anda mempunyai tuberkulosis aktif (TB) jika anda mengalami masalah hati yang teruk
- jika anda hamil (lihat bahagian Kehamilan, menyusu dan kontrasepsi)

Kehamilan

RINVOQ®, tidak boleh diambil ketika hamil.

Menyusukan anak

Jika anda sedang menyusu atau merancang untuk menyusukan bayi, berbincang dengan doktor anda sebelum menggunakan ubat ini. Anda tidak boleh menggunakan RINVOQ® ketika sedang menyusukan anak kerana ianya tidak diketahui jika ubat ini akan masuk ke dalam susu ibu atau tidak. Berbincang dengan doktor anda untuk memutuskan samada anda boleh menyusukan anak atau mengambil RINVOQ®. Anda tidak boleh melakukan kedua-duanya.

Kontrasepsi

Jika anda seorang wanita yang berpotensi untuk hamil, anda harus menggunakan pencegah kehamilan yang berkesan untuk mengelakkan diri daripada hamil semasa mengambil RINVOQ® dan sekurang-kurangnya 4 minggu selepas dos terakhir RINVOQ®. Sekiranya anda hamil

dalam tempoh ini, sila berbincang dengan doktor anda dengan segera. Sekiranya anak anda mengalami tempoh haid pertama semasa mengambil RINVOQ®, anda seharusnya memberitahu dokternya.

- Sebelum mula mengambil

Berbincang dengan doktor, ahli farmasi atau jururawat anda sebelum dan semasa dalam rawatan menggunakan RINVOQ® jika:

- sedang mengalami sebarang jangkitan (demam, berpeluh, atau menggigil, sesak nafas, berasa hangat, kemerahan, sakit atau luka pada badan anda, keletihan, batuk, rasa pedih ketika buang air kecil atau membuang air kecil lebih kerap daripada biasa, sakit kepala dengan leher kejang), atau jika anda mempunyai sebarang jangkitan yang sering berulang - RINVOQ® boleh mengurangkan keupayaan badan untuk melawan jangkitan dan boleh menyebabkan jangkitan yang sedang anda alami menjadi lebih teruk, atau boleh menyebabkan anda lebih cenderung untuk mendapat jangkitan baru.
- pernah mengidap batuk kering (TB) atau telah berhubung rapat dengan pesakit batuk kering (TB). Doktor akan membuat ujian TB ke atas anda sebelum diberikan RINVOQ® dan mungkin akan membuat ujian semula semasa dalam rawatan.
- pernah mengalami jangkitan *herpes zoster* (kayap), kerana RINVOQ® mungkin menyebabkan ianya kembali. Beritahu doktor jika anda mengalami ruam kulit yang menyakitkan dengan kesan lepuh ketika dalam rawatan

RINVOQ® 15 mg, 30mg & 45mg Extended-Release Film Coated Tablets

Upadacitinib (15 mg, 30mg, 45mg)

- RINVOQ® kerana ini boleh menjadi tanda-tanda kayap.
- Pernah mengalami hepatitis B atau C
 - jika anda baru mengambil atau merancang untuk mengambil vaksin (imunisasi)- ini kerana vaksin hidup tidak digalakkan diambil semasa menggunakan RINVOQ®
 - sedang atau pernah mengalami kanser, anda merokok atau pernah merokok pada masa lalu - kerana doktor anda akan memutuskan sama ada anda masih boleh diberikan RINVOQ®
 - anda mempunyai risiko tinggi untuk mendapat kanser kulit, doktor anda mungkin mencadangkan langkah-langkah pencegahan seperti pemeriksaan kulit secara berkala ketika mengambil RINVOQ®. Berbincang dengan doktor anda jika anda mengalami luka baru atau terdapat sebarang perubahan pada kulit. Sesetengah pesakit yang menerima RINVOQ® telah mendapat kanser kulit.
 - anda mempunyai masalah jantung, tekanan darah tinggi, atau tahap kolestrol yang tinggi.
 - hati anda tidak berfungsi dengan baik seperti yang sepatutnya
 - anda pernah mempunyai darah beku di saluran darah kaki atau paru-paru. Beritahu doktor jika anda mengalami bengkak kaki yang sakit, sakit dada, sesak nafas kerana ini adalah tanda-tanda pembekuan darah dalam saluran darah.
 - anda mengalami masalah buah pinggang atau masalah buah pinggang yang semakin teruk.

- anda mengalami sakit perut (abdomen), sedang atau pernah mengalami *diverticulitis* (radang dan sakit pada lapisan usus) atau ulser pada perut atau usus, atau anda sedang mengambil ubat *non-steroidal anti-inflammatory*.
- anda kerap kali melihat tablet atau serpihan tablet di dalam najis.
- anda mempunyai penyakit kencing manis.

Anda perlu melakukan ujian darah sebelum atau semasa anda mengambil RINVOQ®. Ini bertujuan untuk memeriksa sama ada anda mempunyai jumlah sel darah merah rendah (anemia), kiraan sel darah putih rendah (neutropenia atau limfopenia), lemak dalam darah tinggi (kolesterol), atau tahap enzim hati yang tinggi. Ini adalah untuk memastikan rawatan menggunakan RINVOQ® tidak akan menimbulkan masalah.

- Mengambil ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil, ada pernah mengambil, atau mungkin akan mengambil ubat-ubatan lain. Ini kerana sesetengah ubat mungkin mengurangkan prestasi RINVOQ® atau mungkin meningkatkan peluang anda untuk mendapat kesan sampingan. Adalah sangat penting untuk berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil mana-mana ubat berikut:

- ubat-ubatan untuk jangkitan kulat (seperti *ketoconazole*, *itraconazole*, *posaconazole* atau *voriconazole*)
- ubat-ubatan untuk jangkitan bakteria (seperti *clarithromycin*)
- ubat-ubatan untuk merawat Cushing's syndrome (seperti *ketoconazole*)

- ubat-ubatan untuk merawat batuk kering (seperti *rifampicin*)
- ubat-ubatan untuk merawat serangan sawan (seperti *phenytoin*)
- ubat-ubatan yang memberi kesan kepada sistem imun anda (seperti *azathioprine*, *6-mercaptopurine*, *ciclosporin*, dan *tacrolimus*)
- ubat yang boleh meningkatkan risiko perforasi pada usus seperti ubat *non-steroidal anti-inflammatory* (biasanya digunakan untuk merawat sakit dan/ atau radang pada otot atau sendi), dan/ atau opioid (digunakan untuk sakit yang teruk), dan/ atau corticosteroid (biasanya digunakan untuk merawat keradangan).
- ubat-ubatan untuk merawat penyakit kencing manis. Doktor anda mungkin akan memutuskan sama ada anda perlu mengurangkan pengambilan ubat-ubatan untuk penyakit kencing manis semasa mengambil RINVOQ®.

Jika anda mengambil mana-mana ubat dalam senarai di atas atau anda tidak pasti, sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil RINVOQ®.

Cara menggunakan RINVOQ®

Untuk kegunaan oral sahaja.

- Berapa banyak harus digunakan

- **Sentiasa ambil ubat seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.** Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika terdapat sebarang keraguan.

- Bila perlu digunakan

Jika anda mengalami *rheumatoid arthritis*, *psoriatic arthritis*, *non-*

RINVOQ® 15 mg, 30mg & 45mg Extended-Release Film Coated Tablets

Upadacitinib (15 mg, 30mg, 45mg)

radiographic axial spondyloarthritis, ankylosing spondylitis, atau giant cell arteritis:

Dos yang dicadangkan adalah satu tablet 15 mg sekali sehari.

Jika anda mengalami atopic dermatitis:

Dewasa:

Dos yang disarankan adalah 15mg atau 30mg sekali sehari seperti yang diarahkan oleh doktor. Doktor anda boleh meningkatkan atau mengurangkan dos anda berdasarkan keberkesanan ubat.

Orang tua:

Sekiranya anda berumur melebihi 65 tahun, dos yang disarankan adalah 15mg sekali sehari.

Remaja (dari 12 ke 17 tahun) dengan berat badan sekurang-kurangnya 40kg:

Dos yang disarankan adalah 15mg sekali sehari.

Jika anda mengalami ulcerative colitis

Dos yang dicadangkan adalah 45mg sehari untuk 8 minggu. Doktor anda akan mengambil keputusan untuk memanjangkan dos 45mg untuk 8 minggu lagi (jumlah keseluruhan 16 minggu). Ini diikuti dengan 15mg atau 30mg sekali sehari untuk jangka masa panjang. Doktor anda akan mengambil keputusan untuk meningkatkan atau mengurangkan dos bergantung kepada tindakbalas anda kepada ubat ini.

Orang tua:

Sekiranya umur anda melebihi 65 tahun, dos yang disarankan adalah

15mg sekali sehari untuk jangka masa panjang.

Doktor mungkin mengurangkan dos anda sekiranya anda mengalami masalah buah pinggang, atau mengambil beberapa jenis ubat lain.

Jika anda mengalami Crohn's disease

Dos yang dicadangkan adalah 45mg sehari untuk 12 minggu. Ini diikuti dengan 15mg atau 30mg sekali sehari untuk jangka masa panjang. Doktor anda akan mengambil keputusan untuk meningkatkan atau mengurangkan dos bergantung kepada tindakbalas anda kepada ubat ini.

Orang tua:

Sekiranya umur anda melebihi 65 tahun, dos yang disarankan adalah 15mg sekali sehari untuk jangka masa panjang.

Doktor mungkin mengurangkan dos anda sekiranya anda mengalami masalah buah pinggang, atau mengambil beberapa jenis ubat lain.

Cara pengambilan:

- Tablet perlu ditelan sepenuhnya dengan air. Jangan pecahkan, hancurkan kunyah atau patahkan tablet kerana ini akan mengubah jumlah kandungan ubat yang masuk ke dalam badan.
- Bagi membantu anda untuk ingat mengambil RINVOQ®, ambil pada waktu yang sama setiap hari.
- Tablet boleh diambil bersama atau tanpa makanan.

- Berapa lama perlu digunakan

- Jangan berhenti mengambil RINVOQ® tanpa berbincang

dengan pakar kesihatan anda terlebih dahulu.

- Adalah penting bahawa anda tidak tertinggal atau melangkau dos RINVOQ® semasa rawatan.

- Jika terlupa untuk mengambil

- Jika anda terlupa dos, ambil ubat ini sebaik sahaja anda ingat sekurang-kurangnya 10 jam sebelum dos seterusnya.
- Sekiranya anda terlupa dos anda selama sehari, tinggalkan dos tersebut dan ambil 1 dos sahaja seperti biasa pada hari berikutnya.
- Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika anda mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sila hubungi doktor anda jika anda ambil RINVOQ® lebih daripada yang disyorkan. Anda mungkin akan mengalami beberapa kesan sampingan seperti yang disenaraikan.

Semasa menggunakannya

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil RINVOQ® seperti yang diberitahu oleh pakar kesihatan anda. Jangan menukar dos anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan guna RINVOQ® untuk keadaan yang tidak dinyatakan. Jangan berkongsi RINVOQ® dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom yang sama dengan anda. Ia boleh membahayakan mereka. Elakkan makanan atau minuman yang mengandungi limau gedang dengan RINVOQ® kerana ia boleh meningkatkan kesan sampingan dengan meningkatkan kandungan upadacitinib dalam badan anda.

RINVOQ® 15 mg, 30mg & 45mg Extended-Release Film Coated Tablets

Upadacitinib (15 mg, 30mg, 45mg)

- Perkara yang perlu diberi perhatian **Orang tua**

Pesakit berumur 65 tahun keatas mungkin mengalami risiko yang lebih tinggi untuk jangkitan, masalah jantung termasuk serangan jantung, dan beberapa jenis kanser. Doktor anda akan berbincang dengan anda sekiranya RINVOQ® sesuai untuk anda.

Kanak-kanak dan remaja

RINVOQ® tidak disyorkan untuk kanak-kanak di bawah 12 tahun atau remaja dengan berat badan kurang daripada 40kg yang mengalami *atopic dermatitis*. Ini kerana ia belum dikaji pada pesakit dalam golongan ini.

RINVOQ® tidak disyorkan untuk digunakan pada kanak-kanak dan remaja di bawah umur 18 tahun yang mengalami *rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, non-radiographic axial spondyloarthritis, ankylosing spondylitis, giant cell arteritis, ulcerative colitis* dan *Crohn's disease*. Ini kerana penggunaannya tidak dikaji dalam golongan pesakit ini.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kesan sampingan yang serius

Hubungi doktor anda atau dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mempunyai gejala jangkitan seperti:

- kayak atau ruam kulit yang menyakitkan dengan lepuh (*herpes*

zoster)- biasa (mungkin dialami sehingga 1 dalam 10 orang)

- Jangkitan paru-paru (*pneumonia*), yang boleh menyebabkan sesak nafas, demam dan batuk berkahak-tidak biasa (mungkin dialami oleh 1 dalam 100 orang).
- Jangkitan dalam darah (*sepsis*) - tidak biasa (mungkin dialami oleh 1 dalam 100 orang).
- Tindakan Alahan (sesak dada, berdehit, bengkak pada bibir, lidah atau tekak, gatal-gatal- tidak biasa (mungkin dialami oleh 1 dalam 100 orang).

Kesan sampingan yang lain

Beritahu doktor, ahli farmasi atau jururawat anda jika anda mengalami kesan sampingan seperti berikut:

Sangat biasa (mungkin lebih dari 1 dalam 10 orang mengalaminya)

- jangkitan pada hidung dan tekak
- Jerawat (*acne*)

Biasa (mungkin 1 dalam 10 orang mengalaminya)

- barah kulit (jenis *non-melanoma*)
- batuk
- demam
- kudis sejuk (*herpes simplex*)
- berasa sakit dalam perut (loya)
- peningkatan enzim yang dikenali sebagai *creatin kinase*, boleh dibuktikan dengan ujian darah
- kiraan sel darah putih rendah, seperti dinyatakan dalam keputusan ujian darah
- peningkatan tahap kolestrol (sejenis lemak dalam darah) seperti dinyatakan dalam keputusan ujian darah

- peningkatan tahap enzim hati, seperti dinyatakan dalam keputusan ujian darah (simptom masalah hati)
- peningkatan berat badan
- Keradangan folikel rambut
- Selsema (*influenza*)
- Anemia
- Sakit perut
- Letih (yang luar biasa dan lemah)
- Sakit kepala
- Gatal-gatal (*urticaria*)
- Jangkitan saluran kencing
- Ruam
- Ketuat (kutil)
- Bengkak kaki dan tangan (*peripheral edema*)

Jarang (mungkin 1 dalam 1000 orang mengalaminya)

- perubahan warna air mani (kebanyakannya biru dan kurang kerap hijau)

Hubungi doktor, ahli farmasi atau jururawat anda sekiranya mengalami mana-mana kesan sampingan. Ini termasuk jika anda mengalami kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (Consumer → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF or Vaccines (AEFI))).

Cara penyimpanan dan pelupusan RINVOQ®

- Penyimpanan

- Simpan RINVOQ® pada atau di bawah 30°C.

RINVOQ® 15 mg, 30mg & 45mg Extended-Release Film Coated Tablets

Upadacitinib (15 mg, 30mg, 45mg)

- Simpan RINVOQ® dalam kotak asal supaya terlindung dari kelembapan.

Simpan RINVOQ® dan semua ubat dari capaian kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila tanya ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

RINVOQ® 15 mg sejenis tablet *extended-release* berwarna ungu, tablet berbentuk dwicembung bujur dengan ukuran 14 x 8 mm dan dengan tanda 'a15' pada satu belah.

RINVOQ® 30mg sejenis tablet *extended-release* berwarna merah, tablet berbentuk dwicembung bujur dengan ukuran 14 x 8 mm dan dengan tanda 'a30' pada satu belah.

RINVOQ® 45mg sejenis tablet *extended-release* berwarna kuning, tablet berbentuk dwicembung bujur dengan ukuran 14 x 8 mm dan dengan tanda 'a45' pada satu belah.

Tablet ini disediakan dalam pek lepuh.

Setiap pek lepuh mengandungi 7 biji tablet, setiap kotak mengandungi 28 biji tablet.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif: upadacitinib

Bahan-bahan tidak aktif: microcrystalline cellulose, hypromellose, mannitol, tartaric acid,

silica (colloidal anhydrous) dan magnesium stearate. Salutan filem mengandungi polyvinyl alcohol, macrogol, talc, titanium dioxide (E171), black iron oxide (E172) (15mg tablet sahaja) iron oxide yellow (E172) (45mg tablet sahaja) dan iron oxide red (E172).

- Nombor MAL:

RINVOQ® 15 mg extended-release tablets:

MAL20106001ARZ

RINVOQ® 30 mg extended-release tablets:

MAL23086004ARZ

RINVOQ® 45 mg extended-release tablets:

MAL24126009ARZ

Pengilang

AbbVie Ireland NL B.V.
Manorhamilton Road
Sligo, Ireland

Pemegang Pendaftaran Produk

AbbVie Sdn Bhd
Level 9 Menara Lien Hoe
No.8 Persiaran Tropicana
Tropicana Golf & Country Resort
47410 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
MALAYSIA

Tarikh kemaskini RiMUP

15/06/2026

Nombor siri

NPRA (R1/3) 12122024/230
NPRA (R1/AI6) 09122024/014
NPRA (R1/AI7) 21072025/014