

# Steqeyma®

Ustekinumab 45mg/0.5mL Solution for Injection in Pre-filled Syringe  
Ustekinumab 90mg/1.0mL Solution for Injection in Pre-filled Syringe

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Steqeyma®
2. Bagaimana Steqeyma® berfungsi
3. Sebelum menggunakan Steqeyma®
4. Cara menggunakan Steqeyma®
5. Semasa menggunakan
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Steqeyma®
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

## Apakah kegunaan Steqeyma®

Steqeyma ialah ubat preskripsi yang diluluskan untuk merawat:

- Orang dewasa dengan psoriasis plak sederhana hingga teruk yang kronik (tidak hilang)
- Orang dewasa dengan artritis psoriatik aktif, iaitu penyakit radang sendi yang biasanya disertai dengan psoriasis
- Orang dewasa dengan penyakit Crohn atau kolitis ulseratif yang aktif pada tahap sederhana hingga teruk

## Bagaimana Steqeyma® berfungsi

Steqeyma menghalang tindakan dua protein dalam badan anda yang dipanggil interleukin 12 (IL-12) dan interleukin 23 (IL-23). IL-12 dan IL-23 dihasilkan oleh sistem imun badan anda. Bagi individu dengan psoriasis, artritis psoriatik, atau penyakit Crohn, IL-12 dan IL-23 boleh menyebabkan sistem imun menyerang bahagian badan yang sihat. Steqeyma dapat menghalang IL-12 dan IL-23 daripada menyebabkan sistem imun menyerang kulit, kuku, sendi, atau saluran pencernaan.

## Sebelum menggunakan Steqeyma®

-Bila tidak boleh menggunakan

Anda tidak boleh menerima Steqeyma jika anda:

- Pernah mengalami reaksi alahan terhadap Steqeyma atau mana-mana bahan lain dalam Steqeyma. Lihat

bagian akhir label ini untuk senarai lengkap bahan dalam Steqeyma.

### - Sebelum menggunakannya

Doktor anda akan menilai kesihatan anda sebelum setiap rawatan.

Beritahu doktor anda tentang semua keadaan perubatan anda sebelum setiap rawatan, termasuk jika anda:

- Pernah mengalami reaksi alahan terhadap Steqeyma. Tanya doktor anda jika anda tidak pasti.
- Mempunyai sebarang jenis jangkitan, walaupun ia sangat kecil.
- Mengalami jangkitan yang tidak sembuh atau mempunyai sejarah jangkitan yang berulang.
- Pernah menghidap TB (tuberkulosis) atau baru-baru ini berdekatan dengan seseorang yang mungkin menghidap TB.
- Mempunyai atau pernah mempunyai sebarang jenis kanser.
- Mempunyai lesi baru atau yang berubah dalam kawasan psoriasis atau pada kulit normal.
- Baru-baru ini menerima atau dijadualkan menerima vaksin. Beritahu doktor anda jika ada ahli keluarga anda yang memerlukan vaksin. Virus dalam sesetengah vaksin boleh merebak kepada individu dengan sistem imun yang lemah dan menyebabkan masalah serius.
- Sedang menerima atau pernah menerima 'suntikan alahan', terutamanya untuk reaksi alahan yang serius.
- Sedang hamil, merancang untuk hamil, atau menyusukan bayi. Tanya doktor anda untuk nasihat sebelum mengambil ubat ini. Steqeyma hanya boleh digunakan semasa kehamilan jika diperlukan. Steqeyma mungkin masuk ke dalam susu

ibu dalam jumlah yang sangat kecil. Wanita yang menyusukan bayi perlu berbincang dengan doktor mereka sama ada untuk menggunakan Steqeyma

- Mempunyai alahan terhadap lateks.

### - Mengandung dan menyusukan anak

Sila rujuk doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk hamil, atau menyusukan bayi sebelum menggunakan Steqeyma.

### • Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda tentang semua ubat yang anda ambil, termasuk ubat preskripsi dan bukan preskripsi, vitamin, dan suplemen herba.

Ketahui ubat yang anda ambil. Simpan senarai ubat anda dan tunjukkan kepada doktor serta ahli farmasi apabila anda menerima ubat baharu.

## Cara Menggunakan Steqeyma®

- Untuk rawatan psoriasis dan artritis psoriatik, Steqeyma diberikan melalui suntikan di bawah kulit.
- Untuk rawatan penyakit Crohn atau kolitis ulseratif, dos pertama Steqeyma diberikan melalui infusi intravena, iaitu ubat akan disalurkan ke dalam badan melalui jarum yang dimasukkan ke dalam vena. Dos ini akan diberikan oleh penyedia penjagaan kesihatan anda. Selepas itu, Steqeyma diberikan melalui suntikan di bawah kulit.
- Steqeyma harus digunakan di bawah panduan dan pengawasan doktor anda. Jika doktor anda menentukan bahawa ia sesuai, anda mungkin boleh menyuntik Steqeyma sendiri di bawah kulit selepas mendapat latihan yang betul mengenai teknik suntikan, jenis picagari yang betul, dan jumlah (isipadu) yang perlu disuntik (lihat "**Arahan untuk Menyuntik Steqeyma di Bawah Kulit Sendiri**").

# Steqeyma<sup>®</sup>

Ustekinumab 45mg/0.5mL Solution for Injection in Pre-filled Syringe  
 Ustekinumab 90mg/1.0mL Solution for Injection in Pre-filled Syringe

- Doktor anda akan menentukan dos Steqeyma yang sesuai untuk anda, jumlah bagi setiap suntikan, dan kekerapan anda perlu menerimanya. Pastikan anda berbincang dengan doktor mengenai jadual suntikan anda dan hadir untuk semua temu janji susulan yang telah dijadualkan.

## Arahan untuk Menyuntik Steqeyma di Bawah Kulit Sendiri

Dos pertama Steqeyma anda mungkin akan diberikan oleh penyedia penjagaan kesihatan. Walau bagaimanapun, penyedia penjagaan kesihatan anda mungkin menentukan bahawa anda atau penjaga anda boleh belajar cara menyuntik Steqeyma sendiri di bawah kulit (secara subkutan). **Sebelum anda menyuntik Steqeyma sendiri, anda mesti menjalani latihan oleh profesional kesihatan. Jika anda belum menerima latihan, sila hubungi penyedia penjagaan kesihatan anda untuk menjadualkan sesi latihan.** Hubungi penyedia penjagaan kesihatan anda jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai cara menyuntik sendiri.

Steqeyma tidak boleh digunakan:

- Selepas tarikh luput yang tertera pada label;
- Jika penutup keselamatan (*seal*) rosak;
- Jika cecairnya berubah warna, keruh, atau terdapat zarah terapung di dalamnya;
- Jika anda tahu atau mengesyaki bahawa ia telah terdedah kepada suhu melampau (seperti beku atau dipanaskan secara tidak sengaja).


Sentiasa jauhkan ubat daripada capaian kanak-kanak.

Untuk mengurangkan risiko tercucuk

jarum secara tidak sengaja, setiap picagari pra-isi dilengkapi dengan pelindung jarum yang akan diaktifkan secara automatik untuk menutup jarum selepas kandungan picagari disuntik sepenuhnya.

Jangan goncang Steqeyma pada bila-bila masa. Goncangan kuat yang berpanjangan boleh merosakkan produk. Jika produk telah digoncang dengan kuat, jangan gunakannya.

## Bahagian Picagari Pra-isi (lihat Rajah A)



Rajah A

Sediaan untuk suntikan:


### 1. Kumpulkan peralatan untuk suntikan

- Sediakan permukaan yang bersih dan rata, seperti meja atau kaunter, di kawasan yang terang
- Keluarkan kotak yang mengandungi picagari pra-isi yang diperlukan untuk dos yang telah ditetapkan daripada peti sejuk.
- Pastikan anda mempunyai peralatan berikut (lihat Rajah B):

Kotak yang mengandungi picagari pra-isi

### Tidak termasuk dalam kotak:


- Bebola kapas atau kain kasa
- Pembalut pelekat
- Bekas pelupusan objek tajam
- Lap alkohol



Rajah B

### 2. Periksa tarikh luput pada kotak (lihat Rajah C).

- Jangan** gunakan jika tarikh luput telah berlalu. Jika tarikh luput telah berlalu, kembalikan keseluruhan pek ke farmasi.



Rajah C

### 3. Tunggu 30 Minit


- Buka kotak. Pegang bahagian badan picagari dan angkat picagari pra-isi dari kotak.
- Biarkan picagari pra-isi di luar kotak selama kira-kira 30 minit pada suhu bilik (20°C hingga 25°C) supaya ia dapat mencapai suhu yang sesuai untuk suntikan (lihat Rajah D).

- Jangan** panaskan picagari pra-isi menggunakan sumber haba seperti air panas atau ketuhar gelombang mikro.
- Ini akan membolehkan cecair mencapai suhu bilik yang selesai untuk suntikan.

# Steqeyma<sup>®</sup>

Ustekinumab 45mg/0.5mL Solution for Injection in Pre-filled Syringe  
 Ustekinumab 90mg/1.0mL Solution for Injection in Pre-filled Syringe


- **Jangan** pegang pada kepala pelocok, rod pelocok, sayap pelindung jarum, atau penutup jarum.
- **Jangan** tarik semula rod pelocok pada bila-bila masa.



Rajah D

## 4. Periksa Picagari Pra-isi

- Lihat pada picagari pra-isi dan pastikan anda mempunyai ubat yang betul (Steqeyma) serta dos yang ditetapkan.
- Periksa picagari pra-isi untuk memastikan bilangan picagari dan kekuatannya adalah betul:
  - Jika dos anda 45 mg, anda akan menerima satu picagari pra-isi 45 mg Steqeyma.
  - Jika dos anda 90 mg, anda akan menerima dua picagari pra-isi 45 mg Steqeyma dan perlu menyuntik dua kali. Pilih dua lokasi suntikan yang berbeza (contohnya, satu suntikan di paha kanan dan satu lagi di paha kiri) dan lakukan suntikan satu demi satu. Atau anda mungkin menerima satu picagari pra-isi 90 mg Steqeyma.
- Periksa picagari pra-isi dan pastikan ia tidak retak atau rosak.
- Semak tarikh luput pada label picagari pra-isi (lihat Rajah E).
  - **Jangan** gunakan jika tarikh luput telah berlalu.
  - **Jangan** goncang picagari pra-isi.




Rajah E

## 5. Periksa Ubat

- Lihat pada ubat dan pastikan cecairnya jelas hingga sedikit opalesen serta tidak berwarna hingga kuning pucat (lihat Rajah F).

- **Jangan** gunakan picagari pra-isi jika cecairnya berubah warna atau kelihatan keruh.
- Anda mungkin melihat gelembung udara dalam cecair. Ini adalah normal.




Rajah F

## 6. Pilih Tapak Suntikan yang Sesuai (lihat Rajah G)

- Anda boleh menyuntik ke:
  - Paha atas.
  - Bahagian bawah abdomen kecuali kawasan 5 cm di sekeliling pusat.
  - Bahagian luar lengan atas jika suntikan diberikan oleh penjaga.
- Jangan** suntik ke dalam tali lalat, parut, lebam, atau kawasan kulit yang lembut, merah, keras, atau pecah. Jika boleh, elakkan kawasan kulit yang menunjukkan tanda-tanda psoriasis.
- Jangan** suntik melalui pakaian.

- Pilih tapak suntikan yang berbeza untuk setiap suntikan baru, sekurang-kurangnya 2.5 cm dari kawasan suntikan


sebelumnya.



Rajah G

## 7. Basuh Tangan


- Basuh tangan anda dengan sabun dan air, kemudian keringkan dengan sempurna (lihat Rajah H).



Rajah H

## 8. Bersihkan Tapak Suntikan

- Bersihkan tapak suntikan dengan lap alkohol menggunakan gerakan bulatan (lihat Rajah I).
- Biarkan kulit kering sebelum menyuntik.
  - **Jangan** hembus atau sentuh semula tapak suntikan sebelum memberikan suntikan



Rajah I


# Steqeyma<sup>®</sup>

Ustekinumab 45mg/0.5mL Solution for Injection in Pre-filled Syringe  
 Ustekinumab 90mg/1.0mL Solution for Injection in Pre-filled Syringe

## Memberikan Suntikan

### 9. Tanggalkan Penutup Jarum

- Tanggalkan penutup jarum apabila anda bersedia untuk menyuntik Steqeyma dengan memegang badan picagari pra-isi menggunakan ibu jari dan jari telunjuk (lihat Rajah J).
  - Jangan** pegang rod pelocok semasa menanggalkan penutup.
  - Anda mungkin melihat gelembung udara dalam picagari pra-isi atau titisan cecair di hujung jarum. Ini adalah normal.
- Buang penutup jarum segera ke dalam bekas pelupusan objek tajam (lihat Rajah J).
  - Jangan** gunakan picagari pra-isi jika ia terjatuh tanpa penutup jarum. Jika ini berlaku, hubungi doktor atau ahli farmasi anda.
  - Suntik dos segera selepas menanggalkan penutup jarum.
  - Jangan** pasang semula penutup jarum.
  - Jangan** sentuh jarum, kerana ini boleh menyebabkan kecederaan akibat tercucuk jarum.




Rajah J

### 10. Masukkan Picagari Pra-isi ke dalam Tapak Suntikan

- Pegang badan picagari pra-isi dengan satu tangan di antara ibu jari dan jari telunjuk.
- Gunakan tangan yang lain untuk mencubit perlahan kulit yang telah dibersihkan di antara ibu jari dan jari telunjuk. **Jangan** picit terlalu kuat.

Nota: Mencubit kulit adalah penting untuk memastikan suntikan diberikan di bawah kulit (ke dalam lapisan lemak) dan bukan lebih dalam (ke dalam otot).

- Dengan gerakan cepat seperti mencucuk anak panah, masukkan jarum sepenuhnya ke dalam lipatan kulit pada sudut 45 darjah (lihat Rajah K).
  - Jangan** tarik semula rod pelocok pada bila-bila masa.




Rajah K

### 11. Berikan Suntikan

- Setelah jarum dimasukkan, lepaskan cubitan pada kulit.
- Tekan rod pelocok secara perlahan **hingga habis** sehingga keseluruhan dos ubat disuntik dan picagari kosong (lihat Rajah L).
- Jangan** ubah kedudukan picagari pra-isi selepas suntikan bermula.


- Jika rod pelocok tidak ditekan sepenuhnya, pelindung jarum tidak akan meluncur untuk menutup jarum selepas ia dikeluarkan.



Rajah L

### 12. Keluarkan Picagari Pra-isi dari Tapak Suntikan

- Setelah picagari pra-isi kosong, semasa jarum ditarik keluar, angkat ibu jari anda perlahan-lahan dari rod pelocok sehingga jarum sepenuhnya ditutup oleh pelindung jarum (lihat Rajah M).
  - Jika jarum tidak tertutup, buang picagari dengan berhati-hati.
  - Jangan** guna semula picagari pra-isi.
  - Jangan** gosok tapak suntikan.



Rajah M

### Selepas Suntikan

### 13. Penjagaan Tapak Suntikan

- Jika terdapat sedikit pendarahan, tekan perlahan tapak suntikan dengan bebola kapas atau kain kasa, tanpa menggosoknya. Gunakan pembalut pekat jika perlu.

# Steqeyma®

Ustekinumab 45mg/0.5mL Solution for Injection in Pre-filled Syringe  
 Ustekinumab 90mg/1.0mL Solution for Injection in Pre-filled Syringe

## 14. Buang Steqeyma dengan Selamat

- a) Masukkan picagari pra-isi yang telah digunakan ke dalam bekas pelupusan objek tajam segera selepas digunakan (lihat Rajah N).
  - b) Jangan buang picagari pra-isi ke dalam sampah rumah biasa.
- Jika anda tidak mempunyai bekas pelupusan objek tajam, anda boleh menggunakan bekas rumah yang boleh ditutup dan tahan tusukan.
  - Demi keselamatan dan kesihatan anda serta orang lain, jarum dan picagari yang telah digunakan tidak boleh digunakan semula. Sebarang lebihan ubat atau bahan buangan perlu dilupuskan mengikut peraturan tempatan.
  - **Jangan** buang sebarang ubat melalui air sisa atau sampah rumah. Tanya ahli farmasi anda cara membuang ubat yang tidak lagi digunakan. Langkah ini membantu melindungi alam sekitar.



Rajah N

- Berapa banyak harus digunakan  
 Doktor anda akan menentukan dos Steqeyma yang sesuai untuk anda, jumlah bagi setiap suntikan, dan kekerapan anda perlu menerimanya. Pastikan anda berbincang dengan doktor mengenai jadual suntikan anda dan hadir untuk semua temu janji susulan yang dijadualkan.
- Bila perlu digunakan  
 Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan  
 Teruskan mengambil Steqeyma selama mana yang disarankan oleh doktor anda.
- Jika anda terlupa menggunakan  
 Buat suntikan seterusnya sebaik sahaja anda ingat. Jangan gandakan suntikan.

Jika anda terlepas lebih daripada satu dos atau tidak pasti apa yang perlu dilakukan, rujuk doktor atau ahli farmasi anda.

Jika anda sukar mengingat jadual penggunaan ubat, minta nasihat daripada ahli farmasi.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)  
 Segera hubungi doktor anda atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital terdekat.

Lakukan ini walaupun tiada tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

### Semasa menggunakan

- -Perkara yang perlu dilakukan  
 Sentiasa ikut arahan doktor anda dengan teliti.
- Beritahu doktor mengenai keadaan kesihatan anda sebelum setiap rawatan (lihat Sebelum anda menggunakan Steqeyma).
- Beritahu doktor jika anda hamil semasa menggunakan Steqeyma.
- Jika anda akan memulakan ubat baru, maklumkan kepada doktor dan ahli farmasi bahawa anda sedang menggunakan Steqeyma.

### -Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Anda tidak boleh menerima vaksin hidup semasa mengambil Steqeyma.
- Jika anda menggunakan Steqeyma semasa hamil, beritahu doktor bayi anda sebelum bayi menerima sebarang vaksin, termasuk vaksin hidup seperti vaksin BCG (untuk mencegah tuberkulosis), vaksin rotavirus,

- atau vaksin hidup lain.
- Ubat kadangkala diberikan untuk tujuan yang tidak disebut dalam risalah maklumat pesakit. Jangan gunakan Steqeyma untuk keadaan yang tidak dipreskripsikan.
- Jangan berikan ubat ini kepada orang lain, walaupun gejala mereka kelihatan serupa dengan anda.

### -Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin  
 Steqeyma tidak mempunyai atau hanya memberi kesan yang tidak ketara terhadap keupayaan untuk memandu dan menggunakan mesin.

### Kesan-kesan sampingan

Steqeyma adalah ubat yang boleh mengurangkan aktiviti sistem imun anda. Ia boleh meningkatkan risiko anda mengalami kesan sampingan yang serius, termasuk:

### Jangkitan serius

- Steqeyma boleh mengurangkan keupayaan badan anda untuk melawan jangkitan. Sesetengah jangkitan boleh menjadi serius dan memerlukan rawatan di hospital. Jika anda mempunyai jangkitan atau luka terbuka, maklumkan kepada penyedia penjagaan kesihatan anda sebelum memulakan Steqeyma. Jika anda mendapat jangkitan atau mengalami tanda-tanda seperti demam, keletihan melampau, batuk, simptom seperti selesema, atau kulit yang panas, merah, sakit, atau luka, beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda dengan segera. Ini mungkin tanda-tanda jangkitan seperti jangkitan paru-paru, jangkitan kulit, atau kayap yang boleh menyebabkan komplikasi serius.
- Doktor anda akan memeriksa anda untuk tuberkulosis (TB) dan melakukan ujian untuk mengesan TB. Jika doktor berpendapat anda berisiko untuk TB, anda mungkin perlu menjalani rawatan untuk TB

# Steqeyma®

Ustekinumab 45mg/0.5mL Solution for Injection in Pre-filled Syringe  
 Ustekinumab 90mg/1.0mL Solution for Injection in Pre-filled Syringe

sebelum dan semasa rawatan dengan Steqeyma.

## Kanser

- Banyak ubat seperti Steqeyma yang boleh mengurangkan aktiviti sistem imun mungkin meningkatkan risiko kanser. Beritahu doktor anda jika anda pernah menghidap sebarang jenis kanser.

Kesan sampingan serius lain mungkin berlaku, termasuk reaksi alahan.

Tanda-tanda reaksi alahan serius mungkin termasuk ruam kulit, muka, bibir, mulut atau tekak bengkak, atau bunyi nafas berbunyi, pening, kesukaran menelan atau bernafas. Beritahu doktor anda atau dapatkan bantuan perubatan kecemasan segera jika anda mengesyaki mengalami reaksi alahan.

Dalam kes yang jarang berlaku, simptom seperti batuk, sesak nafas, dan demam juga mungkin menandakan reaksi alahan paru-paru terhadap Steqeyma.

## Alergi kepada lateks

Penutup jarum pada picagari pra-isi yang telah diisi mengandungi getah asli kering (sejenis lateks). Ini mungkin menyebabkan reaksi alahan pada individu yang sensitif kepada lateks. Beritahu doktor anda jika anda pernah mengalami reaksi alahan terhadap lateks atau mengalami sebarang reaksi alahan selepas suntikan Steqeyma.

Kesan sampingan paling biasa Steqeyma adalah:

- Jangkitan saluran pernafasan atas seperti selesema biasa
- Jangkitan pada hidung dan tekak
- Pening
- Sakit kepala
- Sakit tekak
- Cirit-birit
- Loya
- Muntah

- Gatal-gatal
- Sakit belakang
- Sakit otot
- Sakit sendi
- Rasa sangat letih
- Kemerahan pada kulit di tempat suntikan
- Sakit di tempat suntikan
- Jangkitan sinus

Ini bukan semua kesan sampingan Steqeyma. Beritahu doktor anda jika anda mengalami sebarang kesan sampingan yang mengganggu atau tidak hilang.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk maklumat lanjut.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan *Adverse* Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.gov.my](http://npra.gov.my) [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

## **Cara penyimpanan dan pelupusan Steqeyma®**

- Penyimpanan

Jika anda menggunakan Steqeyma di rumah, simpan produk dalam peti sejuk tetapi bukan di bahagian beku. Steqeyma tidak boleh dibekukan. Simpan dalam kotak asal untuk melindunginya daripada cahaya sehingga waktu penggunaan.

Jika perlu, picagari pra-isi Steqeyma boleh disimpan pada suhu bilik sehingga 30°C untuk tempoh maksimum 30 hari dalam kotak asal dengan perlindungan daripada cahaya. Catat tarikh apabila picagari pertama kali dikeluarkan dari peti sejuk dan tarikh luput baharu pada kotak di ruang yang disediakan. Tarikh luput baharu tidak boleh melebihi tarikh luput asal yang dicetak pada kotak.

Setelah disimpan pada suhu bilik, picagari tidak boleh dimasukkan semula ke dalam peti sejuk. Buang picagari jika tidak digunakan dalam tempoh 30 hari pada suhu bilik.

## - Pelupusan

Ubat tidak boleh dibuang melalui air sisa atau sampah rumah. Tanyakan kepada ahli farmasi anda cara yang betul untuk membuang ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah ini membantu melindungi alam sekitar.

## **Maklumat lanjut**

- Rupa dan warna produk
- Pre-filled syringe

Steqeyma berwarna jernih hingga kuning muda dan mungkin mengandungi beberapa zarah kecil protein yang lut sinar atau putih. Penampilan ini adalah perkara biasa bagi larutan yang mengandungi protein.

Steqeyma 45mg/0.5ml solution for injection in pre-filled syringe

Packs of:

- 1 picagari pra-isi

Steqeyma 90mg/1.0ml solution for injection in pre-filled syringe

Packs of:

- 1 picagari pra-isi

## Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif  
Bahan aktif ialah Ustekinumab.
- Bahan tidak aktif  
Bahan tidak aktif termasuk: L-histidin, L-histidin monohidroklorida monohidrat, polisorbén 80, sukrosa, dan air untuk suntikan.

## - Nombor MAL

MALXXXXXXXXX

## **Pengilang**

CELLTRION Pharma, Inc.  
 82, 2 Sandan-ro, Ochang-eup,  
 Cheongwon-gu, Cheongju-si,  
 Chungcheongbuk-do, 28117

# Steqeyma<sup>®</sup>

Ustekinumab 45mg/0.5mL Solution for Injection in Pre-filled Syringe  
Ustekinumab 90mg/1.0mL Solution for Injection in Pre-filled Syringe

---

Republic of Korea

**Pengeluar Kumpulan**

CELLTRION, Inc., Plant 2  
20, Academy-ro 51 Beon-gil,  
Yeonsu-gu, Incheon, 22014  
Republic of Korea

**Pemegang Pendaftaran Produk**

Celltrion Healthcare Malaysia Sdn. Bhd.  
Unit 32-01, Level 32, Tower B,  
The Vertical Corporate Tower, Avenue  
10, Bangsar South, No.8 Jalan Kerinchi,  
59200, Kuala Lumpur,  
Malaysia

**Tarikh kemas kini RiMUP**

27/03/2026

**Nombor Siri**

NPRA (R3)26/103