

KETAZON SHAMPOO

Ketoconazole (20 mg/g)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan KETAZON
2. Bagaimana KETAZON berfungsi
3. Sebelum mengguna KETAZON
4. Cara menggunakan KETAZON
5. Semasa menggunakan KETAZON
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan KETAZON
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan KETAZON

KETAZON merupakan sejenis ejen antikulat yang digunakan untuk merawat dan mencegah jangkitan kulit. Permukaan kulit kepala dan kawasan badan boleh dirawat dengan shampoo tersebut.

Bagaimana KETAZON berfungsi

KETAZON berfungsi dengan menghalang pembiakan kulat atau yis dan melegakan kerak dan gatal-gatal dengan cepat, yang biasanya dikaitkan dengan jangkitan anda.

Sebelum mengguna KETAZON

- Bila tidak boleh mengguna

Jangan gunakan KETAZON jika anda alah terhadap ketoconazole atau bahan-bahan lain yang disenaraikan di akhir risalah ini.

Ibu mengandung dan menyusu anak

Tiada risiko terhadap penggunaan KETAZON pada kehamilan atau penyusuan.

- Sebelum mula menggunakan

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mempunyai alahan terhadap ubat-ubatan lain, bahan pengawet atau bahan pewarna.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda tengah menerima rawatan kortikosteroid topical. Ianya disarankan bahawa terapi steroid perlu dihentikan secara bertahap dalam tempoh masa 2-3 minggu, apabila menggunakan KETAZON

untuk mencegah daripada sebarang kesan *rebound* (patah balik).

Cara menggunakan KETAZON

- Berapa banyak harus digunakan

Untuk kegunaan topikal sahaja.

Basuh bahagian kulit atau rambut yang terjangkit dengan KETAZON dan biarkan produk tersebut pada kulit selama 3-5 minit sebelum dibilas. Biasanya, syampu sebanyak satu tapak tangan adalah mencukupi untuk satu cucian.

Untuk rawatan:

Seborrhoeic dermatitis (kulit berwarna perang kemerahan dengan sisik kuning atau putih) dan kelemumur:

Guna dua kali seminggu selama 2-4 minggu

Pityriasis versicolor (tompok kecil kulit berwarna perang atau putih): Guna sekali sehari selama 5 hari

Untuk pencegahan:

Sekali setiap 1 atau 2 minggu diperlukan untuk kawalan jangkitan

- Bila perlu digunakan

Guna seperti yang diarahkan oleh doctor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Ikut preskripsi dari doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos seterusnya pada masa yang betul. Jangan ambil dos yang berganda untuk mengganti dos yang terlupa.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda terambil dos berlebihan dan bimbang dengan keadaan anda.

Walaupun tiada sebarang ketidakselesaan atau kesan keracunan, tetapi anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Anda boleh menghubungi Pusat Racun Negara untuk mendapatkan bantuan.

Semasa menggunakan KETAZON

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda seperti yang diarahkan oleh doktor anda

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan gunakan ubat ini tanpa preskripsi dari doctor anda
- Jangan berhenti mengguna ubat ini kecuali dinasihatkan oleh doktor anda
- Jangan mengguna sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda
- Jangan berikan ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai tanda dan simptom yang sama
- Jangan menelan ubat ini

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Elakkan dari terkena mata. Bilas mata dengan air paip secepat mungkin sekiranya syampu terkena mata anda.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatkannya. Anda dinasihatkan untuk memberitahu doktor dengan segera jika anda mengalami kesan-kesan berikut:-

- Reaksi pada tempat aplikasi (misalnya: kulit rasa terbakar, ruam, kulit mengelupas, kulit kering, rambut gugur, perubahan warna atau tekstur rambut, mata berair)
- Reaksi hypersensitivity (misalnya: kulit atau mucus membran menjadi bengkak secara tiba-tiba - biasanya pada bahagian muka, mata atau bibir)

Ini bukan senarai lengkap, sila merujuk kepada doktor atau ahli farmasi untuk mendapatkan maklumat selanjutnya.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan KETAZON

- Penyimpanan

Jauhi dari kanak-kanak.
Simpan di bawah suhu 30°C.
Jauhi dari cahaya dan haba.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda mengenai cara yang betul. Amalan ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair berwarna merah anggur.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:
Ketoconazole

Bahan tidak aktif:
Sodium laureth sulfate,
cocamidopropyl betaine, ponceau,
alcohol 95%, ammonium chloride,
citric acid anhydrous, propylene glycol, fragrance (tmo 3230),
fragrance (dione), purified water

- Nombor MAL

MAL20000738AZ

Pengilang

Siam Bheasach Co., Ltd.
123 Soi Chokechairuammitr,
Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon,
Chatuchak, Bangkok 10900 and 9 Soi
Chokechairuammitr 3, Vibhavadi-
Rangsit Road, Dindang, Dindang,
Bangkok 10400, Thailand.

Pemegang Pendaftaran Produk

SPG Pharma (Malaysia) Sdn. Bhd.
Suite 1701, Block A, Damansara
Intan e-Business Park, No.1, Jalan
SS20/27, 47400 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

01/10/2024

Nombor Siri

NPRA(R2/1)210216/625