

SVOZ (0.5% OPHTHALMIC SOLUTION)

Moxifloxacin 5 mg/mL

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan SVOZ
2. Bagaimana SVOZ berfungsi
3. Sebelum mengguna SVOZ
4. Cara menggunakan SVOZ
5. Semasa menggunakan SVOZ
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan SVOZ
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan SVOZ

SVOZ merupakan sejenis ubat titis mata yang digunakan untuk merawat konjunktivitis (jangkitan di permukaan mata) yang disebabkan oleh bakteria.

Bagaimana SVOZ berfungsi

SVOZ tergolong dalam kelas ubat yang dikenali sebagai fluoroquinolone generasi keempat.

Ia berfungsi dengan menghalang pembiakan bakteria yang menyebabkan jangkitan anda.

Sebelum mengguna SVOZ

Bila tidak boleh mengguna

Jangan gunakan SVOZ jika anda:

- alah terhadap quinolones, moxifloxacin atau bahan-bahan lain di dalam produk ini
- akan memandu atau mengendalikan mesin, sila tunggu sehingga penglihatan anda jelas sebelum menjalankan aktiviti tersebut

Sebelum mula mengguna

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan SVOZ jika anda:

- mengambil quinolones
- mempunyai jangkitan lain yang disebabkan oleh kulat atau virus
- menggunakan ubat mata lain
- hamil atau merancang untuk hamil
- sedang menyusu bayi atau merancang untuk memulakan penyusuan bayi

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil atau kebelakangan ini mengambil ubat-ubatan lain, termasuk produk tradisional yang dibeli tanpa preskripsi.

Cara menggunakan SVOZ

Berapa banyak harus digunakan

Untuk kegunaan oftalmik topikal sahaja.

Titis 1 titik pada mata yang berjangkit, 3 kali sehari selama 7 hari.

Jika anda menggunakan ubat mata lain, tunggu selama 5 minit sebelum menggunakan produk seterusnya. Salap mata harus digunakan pada langkah terakhir.

Tidak boleh digunakan untuk bayi di bawah umur 1 tahun.

(Lihat **Rajah 1-3 Langkah-langkah penggunaan** pada muka surat seterusnya)

Bila perlu digunakan

Guna seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa lama perlu digunakan

Ikut preskripsi dari doktor anda.

Jika terlupa menggunakan

Ambil dos seterusnya pada masa yang betul. Jangan ambil dos yang berganda untuk mengganti dos yang terlupa.

Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Bilas mata anda dengan air paip atau dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda terguna secara berlebihan atau bimbang dengan keadaan anda.

Walaupun tiada sebarang ketidakselesaan atau kesan keracunan, tetapi anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Anda boleh menghubungi

Pusat Racun Negara untuk mendapatkan bantuan.

Semasa menggunakan SVOZ

Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat dengan tepat seperti yang diarahkan oleh doktor anda
- Amalkan penggunaan ubat pada waktu yang sama setiap hari
- Basuh tangan sebelum dan selepas menggunakan ubat
- Tutup penutup botol dengan segera selepas setiap penggunaan

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan gunakan ubat ini tanpa preskripsi dari doktor anda
- Jangan berhenti mengguna ubat ini kecuali dinasihatkan oleh doktor anda
- Jangan mengguna sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda
- Jangan berikan ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai tanda dan simptom yang sama
- Jangan menelan ubat ini
- Jangan sentuh kelopak mata dan jari anda, atau kawasan sekitarnya dengan hujung penitis botol
- Jangan guna ubat ini jika ia sudah berubah menjadi keruh
- Jangan memakai kanta lekap sehingga anda sudah sembuh dari jangkitan tersebut

Perkara yang perlu diberi

perhatian

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika:

- keadaan anda tidak berubah atau menjadi lebih teruk
- anda mengalami perubahan pada penglihatan
- anda mengalami kesakitan atau bengkak pada tendon

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatkannya. Anda dinasihatkan untuk memberitahu doktor dengan segera

SVOZ (0.5% OPHTHALMIC SOLUTION)

Moxifloxacin 5 mg/mL

jika anda mengalami reaksi alahan atau kesan-kesan berikut:-

- Mata rasa lecur/pedih
- Mata kering dan gatal
- Mata merah
- Keradangan kornea
- Mata bengkak
- Mata berdarah
- Sakit kepala
- Sakit kerongkong

Ini bukan senarai lengkap untuk semua kesan sampingan yang mungkin akan berlaku. Sila merujuk kepada doktor atau ahli farmasi untuk mendapatkan maklumat selanjutnya.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan SVOZ

Penyimpanan

Jauhi dari kanak-kanak.
Simpan di bawah suhu 30°C.
Jauhi dari haba dan cahaya. Jangan guna selepas 30 hari dibuka.
Produk harus disimpan di bawah suhu 30°C selepas dibuka.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda mengenai cara yang betul. Amalan ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Cecair jernih yang berwarna kuning kehijauan.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Moxifloxacin hydrochloride

Bahan tidak aktif:

Sodium chloride, Boric acid, Sodium hydroxide, Water for injection, Hydrochloric acid

Nombor MAL

MAL21026013AZ

Pengilang

Siam Bheasach Co., Ltd.
123 Soi Chokechairuammitr,
Vibhavadi-Rangsit Road,
Chomphon, Chatuchak, Bangkok
10900 and 9 Soi
Chokechairuammitr 3, Vibhavadi-
Rangsit Road, Dindang, Dindang,
Bangkok 10400, Thailand.

Pemegang Pendaftaran Produk

SPG Pharma (Malaysia) Sdn. Bhd.
Suite 1701, Block A, Damansara
Intan e-Business Park, No.1, Jalan
SS20/27, 47400 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

01/08/2023

Nombor Siri


NPRA (R2) 19/83

Langkah-langkah penggunaan



Rajah 1

1. Basuh tangan dengan sabun dan air.
2. Keluarkan penutup dari botol.
3. Pegang botol terbalik dengan satu tangan antara ibu jari dan jari tengah.
4. Semasa mendongkakkan kepala anda, tarik kelopak mata bawah dengan menggunakan telunjuk tangan anda yang lain (Rajah 1).



Rajah 2

5. Letakkan hujung penitis dekat dengan mata, jangan sentuh mata atau kelopak mata, kawasan sekitar atau permukaan lain dengan penitis.
6. Tekan aras botol secara perlahan-lahan untuk melepaskan satu titisan (Rajah 2).



Rajah 3

7. Setelah menggunakan SVOZ, tekan jari anda terhadap sudut mata yang ditutup (kawasan antara mata dan hidung), tahan selama 2-3 minit. Tindakan ini membantu menghalang ubat daripada masuk ke dalam seluruh badan dan penting pada kanak-kanak (Rajah 3).
8. Jika anda menggunakan SVOZ pada kedua-dua belah mata, basuh tangan anda sebelum berulang langkah-langkah di atas untuk mata yang lain. Tindakan ini membantu mencegah jangkitan merebak ke mata sebelah.
9. Tutup penutup dengan ketat selepas digunakan.
10. Basuh tangan anda sekali lagi untuk mengeluarkan residu.