

LORSEDIN® ORAL SOLUTION

Loratadine (1mg/ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan LORSEDIN®
2. Bagaimana LORSEDIN® berfungsi
3. Sebelum mengambil LORSEDIN®
4. Cara menggunakan LORSEDIN®
5. Semasa menggunakan LORSEDIN®
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan LORSEDIN®
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan LORSEDIN®

LORSEDIN® digunakan untuk melegakan gejala bersin, hidung berair, gatal hidung; mata merah, berair, dan gatal. Ubat ini juga digunakan untuk merawat urtikaria kronik (kemerahan, bengkak, gatal-gatal kulit) dan alergi kulit lain.

Bagaimana LORSEDIN® berfungsi

LORSEDIN® adalah sejenis antihistamina. Ia berfungsi dengan menyekat tindakan histamina, bahan biologi rembesan badan yang menyebabkan gejala alergi seperti bersin, gatal-gatal, mata berair dan hidung berair.

Sebelum mengambil LORSEDIN®

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil LORSEDIN® jika anda:

- alah kepada LORSEDIN® atau mana-mana bahan yang terkandung dalam ubat ini.

-Sebelum mengambil LORSEDIN®

Sila beritahu doktor anda jika:

- mengalami atau pernah mengalami penyakit hati

kehamilan dan menyusukan anak:

Beritahu doktor anda jika anda mengandung, merancang untuk mengandung, ataupun menyusukan bayi sebelum anda mengambil ubat ini.

Loratadine boleh dijumpai di dalam susu ibu. Disebabkan oleh peningkatan risiko terhadap antihistamina pada bayi, terutama bayi yang baru dilahirkan dan bayi pramatang, maka keputusan perlu dibuat samada terus menyusukan bayi atau menghentikan pengambilan ubat.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil ubat-ubat lain, termasuk ubat yang diperolehi tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Ubat yang memberi kesan kepada hati harusnya digunakan dengan berhati-hati.

Cara menggunakan LORSEDIN®

-Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke atas:

Dua sudu 5ml (10mg) sekali sehari.

Kanak-kanak berumur 2-12 tahun:

Berat badan > 30kg – Dua sudu 5ml (10mg) sirup sekali sehari.

Berat badan < 30kg – Satu sudu 5ml (5mg) sirup sekali sehari.

-Bila perlu digunakan

Ambil ubat anda seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

-Berapa lama perlu digunakan

LORSEDIN® harus digunakan selagi doktor anda mengesyorkan ubat ini.

-Jika terlupa menggunakan

Jangan mengambil dos yang terlepas jika ia hampir masa untuk dos seterusnya. Ambil dos seterusnya pada waktu yang ditetapkan.

Jangan menggandakan dos untuk menggantikan dos yang terlepas.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat sekiranya anda mengesyaki bahawa anda atau sesiapa mungkin telah mengambil terlalu banyak LORSEDIN®.

Semua ini harus dilakukan walaupun anda tidak mengalami tanda-tanda ketidakselesaan atau

LORSEDIN® ORAL SOLUTION

Loratadine (1mg/ml)

keracunan kerana anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Pengambilan LORSEDIN® yang terlalu banyak boleh mengakibatkan rasa mengantuk, kadar denyutan jantung yang cepat, dan sakit kepala.

Semasa menggunakan LORSEDIN®

-Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor anda:

- Sekiranya anda mengandung ketika mengambil ubat ini
- bakal memulakan rawatan dengan ubat baru.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan memberi rawatan anda kepada orang lain, walaupun anda mengesyaki bahawa mereka mengalami gejala yang sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Anda tidak harus memandu atau mengemudikan mesin/jentera sehingga kesan sampingan LORSEDIN® terhadap anda telah dikenalpasti.

Kesan-kesan sampingan

Berhenti mengambil ubat ini sekiranya anda mengalami kesan sampingan yang berikut. Sila

hubungi doktor anda dengan segera.

- Sesak nafas, bengkak muka, leher, lidah atau tekak (Alergi yang serius)

Hubungi doktor anda jika anda mengalami:

- Sakit kepala, gementar, keletihan pada kanak-kanak
- Mengantuk, sakit kepala, meningkat selera, kesukaran untuk tidur pada orang dewasa
- denyutan jantung yang cepat atau tidak teratur, pening kepala, kelelahan
- loya, mulut kering, sakit perut, fungsi hati yang tidak normal, ruam, keguguran rambut

Ini bukan senarai lengkap untuk semua kesan sampingan yang mungkin berlaku. Sila rujuk kepada doktor anda sekiranya anda mendapati bahawa anda merasa kurang sihat semasa rawatan LORSEDIN® atau sejeurus selepas anda menghabiskan rawatan LORSEDIN®

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (Public→ Reporting Medicinal Problems/ Side Effects/ AEFI).

Cara penyimpanan dan pelupusan LORSEDIN®

-Penyimpanan

- Simpan LORSEDIN® di

tempat yang sejuk dan kering di bawah 30°C.

- Jauhi daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Sila merujuk kepada doktor anda untuk pelupusan baki ubat yang telah dihentikan oleh doktor atau telah tamat tempoh. Jangan buang ubat ini bersama-sama sisa air atau sampah dari rumah.

Maklumat Lanjut

-Rupa dan warna LORSEDIN®

LORSEDIN® adalah cecair sirap jernih dengan perisa oren.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Loratadine

Bahan tidak aktif:

Purified water, orange sweet, sodium benzoate, sucralose, Edetate disodium (dihydrate) Citric acid monohydrate, hydroxypropyl cellulose, dan propylene glycol.

-Nombor MAL:

MAL18086161AZ

Pengilang

Siam Bheasach Co., Ltd.,
123 Soi Chokechairuammitr,
Vibhavadi-Rangsit Road,
Chomphon, Chatuchak,
Bangkok 10900 dan
9 Soi Chokechairuammitr 3,
Vibhavadi-Rangsit Road,
Dindang, Dindang, Bangkok
10400, Thailand.

LORSEDIN[®] ORAL SOLUTION

Loratadine (1mg/ml)

**Pemegang Pendaftaran
Produk**

SPG Pharma (Malaysia) Sdn.
Bhd.,
Suite 1701, Block A,
Damansara Intan e-Business
Park, No. 1, Jalan SS20/27,
47400 Petaling Jaya, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RIMUP
13/11/2024

Nombor siri:
NPRA(R2/1)241105/1367