

EGOPSORYL TA GEL

Coal Tar/Phenol/Sulfur (5%w/w / 0.5%w/w / 0.5%w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan EgoPsoryl TA Gel
2. Bagaimana EgoPsoryl TA Gel berfungsi
3. Sebelum menggunakan EgoPsoryl TA Gel
4. Cara menggunakan EgoPsoryl TA Gel
5. Semasa menggunakan EgoPsoryl TA Gel
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan EgoPsoryl TA Gel
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan EgoPsoryl TA Gel

Psoriasis biasa, psoriasis kulit kepala dan keradangan kulit jangka panjang. Membantu untuk mengawal psoriasis sederhana yang stabil dan keradangan kulit yang berterusan.

Bagaimana EgoPsoryl TA Gel berfungsi

- Coal Tar mempunyai tindakan anti-gatal, anti-radang, penebalan lapisan keratin dan anti-infektif.
- Phenol adalah antiseptik dan disinfektan yang aktif terhadap pelbagai mikro-organisma. Ia biasa digunakan untuk membasmi kulit dan melegakan gatal-gatal
- Sulfur adalah agen keratolitik yang membantu untuk membuang sisik dan juga bertindak sebagai antiseptik ringan. Ianya digunakan secara meluas dalam rawatan penyakit kelemumur.

Sebelum menggunakan EgoPsoryl TA Gel

- Bila tidak boleh menggunakan
- Mempunyai alahan terhadap sebarang bahan-bahan kandungan

dalam produk ini.

- Kanak-kanak di bawah umur 2 tahun kecuali di bawah arahan dan pengawasan doktor.
- Semasa kehamilan atau semasa menyusui. Sila berunding ahli kesihatan profesional anda sebelum menggunakan produk ini.

- Sebelum mula menggunakan

Sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan produk ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

- Jangan gunakan dengan terapi lain seperti sinaran ultra ungu atau ubat yang dipreskripsikan kecuali diarahkan oleh seorang pengamal perubatan.
- Untuk meningkatkan keberkesanan terapi, sapukan jeli petroleum ke atas bahagian berkenaan selepas menyapu EgoPsoryl TA.

Cara menggunakan EgoPsoryl TA Gel

- Berapa banyak harus digunakan

Untuk kegunaan luar sahaja.

Jangan telan. Sapukan pada bahagian berkenaan 2-4 kali sehari.

- Bila perlu digunakan

Sapukan pada bahagian yang berkenaan selepas dibersihkan dengan pencuci anti-gatal.

Kulit kepala: Sapukan pada waktu malam dan jika diingini, ianya boleh dibiarkan kekal atas kulit kepala pada siang hari.

- Berapa lama perlu digunakan

Sila ikut nasihat doktor atau ahli farmasi. Jangan gunakan untuk tempoh yang berpanjangan tanpa berunding dengan pengamal perubatan.

- Jika terlupa menggunakan

Guna sebaik sahaja teringat. Kemudian, guna seperti biasa.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan EgoPsoryl TA Gel

- Perkara yang perlu dilakukan

Elakkan daripada terkena mata. Jika ada sebarang iritasi, hentikan penggunaan.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan sabun kerana ia boleh merengsakan. Tidak boleh digunakan secara balutan kecuali dinasihatkan pengamal perubatan.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika tidak bertambah baik, sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi.

Kesan-kesan sampingan

Alahan kepada mana-mana bahan boleh menyebabkan kerengsaan kulit. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

EGOPSORYL TA GEL

Coal Tar/Phenol/Sulfur (5%w/w / 0.5%w/w / 0.5%w/w)

Cara penyimpanan dan pelupusan EgoPsoryl TA Gel

- Cara penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Jauhkan
daripada kanak-kanak.

- Cara pelupusan

EgoPsoryl TA Gel tidak patut
dibuangkan dengan sisa-sisa
buangan isi rumah. Sila rujuk
kepada ahli farmasi anda untuk
cara-cara pelupusan EgoPsoryl TA
Gel yang tidak diperlukan lagi.
Langkah- langkah ini akan
membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

EgoPsoryl TA Gel adalah gel coklat
kuning gelap dalam tiub 30g.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: coal tar, phenol,
sulfur.
- Bahan tidak aktif: trietanolamine,
carbomer 934P, menthol, cetyl
alcohol, glycerol, allantoin,
methylated spirit, purified water

- Nombor MAL:

MAL19913162XR

Pengilang

Ego Pharmaceuticals Pty. Ltd.
13-31 Malcolm Road,
Braeside, 3195
Australia

Pemegang Pendaftaran Produk

Ego Pharm Malaysia Sdn Bhd
1-6 Block A, Jaya One,
72A Jln Prof Diraja Ungku Aziz,
46200 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan.

Tarikh Kemaskini RiMUP

3/6/2026

Nombor Siri

NPRA(R4/1)211118/00346