

SANIQUAD M 20 FOAM**Chlorhexidine Gluconate (4 %w/v) Foaming solution****Apakah yang ada pada risalah ini**

1. Apakah kegunaan Saniquad M 20
2. Bagaimana Saniquad M 20 berfungsi
3. Sebelum menggunakan Saniquad M 20
4. Cara menggunakan Saniquad M 20
5. Semasa menggunakan Saniquad M 20
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Saniquad M 20
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Saniquad M 20

Saniquad M 20 digunakan untuk pembasmian kuman kulit pra operasi dan mencuci tangan antiseptik

Bagaimana Saniquad M 20

berfungsi Saniquad M 20 Saniquad M 20 mengandungi chlorhexidine gluconate sebagai aktifnya bahan. Ia mempunyai sifat antiseptik yang membunuh bakteria dan menghalang pertumbuhan bakteria.

Sebelum menggunakan Saniquad M 20**- Bila tidak boleh menggunakan**

Jangan gunakan Saniquad M 20:

- jika anda mempunyai alahan terhadap chlorhexidine gluconate atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).
- untuk membersihkan muka dan kepala sebelum pembedahan.

- Sebelum menggunakan Saniquad M

20 Mengandung dan menyusukan anak Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang produk lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Saniquad M 20**- Berapa banyak harus digunakan**

Jangan cairkan. Gunakan pada kepekatan yang sebenar.

Arahan penggunaan***Untuk pembersihan kulit secara umum***

Bilas dengan bersih permukaan kulit yang ingin dibersihkan dengan air. Gunakan jumlah minimum Saniquad M 20 yang diperlukan untuk meliputi kawasan kulit terjejas. Basuh dan bilas dengan air.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan Saniquad M 20 mengikut tempoh masa yang diarahkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Tidak berkaitan

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Jika anda atau sesiapa tertelan produk ini, minum air dengan banyak dan segera berjumpa doktor.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Saniquad M 20**- Perkara yang perlu dilakukan**

Guna produk ini mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Saniquad M 20.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula menggunakan sebarang produk baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Saniquad M 20 kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

Jangan gunakan produk ini untuk membersihkan kulit atau luka secara rutin yang melibatkan lebih daripada lapisan permukaan.

Produk ini juga bukan untuk pembersihan kulit secara umum di kawasan badan yang besar kecuali pada individu yang mempunyai jangkitan bakteria pada kulit.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Saniquad M 20 adalah untuk kegunaan luar sahaja. Elakkan daripada terkena pada mata, telinga dan mulut.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat - ubatan lain, Saniquad M 20 boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Segera berjumpa doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mengalami kesan sampingan setelah menggunakannya.

Berhenti menggunakan produk ini dan dapatkan bantuan perubatan segera jika anda mengalami ruam, gatal, bengkak, kesukaran bernafas, pening kepala atau degupan jantung yang cepat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers

→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Saniquad M 20**- Penyimpanan**

Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya matahari.

Jauhi produk daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk

SANIQUEAD M 20 FOAM

Chlorhexidine Gluconate (4% w/v) Foaming solution

melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah- langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair berwarna merah jambu jernih.

Saniquead M 20 4% boleh didapati dalam botol plastik 100ml.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Chlorhexidine gluconate 4% w/v

- Bahan tidak aktif

. Fragrance), Hydroxy methyl cellulose, Phenoxyethanol, PEG 400, coconut diethanol amide, PEG7, propylene glycol, acetic acid, FD&C Red, purified water

Nombor MAL:

Pengilang

Sirmaxo Chemicals Pvt. Ltd.
Plot No. E-35, Tarapur MIDC, Taluka-
Palghar, Thane 401506 Maharashtra
State, India

Pemegang Pendaftaran Produk

Perniagaan Normahas Sdn Bhd,
1-5-10, 5th Block C, Diamond Square,
(Jalan semarak API) Jalan 1/50, off
Jalan Gombak 53000 kualalumpur
wilayah PerskutuanKualalumpur
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP 15/09/2026

Nombor Siri NPRA (R2) 26/101