

IKOP iSalic™ Ointment

Metil salisilat (25% w/w), mentol (3% w/w), kapur barus (3% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan IKOP iSalic™ Ointment
2. Bagaimana IKOP iSalic™ Ointment berfungsi
3. Sebelum menggunakan IKOP iSalic™ Ointment
4. Cara menggunakan IKOP iSalic™ Ointment
5. Semasa menggunakan IKOP iSalic™ Ointment
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara simpan dan lupus IKOP iSalic™ Ointment
8. Butiran produk
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini

Apakah kegunaan IKOP iSalic™ Ointment

IKOP iSalic™ Ointment digunakan untuk memberi kelegaan sementara bagi sakit otot dan sendi yang ringan dan sederhana, kejang otot, sakit bahu, ketidakselesaan akibat sakit otot leher dan belakang.

Bagaimana IKOP iSalic™ Ointment berfungsi

Ubat ini membesarkan saluran darah, menyebabkan rasa kesejukan diikuti dengan kesan melegakan kesakitan.

Sebelum menggunakan IKOP iSalic™ Ointment

- Waktu dilarang guna

Jangan gunakan ubat ini jika anda alah kepada sebarang ramuan yang terkandung di dalam ubat ini.

Berhati-hati menggunakan ubat ini jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung dan jika anda sedang menyusukan anak.

Jangan gunakan ubat ini kepada kanak-kanak berumur 2 tahun ke bawah.

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum mula penggunaan

Bersihkan tangan anda sebelum dan selepas menggunakan ubat ini. Jangan sapu ubat ini pada bahagian yang sensitif seperti mata, rongga

hidung dan bibir. Sekiranya terjadi, bilas dengan air bersih dengan segera.

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Bagi individu yang mengambil warfarin, penggunaan berlebihan pada kulit untuk sakit otot atau sendi boleh meningkatkan risiko pendarahan.

Cara menggunakan IKOP iSalic™ Ointment

- Berapa banyak harus digunakan

Sapu pada kawasan yang sakit 3 atau 4 kali sehari atau bila perlu. Untuk kegunaan luaran sahaja.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan IKOP iSalic™ Ointment apabila anda mengalami sakit otot dan sengal.

- Jika terlupa guna

Sekiranya anda terlupa, sapu ubat ini sebaik sahaja anda teringat.

- Jika guna berlebihan (terlebih dos)

Gejala yang dapat dilihat akibat dos berlebihan termasuk pening, telinga berdengung, berpeluh, keliru, loya dan muntah. Gejala ini dapat dikawal dengan mengurangkan penggunaan ubat ini. Jika anda mengalami simptom yang lebih parah seperti sesak nafas, demam dan keresahan, hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke jabatan kecemasan di hospital yang terdekat.

Semasa menggunakan IKOP iSalic™ Ointment

- Perkara yang perlu dilakukan

Mulakan dengan menyapu salap dengan jumlah yang kecil pada kawasan kulit dan perhatikan sama ada berlaku ketidakselesaan atau kegatalan sebelum meneruskan penggunaan dengan jumlah yang betul. Sila berhenti dari menggunakan salap ini jika kerengsaan berlaku.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan telan ubat ini. Elakkan dari terkena mata, rongga hidung dan bibir. Elakkan menyapu pada kawasan luka terbuka atau kulit rosak.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi ubat ini dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Ubat ini adalah untuk kegunaan luaran sahaja.

Kesan-kesan sampingan

Produk ini boleh mengakibatkan sawan, sakit kepala, pening, loya dan muntah, kerengsaan pada kulit, dermatitis sentuh, ruam, kegatalan, kemerahan, lebam, rasa terbakar dan rasa sengat. Boleh menyebabkan hipersensitiviti atau alahan pada sesetengah individu yang berkulit sensitif.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara simpan dan lupus IKOP iSalic™ Ointment

- Penyimpanan

Simpan pada suhu di bawah 30°C. Sila pastikan tiub sentiasa ditutup dan simpan di tempat yang terlindung dari cahaya matahari.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak seharusnya dilupuskan melalui air kumbahan atau sampah domestik. Sila bertanya ahli farmasi anda mengenai cara pelupusan ubat yang tidak digunakan lagi.

Butiran Produk

- Rupa produk

Salap yang berwarna putih kekuningan dengan aroma harum metil salisilat dan kapur barus dan rasa sejuk daripada mentol.

- Bahan-bahan kandungan

- Aktif

- Metil salisilat
- Kapur barus
- Mentol

- Tidak Aktif

- Lilin lebah
- Jeli petroleum

- Nombor MAL

MAL20046145X

Pemegang Pendaftaran Produk dan Pengilang

IKOP Sdn Bhd,
Jalan Sultan Ahmad Shah,
25200, Kuantan, Pahang,
Malaysia.
Tel: +6095716684

Tarikh Kemaskini RiMUP

02/12/2020

Nombor Siri

NPRA(R2/1)201218/582