

Yesintek™ Solution for Injection in Prefilled Syringe

Ustekinumab (45mg/0.5mL, 90mg/1mL)

Apakah yang ada pada Risalah ini:

- 1) Apakah kegunaan Yesintek
- 2) Bagaimana Yesintek berfungsi
- 3) Sebelum menggunakan Yesintek
- 4) Cara menggunakan Yesintek
- 5) Semasa menggunakan Yesintek
- 6) Kesan – kesan sampingan
- 7) Cara penyimpanan dan pelupusan Yesintek
- 8) Maklumat lanjut
- 9) Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
- 10) Tarikh kemaskini
- 11) Nombor Siri

1) Apakah kegunaan Yesintek

Yesintek ialah ubat preskripsi yang telah diluluskan untuk:

- Orang dewasa yang menghidap psoriasis plak pada tahap sederhana hingga teruk yang kronik (tidak sembuh)
- Orang dewasa dengan artritis psoriatik aktif, penyakit radang sendi yang biasanya disertai dengan psoriasis
- Orang dewasa dengan aktif ulcerative colitis yang tahap sederhana hingga serius

2) Bagaimana Yesintek berfungsi

Yesintek menyekat tindakan dua jenis protein dalam tubuh yang dipanggil interleukin 12 (IL-12) dan interleukin 23 (IL-23). IL-12 dan IL-23 dihasilkan oleh sistem imun tubuh anda. Bagi pesakit psoriasis, psoriatik artritis atau Crohn's disease, IL-12 dan IL-23 boleh menyebabkan sistem imun mereka menyerang bahagian badan yang sihat. Yesintek dapat menyekat IL-12 dan IL-23 daripada menyebabkan sistem imun menyerang kulit, kuku, sendi atau saluran penghadaman.

3) Sebelum menggunakan Yesintek

Bila tidak boleh menggunakannya

Anda tidak sepatutnya menggunakan Yesintek jika anda mengalami:

- tindak balas alahan kepada Yesintek atau apa-apa bahan lain dalam Yesintek. Lihat akhir pelabelan ini untuk senarai lengkap bahan dalam Yesintek.

Sebelum mula menggunakan Yesintek

Doktor anda akan menilai kesihatan anda sebelum setiap rawatan.

Anda perlu memberitahu doktor anda mengenai semua keadaan perubatan anda sebelum setiap rawatan, termasuk jika anda:

- pernah mengalami tindak balas alahan kepada Yesintek. Tanya doktor anda jika anda tidak pasti.
- mengalami sebarang jangkitan, walaupun ianya sangat ringan.
- mengalami jangkitan yang tidak sembuh atau sejarah jangkitan yang kerap berulang.
- pernah menghidap TB (tuberkulosis atau batuk kering), atau jika anda telah mendekati sesiapa yang menghidap TB baru-baru ini.
- sedang atau pernah mengalami apa-apa jenis kanser.
- mengalami sebarang lesi yang baharu atau yang berubah pada bahagian psoriasis atau kulit normal anda.
- baru-baru ini telah menerima atau dijadualkan untuk menerima vaksin. Beritahu doktor anda jika sesiapa di dalam rumah anda memerlukan vaksin. Virus dalam sesetengah vaksin boleh merebak kepada individu yang memiliki sistem imun yang lemah dan berpotensi menyebabkan masalah serius.
- sedang menerima atau telah menerima 'suntikan alahan', terutamanya untuk tindak balas alahan serius.
- mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusukan badan. Tanya doktor anda sebelum menggunakan ubat ini. Yesintek boleh digunakan semasa mengandung jika ianya benar-benar perlu. Yesintek boleh masuk ke dalam susu ibu dalam jumlah yang sangat kecil. Wanita yang sedang menyusukan badan hendaklah berbincang dengan doktor mereka sama ada menggunakan Yesintek ataupun tidak
- alah kepada lateks.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda tentang semua ubat yang anda ambil, termasuk ubat preskripsi dan tanpa preskripsi, vitamin, serta makanan tambahan herba.

Ketahui ubat yang anda ambil. Simpan senarai ubat anda dan tunjukkannya kepada doktor dan ahli farmasi anda apabila anda memperoleh ubat baharu.

4) Cara menggunakan Yesintek

- Bagi rawatan psoriasis dan artritis psoriatik, Yesintek diberikan melalui suntikan di bawah kulit.
- Untuk rawatan Crohn's disease atau ulcerative colitis, dos pertama Yesintek akan diberikan melalui infusi intravena (ubat itu akan diberikan kepada anda melalui jarum yang diletakkan di dalam vena). Dos ini akan diberikan oleh ahli kesihatan anda. Selepas itu, Yesintek akan diberikan melalui suntikan di bawah kulit.
- Yesintek bertujuan untuk digunakan di bawah panduan dan penyeliaan doktor anda. Jika doktor anda memutuskan bahawa ia adalah wajar, anda boleh menyuntik di bawah kulit sendiri Yesintek selepas mendapat latihan yang secukupnya mengenai teknik suntikan menggunakan jenis picagari yang betul dan jumlah (isi padu) yang akan disuntik (sila rujuk "**Arahan untuk Menyuntik Yesintek di bawah kulit sendiri**").
- Doktor anda akan menentukan dos Yesintek yang sesuai untuk anda, jumlah bagi setiap suntikandan berapa kerap anda perlu menerimanya. Pastikan anda bincang dengan doktor anda bila anda akan menerima suntikan dan datang untuk semua temu janji susulan anda yang dijadualkan.


Cara menggunakannya

- Yesintek diberikan secara suntikan di bawah kulit ('subkutaneus'). Pada permulaan rawatan anda, kakitangan perubatan atau jururawat boleh menyuntik Yesintek.
- Walau bagaimanapun, anda dan doktor anda boleh memutuskan anda boleh menyuntik Yesintek sendiri. Dalam kes ini, anda akan mendapat latihan tentang cara menyuntik Yesintek untuk diri sendiri.
- Berbincang dengan doktor anda jika anda mempunyai sebarang soalan berkaitan memberi suntikan kepada diri sendiri.

Penyelesaian untuk Suntikan bagi Pentadbiran Subkutaneus (Suntikan Pra-Isi)

Yesintek™ Solution for Injection in Prefilled Syringe

Ustekinumab (45mg/0.5mL, 90mg/1mL)



Rajah 1: Picagari yang telah diisi awal

Arahan untuk guna suntikan Yesintek di bawah kulit dengan sendiri

Pada permulaan rawatan, penyedia penjagaan kesihatan anda akan membantu anda dengan suntikan pertama. Walau bagaimanapun, anda dan doktor anda mungkin memutuskan bahawa anda boleh menyuntik Yesintek sendiri. Jika ini berlaku, anda akan menerima latihan tentang cara menyuntik Yesintek.

Bercakaplah dengan doktor anda jika anda mempunyai sebarang soalan tentang memberikan suntikan kepada diri sendiri.

- Jangan campurkan Yesintek dengan cecair lain untuk suntikan.
- Jangan goncang picagari pra-isi Yesintek. Ini kerana goncangan yang kuat boleh merosakkan ubat. Jangan gunakan ubat ini jika ia telah digoncang dengan kuat.

1. Periksa bilangan picagari pra-isi dan sediakan bahan-bahan:

Sebelum menggunakan picagari pra-isi:


- Keluarkan picagari daripada peti sejuk dan biarkan ia berada di luar kotak selama lebih kurang 30 minit. Ini membolehkan cecair dalamnya mencapai suhu bilik, iaitu suhu yang selesa untuk suntikan. Jangan tanggalkan penutup jarum semasa menunggu picagari menjadi suhu bilik.
- Pegang picagari pra-isi pada bahagian badannya, dengan jarum yang masih bertutup menghala ke atas.
- Jangan pegang pada kepala pelocok, batang pelocok, sayap pelindung jarum, atau penutup jarum.
- Jangan tarik pelocok ke belakang pada bila-bila masa.

- Jangan cuba untuk menanggalkan pelindung keselamatan jarum daripada picagari.
- Jangan buka penutup jarum sehingga anda diarah untuk melakukannya.
- Periksa picagari pra-isi untuk memastikan bilangan picagari dan kekuatan ubat adalah betul.
- Ubat yang anda terima adalah ubat yang sepatutnya.
- Ubat belum melepasi tarikh luput.
- Pastikan picagari tidak rosak.
- Pastikan bahawa cecair di dalamnya adalah jernih, tidak berwarna atau kuning pucat.
- Cecair tidak sepatutnya berubah warna, tidak kelihatan keruh, tidak mengandungi sebarang zarah asing
- Pastikan cecair tidak beku.
- Sediakan semua bahan yang diperlukan dan susun di atas permukaan yang bersih, rata, dan terang. Bahan-bahan yang diperlukan termasuk tisu antiseptic, bebola kapas atau kain kasa, serta bekas buangan tajam (sharps container).

Kumpulkan keperluan

Sediakan semua peralatan yang diperlukan dan letakkan di atas permukaan yang bersih, rata, dan terang. Peralatan tersebut termasuk:

- tisu antiseptic,
- bola kapas atau kain kasa
- bekas buangan tajam
- dos suntikan Yesintek™ yang telah ditetapkan (lihat **Rajah 2**)



2. Pilih dan sediakan tempat suntikan:

Pilih tempat suntikan (lihat **Rajah 3**)

- Yesintek diberikan melalui suntikan di bawah kulit (secara subkutaneus).

- Tempat yang sesuai untuk suntikan ialah bahagian atas paha atau sekitar perut (abdomen), sekurang-kurangnya 5 cm dari pusat.
- Jika boleh, elakkan Kawasan kulit yang menunjukkan tanda-tanda psoriasis.
- Jika ada orang yang membantu anda melakukan suntikan, bahagian atas lengan juga boleh dijadikan tempat suntikan.



Figure 3

*Kawasan berwarna biru adalah tempat suntikan yang disarankan.

Sediakan tempat suntikan

- Pilih permukaan kerja yang rata, bersih dan terang.
- Basuh tangan dengan bersih menggunakan sabun dan air suam.
- Lap kawasan suntikan pada kulit dengan tisu antiseptik.
- Jangan sentuh kawasan ini lagi sebelum melakukan suntikan. Biarkan kulit anda kering sebelum menyuntik.
- Keluarkan dulang picagari praisian daripada kotak.
- Buka dulang dengan mengupas penutupnya. Pegang pelindung keselamatan jarum.
- (seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4) untuk mengeluarkan picagari praisian daripada dulang.




Figure 4

Pegang picagari praisian dengan jarum yang masih bertutup menghala ke atas.

3. Tanggalkan penutup jarum (lihat **Rajah 5**):

- Penutup jarum tidak sepatutnya ditanggalkan sehingga anda benar-benar bersedia untuk menyuntik dos.

Yesintek™ Solution for Injection in Prefilled Syringe

Ustekinumab (45mg/0.5mL, 90mg/1mL)

- Pegang picagari praisian- pegang bahagian badan picagari dengan sebelah tangan.
- Tarik penutup jarum secara lurus dan buangkannya. Jangan sentuh pelocok semasa melakukan ini.




Figure 5

- Anda mungkin akan melihat gelembung udara dalam picagari praisian atau titisan cecair di hujung jarum. Ini adalah perkara biasa dan tidak perlu dibuang.
- Jangan sentuh jarum atau biarkan ia menyentuh sebarang permukaan.
- Jangan gunakan picagari praisian jika ia terjatuh tanpa penutup jarum. Jika ini berlaku, sila hubungi doktor atau ahli farmasi.
- Suntik dos dengan segera selepas penutup jarum ditanggalkan.

4. Suntik dos

- Pegang picagari praisian dengan sebelah tangan di antara jari tengah dan jari telunjuk, dan letakkan ibu jari di atas kepala pelocok. Gunakan tangan sebelah lagi untuk mencubit perlahan kawasan kulit yang telah dibersihkan, di antara ibu jari dan jari telunjuk anda.
- Jangan mencubit terlalu kuat
- Jangan tarik pelocok ke belakang pada bila-bila masa.
- Dalam satu pergerakan pantas dan lancar, cucuk jarum sepenuhnya ke dalam kulit (lihat Rajah 6).




FIGURE 6

Suntik keseluruhan ubat dengan menekan pelocok sepenuhnya sehingga kepala pelocok berada sepenuhnya di antara sayap pelindung jarum (lihat Rajah 7).



FIGURE 7

Apabila pelocok telah ditekan sepenuhnya, teruskan menekan kepala pelocok, keluarkan jarum dan lepaskan kulit (lihat Rajah 8).




FIGURE 8

Perlahan-lahan angkat ibu jari anda dari kepala pelocok untuk membolehkan picagari kosong bergerak ke atas sehingga keseluruhan jarum dilitupi oleh pelindung jarum, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 8:



FIGURE 9

5. Selepas suntikan:

- Tekap kawasan suntikan dengan tisu antiseptik selama beberapa saat selepas suntikan.
- Mungkin terdapat sedikit darah atau cecair di kawasan suntikan. Ini adalah perkara biasa.
- Anda boleh menangkap bebola kapas atau kain kasa pada kawasan suntikan dan tahan selama 10 saat.
- Jangan gosok kulit di kawasan suntikan. Anda boleh menutup kawasan suntikan dengan plaster kecil jika perlu.

6. Pelupusan:

- Picagari yang telah digunakan hendaklah dibuang ke dalam bekas tahan tusukan, seperti bekas buangan tajam (lihat Rajah 10). Jangan sekali-kali menggunakan semula picagari demi keselamatan dan kesihatan anda serta orang lain. Buang bekas buangan tajam mengikut peraturan tempatan.

- Tisu antiseptik dan bahan lain boleh dibuang ke dalam tong sampah biasa.



FIGURE 10

Berapa banyak harus digunakan

Doktor anda akan menentukan dos Yesintek yang betul untuk anda, jumlah bagi setiap suntikan dan kekerapan anda perlu menerimanya. Pastikan anda berbincang dengan doktor anda tentang bila anda perlu menerima suntikan dan bila anda perlu datang untuk semua temu janji susulan yang telah dijadualkan.

Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil Yesintek untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Jika terlupa menggunakan

Ambil suntikan anda sebaik sahaja anda teringat.

Jangan gandakan suntikan. Jika anda telah tertinggal lebih daripada satu dos, atau anda tidak pasti apa yang patut dilakukan, rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Jika anda sukar untuk mengingat bila anda perlu mengambil ubat anda, minta nasihat daripada ahli farmasi anda.

Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat.

Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang rasa tidak selesa atau tanda keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

5) Semasa menggunakan Yesintek

Perkara yang perlu dilakukan

Sentiasa mematuhi arahan doktor anda dengan teliti.

Yesintek™ Solution for Injection in Prefilled Syringe

Ustekinumab (45mg/0.5mL, 90mg/1mL)

- Beritahu doktor anda tentang keadaan perubahan anda sebelum setiap kali sebelum rawatan (lihat *Sebelum anda menggunakan Yesintek*).
- Maklumkan kepada doktor anda jika anda menjadi hamil semasa menggunakan Yesintek.
- Jika anda akan mula mengambil ubat baru, beritahu doktor atau ahli farmasi anda bahawa anda sedang mengambil Yesintek.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Anda tidak boleh menerima vaksin hidup semasa mengambil Yesintek.
- Jika anda menggunakan Yesintek semasa kehamilan, sila beritahu doktor bayi anda tentang penggunaan Yesintek anda sebelum bayi menerima sebarang vaksin, termasuk vaksin hidup, seperti vaksin BCG (digunakan untuk mencegah batuk kering), vaksin rotavirus, atau mana-mana vaksin hidup lain.
- Ubat kadangkala ditetapkan pengambilannya bagi tujuan yang tidak dinyatakan dalam risalah maklumat pesakit. Jangan gunakan Yesintek untuk keadaan yang ia tidak dipreskripsi.
- Jangan berkongsi ubat ini dengan sesiapa, walaupun mereka simptom yang same.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin jentera Yesintek tidak mengganggu, atau hanya sedikit mengganggu, keupayaan anda untuk memandu dan mengendalikan jentera.

6) Kesan – kesan sampingan

Seperti semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Kesan Sampingan Serius

- Reaksi Alahan** – ini mungkin memerlukan rawatan segera. Beritahu doktor anda atau dapatkan bantuan perubahan kecemasan dengan segera jika anda melihat mana-mana tanda berikut
 - Reaksi alahan yang serius ('anafilaksis') jarang berlaku pada orang yang mengambil Yesintek (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 1,000 orang)

- kesukaran bernafas atau menelan
 - tekanan darah rendah, yang boleh menyebabkan pening.
 - bengkak pada muka, bibir, mulut atau tekak
- Tanda-tanda biasa tindak balas alahan termasuk ruam kulit dan gatal-gatal (ini boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 100 orang).
 - Dalam kes-kes yang jarang berlaku, reaksi alahan paru-paru dan keradangan paru-paru telah dilaporkan pada pesakit yang menerima Yesintek. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami gejala seperti batuk, sesak nafas, dan demam.

Jika anda mempunyai reaksi alahan yang serius, doktor anda mungkin memutuskan anda tidak boleh menggunakan Yesintek lagi.

ii. Jangkitan – Ini mungkin memerlukan rawatan segera. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami mana-mana tanda-tanda berikut.

- Jangkitan hidung atau tekak dan selesema biasa adalah perkara biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 10 orang).
- Jangkitan dada adalah luar biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 100 orang).
- Keradangan tisu di bawah kulit ('selulitis') adalah luar biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 100 orang).
- Kayap (sejenis ruam melepuh yang menyakitkan) adalah luar biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 100 orang)

Yesintek boleh menurunkan keupayaan anda melawan jangkitan. Sesetengah jangkitan boleh menjadi serius dan mungkin termasuk jangkitan yang disebabkan oleh virus, kulat, bakteria (termasuk tuberkulosis), atau parasit, termasuk jangkitan yang selalunya berlaku pada orang yang mempunyai sistem imun yang lemah (jangkitan oportunistik). Jangkitan oportunistik otak (ensefalitis, meningitis), paru-paru, dan mata telah dilaporkan pada pesakit yang menerima rawatan dengan Yesintek.

Anda perlu memerhatikan tanda-tanda jangkitan semasa anda menggunakan Yesintek. Ini termasuklah:

- demam, gejala seperti selesema, berpeluh malam, penurunan berat badan
- berasa letih atau sesak nafas; batuk yang tidak akan hilang
- kulit panas, merah dan sakit, atau ruam kulit yang menyakitkan dengan kudis
- rasa terbakar apabila air lalu
- cirit-birit
- gangguan visual atau kehilangan penglihatan
- sakit kepala, kekakuan leher, sensitiviti terhadap cahaya, loya atau kekeliruan

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda melihat mana-mana tanda-tanda jangkitan ini. Ini mungkin tanda-tanda jangkitan seperti jangkitan dada, jangkitan kulit, kayap atau jangkitan oportunistik yang boleh menyebabkan komplikasi serius. Beritahu doktor anda jika anda mempunyai apa-apa jenis jangkitan yang tidak sembuh atau berulang. Doktor anda mungkin memutuskan bahawa anda tidak boleh menggunakan Yesintek sehingga jangkitan hilang. Juga beritahu doktor anda jika anda mempunyai luka terbuka atau kudis kerana ia mungkin dijangkiti.

iii. Pengelupasan kulit – peningkatan pada kemerahan kulit dan pengelupasan kulit di kawasan yang lebih besar mungkin gejala psoriasis erythrodermik atau dermatitis exfoliatif, yang merupakan keadaan kulit yang serius. Anda perlu memberitahu doktor anda dengan segera jika anda melihat mana-mana tanda-tanda ini.

iv. Alah kepada lateks - Penutup jarum pada picagari praisi mengandungi getah semula jadi kering (jenis lateks). Ia boleh menyebabkan tindak balas alahan dalam kalangan individu yang sensitif kepada lateks. Beritahu doktor anda jika anda pernah mengalami tindak balas alahan kepada lateks dan mengalami *sebarang tindak balas alahan kepada suntikan Yesintek*

v. Kanser - Banyak ubat seperti Yesintek yang boleh mengurangkan aktiviti sistem imun boleh meningkatkan risiko menghidap kanser. Beritahu doktor anda jika anda pernah menghidap sebarang jenis kanser.

Yesintek™ Solution for Injection in Prefilled Syringe

Ustekinumab (45mg/0.5mL, 90mg/1mL)

Kesan Sampingan Lain

Kesan sampingan biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 10 orang):

- Cirit-birit
- Rasa loya
- Muntah
- Rasa letih
- Rasa pening
- Sakit kepala
- Gatal-gatal ('pruritus')
- Sakit belakang, otot atau sendi
- Sakit tekak
- Kemerahan kulit dan kesakitan di mana suntikan diberikan
- Jangkitan sinus

Jika anda mendapat apa-apa kesan sampingan, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda. Ini termasuk sebarang kemungkinan kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan dengan melayari laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting side effects to medicines (ConSERF) or vaccines (AEFI)*].

7) Cara Penyimpanan dan Pelupusan Yesintek

Penyimpanan:

- Simpan di dalam peti sejuk pada suhu 2°C hingga 8°C. Jangan bekukan. Jangan goncang.
- Simpan picagari pra-isi di dalam karton asal bagi melindungi daripada cahaya.
- Jika perlu, picagari pra-isi individu boleh disimpan pada suhu bilik sehingga 30°C untuk tempoh maksimum sehingga 30 hari dalam karton asal untuk melindungi daripada cahaya. Catat tarikh apabila picagari pra-isi pertama kali dikeluarkan dari peti sejuk dan tarikh buang di ruang yang disediakan pada karton. Tarikh pembuangan tidak boleh melebihi tarikh luput asal yang dicetak pada karton.
- Buang picagari jika tidak digunakan dalam tempoh 30 hari pada penyimpanan suhu bilik atau tarikh luput yang asal, yang mana lebih awal.

- Sebaik sahaja picagari disimpan pada suhu bilik, ia tidak boleh dikembalikan ke peti sejuk.

11) Nombor Siri
(R3)25/92

Pelupusan:

Picagari yang sudah digunakan hendaklah dimasukkan ke dalam bekas yang kalis penembusan, seperti bekas barangan tajam. Lupuskan bekas jarum tersebut mengikut peraturan tempatan anda. Vial kosong, kapas antiseptik dan alatan lain boleh dibuang ke dalam tong sampah biasa anda. Picagari, jarum dan botol tidak boleh digunakan semula. Buang mana- mana bahagian Yesintek yang tidak digunakan mengikut keperluan tempatan.

8) Maklumat Lanjut

Rupa dan Warna produk

Yesintek adalah jernih, larutan untuk suntikan tidak berwarna hingga kekuningan.

Bahan – bahan kandungan

- Bahan Aktif
Bahan aktif ialah ustekinumab.
- Bahan Tidak Aktif
Bahan tidak aktif termasuk: L- histidina, L-histidina monohidroklorida monohidrat, polisorbitat 80, sukrosa dan air untuk suntikan. Ia tidak mengandungi pengawet.

Nombor MAL

Yesintek 45mg/0.5ml: MALXXXXXXXXXX
Yesintek 90mg/1ml : MALXXXXXXXXXX

9) Pengilang:

Biocon Biologics Limited
Block No. B1, B2, B3, Q13 of Q1 and W20
& Unit S18, 1st Floor, Block B4,
Special Economic Zone,
Plot No. 2,3,4 & 5, Phase IV,
Bommasandra-Jigani Link Road,
Bengaluru 560099, India.

Pemegang Pendaftaran Produk:

Biocon Sdn. Bhd.
No.1, Jalan Bioteknologi 1,
Kawasan Perindustrian SiLC,
79200 Iskandar Puteri, Johor, Malaysia.

10) Tarikh Kemaskini

27/05/2025