

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan MONTULAR
2. Bagaimana MONTULAR berfungsi
3. Sebelum menggunakan MONTULAR
4. Cara menggunakan MONTULAR
5. Semasa menggunakan MONTULAR
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan MONTULAR
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan MONTULAR

Gunakan untuk merawat:

- Asma, termasuk mencegah gejala asma anda pada waktu siang dan malam. MONTULAR juga mencegah halangan saluran nafas yang disebabkan oleh senaman.
- Rhinitis alahan termasuk gejala pada masa siang dan malam: kesesakan hidung, hidung berair, hidung bergatal, dan bersin; kesesakan hidung apabila terbangun pada pagi, kesukaran untuk tidur, dan kebangkitan pada masa tidur; mata yang berair, rasa gatal, merah, dan bengkak.

Bagaimana MONTULAR berfungsi

Fungsi Montelukast didasarkan pada penyumbatan reseptor *cysteinyl leukotriene (CysLT)*. *Leukotrien cysteinyl (LTC4, LTD4, LTE4)* adalah molekul *eicosanoid* keradangan dan telah dikaitkan dengan patofisiologi asma dan rinitis alahan.

Sebelum menggunakan MONTULAR

-Bila tidak boleh menggunakan

Pesakit perlu dinasihatkan supaya tidak menggunakan montelukast oral untuk merawat serangan asma yang teruk. Montelukast tidak boleh digantikan dengan tiba-tiba dengan kortikosteroid yang disedut atau oral.

Kegunaan semasa hamil

Wanita yang hamil atau berhasrat untuk hamil harus berjumpa doktor sebelum mengambil MONTULAR.

Kegunaan semasa penyusuan susu ibu

Ia tidak diketahui jika MONTULAR masuk ke dalam susu ibu. Anda perlu berbincang dengan doktor sebelum

mengambil MONTULAR jika anda menyusui atau berhasrat untuk menyusui bayi.

-Sebelum mula menggunakan

Doktor anda perlu tahu sebelum anda mengambil MONTULAR, jika anda mempunyai atau pernah mempunyai sebarang keadaan berikut:

- alergi yang anda ada atau pernah ada
- Dan jika anda mengambil apa-apa ubat, seperti *phenytoin*, *phenobarbital* dan *rifampicin*, kerana ubat-ubatan ini tidak boleh diambil bersama dengan MONTULAR.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil apa-apa ubat lain, termasuk mana-mana yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan MONTULAR

-Berapa banyak harus digunakan

Ambil MONTULAR sekali sehari dengan atau tanpa makanan, seperti yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Dos untuk orang dewasa dan remaja berusia 15 tahun ke atas untuk rawatan asma dan / atau rinitis alahan adalah satu tablet 10 mg setiap hari.

-Bila perlu digunakan

Ia harus diambil seperti yang ditetapkan oleh doktor

Berapa lama perlu digunakan

Anda harus terus mengambil Montular selagi diarahkan oleh doktor anda

-Jika terlupa menggunakan

Sekiranya anda lupa mengambil dos secara tidak sengaja, ambil dos yang berikutnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda menganggap anda atau sesiapa mungkin mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak tablet boleh menyebabkan kesan sampingan seperti perut sakit, mengantuk, dahaga, sakit kepala, muntah, dan keadaan psikomotor hyperaktif. Sekiranya mengambil lebih dos, tindakan sokongan umum untuk symptom yang ditunjukkan diperlukan.

Semasa menggunakan MONTULAR

Semasa menggunakan MONTULAR

Ambil ubat anda seperti yang telah diberitahu oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil MONTULAR.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil MONTULAR jika alah kepada mana-mana bahan-bahan kandungan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali jika dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jangan berikan MONTULAR kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai gejala atau keadaan yang sama seperti anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian Memandu dan menggunakan mesin

MONTULAR tidak dijangka untuk menjejaskan keupayaan pesakit untuk memandu kereta atau mengendalikan jentera. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes-kes yang jarang berlaku, sesetengah individu telah dilaporkan rasa mengantuk atau pening.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya. Lawati doktor atau ahli farmasi dengan segera jika anda mengalami apa-apa kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

- tindakbalas reaksi termasuk ruam, bengkak pada muka, bibir, lidah, dan / atau tekak yang mungkin menyebabkan kesukaran bernafas atau menelan (kesan sampingan tidak biasa)
- benjolan merah di bawah kulit, dimana yang paling biasa pada kulit depan kaki di bawah lutut anda (*erythema nodosum*), reaksi kulit yang teruk (*erythema multiforme*) yang mungkin berlaku tanpa amaran (kesan sampingan sangat jarang)
- Pemikiran dan tindakan membunuh (kesan sampingan sangat jarang berlaku)

Beritahu ahli penjaga kesihatan anda dengan segera jika anda melihat mana-mana perubahan tingkah laku dan emosi yang berkaitan
- Gejala-gejala obsesif kompulsif

Kesan sampingan yang paling biasa berlaku ketika mengambil MONTULAR disenaraikan di bawah. Ini boleh hilang semasa rawatan kerana tubuh anda menyesuaikan diri dengan ubat ini. Beritahu doktor anda jika mana-mana kesan sampingan ini terus mengganggu anda.

Kesan sampingan yang sangat biasa (berlaku dalam sekurang-kurangnya 1 dalam 10 orang yang mengambil MONTULAR):
- jangkitan pada saluran nafas atas

Kesan sampingan biasa (mungkin berlaku kurang dari 1 dalam 10 orang)
-cirit-birt, mual, muntah-muntah
-ruam
-demam

Kesan sampingan yang tidak biasa (yang berlaku dalam masa kurang dari 1 dalam 100 orang) yang mengambil MONTULAR adalah:
- perubahan tingkahlaku dan angin yang berkaitan [keabnormalan mimpi, termasuk mimpi buruk, kesukaran untuk tidur, berjalan semasa tidur, kerengsaan, rasa gelisah, pergolakan termasuk tingkah laku yang agresif, kemurungan]
-pening, mengantuk, rasa pin dan jarum / kebas-kebas, konvulsi, hidung berdarah
-mulut kering, senak
-lebam, gatal-gatal
- sakit sendi atau otot, kekejangan otot
- kelesuan / keletihan, berasa tidak sihat, bengkak

Kesan sampingan yang jarang berlaku yang berlaku kurang dari 1 dalam 1,000 orang yang mengambil MONTULAR adalah:
- kecenderungan untuk pendarahan bertambah
-mengganggu perhatian, gangguan pengingatan
-denyut jantung tidak teratur
- tremor;

Kesan sampingan yang sangat jarang berlaku yang berlaku kurang dari 1 dalam 10,000 orang yang mengambil MONTULAR adalah:
- halusinasi, disorientasi
-hepatitis (keradangan hati)
-keradangan pada paru-paru

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel. 03-78835490, atau laman web npa.moh.gov.my (*Public --> Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI/Vaccine Safety*)

Cara penyimpanan dan pelupusan MONTULAR

-Penyimpanan

Simpan di bawah 30 ° C di tempat yang kering, terlindung dari cahaya. Jauhkan dari jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.

-Pelupusan

Jangan buang ubat-ubatan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana membuang ubat-ubatan yang tidak digunakan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet berwarna beige berbentuk biconvex bulat, bersalut filem dengan permukaan datar di kedua-dua sisi.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif: Montelukast

Bahan-bahan tidak aktif:
Microcrystalline Cellulose (Avicel PH102), croscarmellose sodium, sodium lauryl sulphate, magnesium stearate, purified water and opadry 20A520035 yellow.

- Nombor MAL: MAL19016008AZ

Pengilang

Kusum Healthcare Private Limited
SP-289 (A), RIICO Industrial Area, Chopanki, Bhiwadi, Alwar, (Rajasthan), India
Phone: 91-1493-516560
Fax: 91-1493-516562

Pemegang Pendaftaran Produk Synerrv Sdn Bhd,

SO-29-2, Menara 1, KL Eco City, Jalan Bangsar, KG Haji Abdullah Hukum, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh kemas kini RIMUP
10/05/2019

Serial Number

NPRA(R2/1)190614/165