

LETRODAY 2.5 (Letrozole Tablets 2.5mg)

Letrozole 2.5mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan LETRODAY 2.5
2. Bagaimana LETRODAY 2.5 berfungsi
3. Sebelum mengambil LETRODAY 2.5
4. Cara menggunakan LETRODAY 2.5
5. Semasa menggunakan LETRODAY 2.5
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan LETRODAY 2.5
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan LETRODAY 2.5

Letrozole digunakan untuk merawat kanser payudara di kalangan wanita yang telah melalui menopause (putus haid).

Ia boleh mencegah kanser berulang dan digunakan sebagai rawatan permulaan sebelum pembedahan kanser payudara di mana pembedahan tidak sesuai dilakukan dengan segera atau ia boleh digunakan sebagai rawatan permulaan selepas pembedahan kanser payudara atau selepas rawatan lima tahun dengan ubat yang dipanggil *Tamoxifen*.

Letrozole juga boleh digunakan untuk mencegah tumor payudara merebak ke bahagian-bahagian badan yang lain pada pesakit kanser payudara tahap lewat.

Tanya doktor anda sekiranya mempunyai sebarang persoalan bagaimana *Letrozole* berfungsi atau kenapa ubat ini diberikan kepada anda.

Bagaimana LETRODAY 2.5 berfungsi

LETRODAY 2.5 mengandungi *Letrozole*. Ia tergolong dalam

kategori ubat yang dipanggil ‘*aromatase inhibitor*’. Ia adalah hormon (atau ‘*endocrine*’) rawatan kanser payudara. Pertumbuhan kanser payudara selalunya dirangsang oleh *oestrogen* iaitu hormon seks wanita. *Letrozole* mengurangkan jumlah *oestrogen* dengan menyekat enzim *aromatase* yang terlibat di dalam pengeluaran *oestrogen* dan oleh itu, boleh menghalang pertumbuhan kanser payudara yang memerlukan *oestrogen* untuk tumbuh.

Dengan ini, pertumbuhan sel tumor menjadi perlahan atau berhenti membesar dan/atau merebak ke bahagian-bahagian badan yang lain.

Sebelum mengambil LETRODAY 2.5

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini sekiranya anda tidak pasti status menopause anda atau anda masih mempunyai kitaran haid. Sila pastikan dengan doktor anda.

Jika anda alah kepada mana-mana bahan ubat ini seperti disenaraikan dalam risalah ini.

Jika anda hamil, sedang merancang sebuah keluarga atau disyaki hamil.

Jika anda sedang menyusui bayi.

-Sebelum mula mengambil

Sila semak status menopause anda dengan doktor sebelum menggunakan LETRODAY 2.5.

Beritahu doktor anda sekiranya fungsi buah ginjal atau hati anda kurang baik sebelum menggunakan LETRODAY 2.5.

Beritahu doktor anda sekiranya anda mempunyai sejarah *osteoporosis* (tulang yang lemah dan mudah retak), retakkan tulang atau berisiko mengalami keadaan yang disebut.

Sekiranya anda mengalami *tendonitis* (radang pada *tendon* iaitu tisu yang menghubungkan otot pada tulang) atau *tendon* yang koyak, sila beritahu

doktor anda sebelum mengambil LETRODAY 2.5.

Beritahu doktor anda sekiranya anda mengambil apa-apa ubat yang boleh mempengaruhi hormon anda seperti *Tamoxifen* kerana terdapat interaksi antara ubat.

LETRODAY 2.5 tidak disyorkan untuk pesakit yang tidak dapat menghadam laktosa kerana ubat ini mengandungi laktosa.

Ikuti semua arahan doktor atau ahli farmasi anda. Arahan tersebut mungkin berbeza dari arahan dalam risalah ini.

Jika anda tidak yakin mengambil ubat ini, sila dapatkan nasihat dari doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor anda sekiranya anda sedang mengambil ubat yang lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan. Keberkesanan LETRODAY 2.5 boleh dikurangkan oleh sebuah ubat yang dipanggil *Tamoxifen* atau ubat anti-*oestrogen* yang lain. Jika anda sedang mengambil *Tamoxifen* atau ubat anti-*oestrogen* yang lain, anda dinasihatkan supaya tidak mengambil LETRODAY 2.5.

Jika anda sedang dirawat dengan ubat bernama *Phenytoin* (untuk merawat sawan) atau *Clopidogrel* (untuk mencairkan darah), dapatkan nasihat doktor anda.

Cara menggunakan LETRODAY 2.5

-Berapa banyak harus digunakan

Di dalam semua situasi, dos yang disarankan ialah satu biji LETRODAY 2.5 diambil sekali sehari.

Tempoh rawatan bergantung kepada perkembangan anda dan nasihat doktor anda setelah menilai anda.

Ikuti semua arahan yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi anda

LETRODAY 2.5 (Letrozole Tablets 2.5mg)

Letrozole 2.5mg

dengan teliti. Arahan mungkin berbeza dengan maklumat yang terdapat dalam risalah ini. Sekiranya anda tidak memahami arahan pada label, minta bantuan doktor atau ahli farmasi anda

-Bila perlu digunakan

Guna seperti diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Guna LETRODAY 2.5 selama disyorkan doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Rujuk doktor atau ahli farmasi anda mengenai perkara yang harus anda lakukan sekiranya anda lupa menggunakannya.

Ambil dos yang terlupa sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya sudah hampir masanya untuk dos seterusnya, ambil dos seterusnya sahaja dan lupakan dos yang terlupa. Jangan gantikan dos untuk menggantikan dos yang terlupa.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan dengan segera.

Semasa menggunakan LETRODAY 2.5

-Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda seperti yang diarahkan doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi anda bahawa anda sedang mengambil LETRODAY 2.5.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini tanpa nasihat doktor anda.

Jangan ambil ubat-ubat baru yang lain sekiranya belum lagi mendapatkan nasihat dari doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan kongsi ubat ini dengan sesiapa walaupun mereka mempunyai gejala yang sama seperti anda. Ubat ini khas diberikan kepada kamu sahaja.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera – Kesan kecil seperti keletihan, pening dan mengantuk telah diperhatikan semasa LETRODAY 2.5 diambil. Anda disarankan berhati-hati semasa memandu atau mengendalikan jentera semasa mengambil ubat ini.

Intoleransi laktosa – LETRODAY 2.5 mengandungi laktosa di dalam penyediaannya. Sekiranya anda alah atau tidak dapat menghadam laktosa, hubungi doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, LETRODAY 2.5 boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami kesan sampingan semasa mengambil ubat ini.

LETRODAY 2.5 secara umumnya ditoleransi dengan baik. Kesan sampingan biasanya ringan atau sederhana, dan kebanyakannya dikaitkan dengan kekurangan *oestrogen*.

Kesan sampingan yang biasa dialami disenaraikan dibawah:

- Selera makan meningkat atau mengurang
- Kemurungan
- Sakit kepala
- Pening

- Degupan jantung pantas atau tidak sekata
- *Hot flushes*
- Tekanan darah tinggi
- Loya/ muntah-muntah
- Sakit gastrik/ sakit perut
- Sembelit/ cirit-birit
- Berpeluh berlebihan
- Rambut gugur
- Ruam
- Kulit kering
- Sakit sendi/ sakit otot
- Sakit tulang
- *Osteoporosis* (tulang yang lemah dan mudah retak)/ retakkan tulang
- Arthritis
- Pendarahan dari faraj
- Keletihan
- Sakit dada
- Bengkak pada kaki atau lengan
- Pertambahan berat badan

Sekiranya anda mengalami kesan sampingan ini atau kesan sampingan yang tidak disenaraikan, sila maklumkan kepada doktor anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan

-Penyimpanan

Jangan simpan pada suhu melebihi 30°C. Simpan dalam kotak asal ubat ini dan dilindungi cahaya matahari.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

LETRODAY 2.5 (Letrozole Tablets 2.5mg)

Letrozole 2.5mg

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet bersalut bewarna kuning gelap, bulat, dwicembung dengan tepi yang serong. Tanda L25 pada satu belah dan belah lain kosong.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Letrozole

- Bahan tidak aktif

*Lactose monohydrate,
Microcrystalline cellulose,
Sodium starch glycolate
(type A), Purified water,
Maize starch, Colloidal
anhydrous silica,
Magnesium stearate and
Opadry yellow 03F520312*

-Nombor MAL

MALXXXXXXXXAZ

Pengilang

Eugia Pharma Specialities Limited (Unit-1)
Sy. No. 550, 551 & 552, Kolthur Village
Shamirpet Mandal,
Medchal-Malkajgiri District,
Shamirpet, Telangana, 500101, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Synerv Sdn. Bhd.,
SO-29-2, Menara 1, KL Eco City,
Jalan Bangsar, Kg Haji Abdullah
Hukum, 59200 Kuala Lumpur,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

-09/04/2026

Nombor Siri

NPRA (R2) 21/042