

GLIT 15 (PIOGLITAZONE TABLETS 15MG)

GLIT 30 (PIOGLITAZONE TABLETS 30MG)

Pioglitazone hydrochloride (15mg, 30mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *GLIT*
2. Bagaimana *GLIT* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *GLIT*
4. Cara menggunakan *GLIT*
5. Semasa menggunakan *GLIT*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *GLIT*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan *GLIT*

- *GLIT* digunakan sebagai rawatan tunggal untuk penyakit kencing manis jenis 2, terutamanya pesakit yang mempunyai berat badan berlebihan yang tidak dapat dikawal dengan senaman, diet dan dimana *metformin* tidak sesuai diberi.
- *GLIT* digunakan sebagai rawatan kombinasi untuk penyakit kencing manis jenis 2 dimana kencing manis tidak dikawal dengan baik walaupun dos maxima *metformin* atau *sulfonylurea* telah diberi.

Bagaimana *GLIT* berfungsi

GLIT adalah agen antidiabetik *thiazolidinedione* yang bergantung pada *insulin* untuk berfungsi. Ia bertindak mengurangkan rintangan *insulin* pada badan, menyebabkan badan menyimpan glukosa dan pengurangan pengeluaran glukosa oleh hati.

Sebelum menggunakan *GLIT*

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan *GLIT* jika anda:

- a) Alah kepada *pioglitazone* atau kepada apa-apa bahan tidak aktif yang tersenarai pada hujung risalah ini.
- b) Mengalami kegagalan jantung atau sejarah kegagalan jantung (semua peringkat).

- c) Mengalami fungsi hati yang tidak baik.
- d) Mengandung atau sedang menyusu bayi.
- e) Pesakit kencing manis jenis 1.
- f) Seorang pesakit barah pundi kencing atau mempunyai sejarah barah pundi kencing.
- g) Mempunyai darah dalam air kencing anda.

- Sebelum mula menggunakan *GLIT*

Anda mesti menjalani ujian darah untuk fungsi hati sebelum memulakan terapi, dan selepas itu ujian secara berkala bagi setiap keputusan klinikal daripada profesional penjagaan kesihatan.

Berbincang dengan doktor jika anda hamil.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

GLIT boleh diberikan secara bersama dengan:

- a) *Kontraseptif oral*
- b) *Fexofenadine HCl*
- c) *Glipizide*
- d) *Digoxin*
- e) *Warfarin*
- f) *Metformin*
- g) *Midazolam*
- h) *Ranitidine HCl*
- i) *Nifedipine ER*
- j) *Ketoconazole*
- k) *Atorvastatin Calcium*
- l) *Theophylline*
- m) *Cytochrome P450*

Beritahu doktor yang anda sedang mengambil mana-mana ubat yang berikut:

- a) Ubat yang mengandungi *insulin*
- b) Ubat yang mengandungi agen hipoglisemik *oral*

Ini kerana gabungan terapi dengan salah satu ubat di atas boleh menyebabkan risiko hipoglisemia.

Cara menggunakan *GLIT*

- Berapa banyak harus digunakan

Anda boleh mula dengan 15mg atau 30mg sekali sehari. Dos boleh ditambah dengan pertambahan

sehingga 45mg sekali sehari.

Kegunaan pada orang tua, penyesuaian dos tidak diperlukan pada orang tua.

Kegunaan pada kanak-kanak, *GLIT* tidak disyorkan pada pesakit di bawah umur 18 tahun.

Kegunaan pada fungsi renal yang terganggu, penyesuaian dos tidak diperlukan.

Kegunaan semasa hamil, tiada kajian yang cukup dan terkawal pada wanita hamil. Bincang dengan doktor anda sebelum mengambil *GLIT*.

- Bila perlu digunakan

GLIT perlu diambil secara *oral*, sekali sehari dengan atau tanpa makanan.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sekiranya lupa mengambil ubat ini.

Ambil dos yang terlupa dengan segera. Sekiranya hampir masa untuk dos seterusnya, ambil dos seterusnya dan abaikan dos yang terlupa. Jangan gantikan dos untuk menggantikan dos yang terlupa.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda jika rasa anda atau seseorang terlebih makan ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan dengan segera.

GLIT 15 (PIOGLITAZONE TABLETS 15MG) GLIT 30 (PIOGLITAZONE TABLETS 30MG)

Pioglitazone hydrochloride (15mg, 30mg)

Semasa menggunakan GLIT

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor. Jalani ujian glukosa darah dan hemoglobin terlikosil secara tetap. Dalam tempoh stres seperti demam, *trauma*, jangkitan atau pembedahan, keperluan ubat mungkin berubah dan pesakit hendaklah diingatkan supaya mendapatkan nasihat perubatan dengan segera.
- Jika anda mengalami pertambahan berat badan yang mendadak dan luar biasa atau edema atau mengalami sesak nafas atau gejala lain bagi kegagalan jantung semasa mengambil *GLIT*, anda perlu melaporkan gejala ini dengan segera kepada doktor.
- Anda perlu mendapatkan nasihat perubatan dengan segera jika berlaku loya, muntah, sakit abdomen, lesu, anoreksia atau air kencing yang gelap warnanya yang tidak dapat dijelaskan.
- Pesakit boleh mengalami risiko yang lebih tinggi untuk hamil semasa mengambil *GLIT*.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi *GLIT* kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

GLIT boleh menyebabkan retensi bendalir. Retensi bendalir boleh mengakibatkan atau memburukkan lagi kegagalan jantung. Anda perlu berbincang dengan doktor jika berlaku

apa-apa kemerosotan dalam fungsi jantung.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat boleh memberikan kesan sampingan. Anda mungkin perlu mendapatkan rawatan perubatan jika anda mengalami beberapa kesan sampingan.

Kesan sampingan disenaraikan seperti di bawah:

- Jangkitan salur pernafasan atas
- Sakit kepala
- Sinusitis* (Radang pada sinus hidung)
- Mialgia (kesakitan pada otot)
- Gangguan gigi
- Diabetes melitus yang semakin teruk
- Faringitis (radang pada bahagian salur makanan yg terletak di antara mulut dan esofagus.)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers > Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan *GLIT*

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak. Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya dan kelembapan

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

GLIT 15 (Pioglitazone Tablets 15mg)
- Tablet bulat dwicembung berwarna putih dengan tiada salutan filem dang ukiran “15” pada satu permukaan dan

kosong pada permukaan lain.

GLIT 30 (Pioglitazone Tablets 30mg) - Tablet bulat rata berserong berwarna putih dengan tiada salutan filem dang ukiran “30” pada satu permukaan dan kosong pada permukaan lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Pioglitazone hydrochloride

- Bahan tidak aktif

Lactose Monohydrate, Carmellose Calcium, Hydroxypropyl Cellulose-L & Magnesium Stearate

- Nombor MAL:

GLIT 15 - MAL21126010AZ

GLIT 30 - MAL21126011AZ

Pengilang

Ind-Swift Laboratories Limited, Off-NH-21, Village Jawaharpur, Tehsil Derabassi, Distt. S.A.S Nagar, (Mohali) Punjab (India) Pin -140507

Pemegang Pendaftaran Produk

Synerv Sdn Bhd, SO-29-2, Menara 1, KL Eco City, Jalan Bangsar, Kg. Haji Abdullah, Hukum, 59200 Kuala Lumpur Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

29/09/2025

Nombor Siri

NPRA (R2) 21/031