

SYNERRV FEXOFENADINE 120MG (FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 120MG TABLETS USP)

SYNERRV FEXOFENADINE 180MG (FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 180MG TABLETS USP)

Fexofenadine hydrochloride (120mg & 180mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan SYNERRV FEXOFENADINE
2. Bagaimana SYNERRV FEXOFENADINE berfungsi
3. Sebelum mengambil SYNERRV FEXOFENADINE
4. Cara menggunakan SYNERRV FEXOFENADINE
5. Semasa menggunakan SYNERRV FEXOFENADINE
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan SYNERRV FEXOFENADINE Maklumat lanjut
8. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
9. Tarikh kemaskini RiMUP
10. Nombor siri

Apakah kegunaan SYNERRV FEXOFENADINE

SYNERRV FEXOFENADINE (120mg & 180mg) digunakan oleh orang dewasa dan remaja berumur 12 tahun dan ke atas untuk melegakan gejala-gejala yang berlaku bersama-sama dengan demam alergi (rinitis alergi bermusim) seperti bersin, mata berasa gatal-gatal, berair atau merah dan hidung gatal atau berair.

Tambahan pula SYNERRV FEXOFENADINE (180mg sahaja) juga digunakan untuk melegakan gejala-gejala gatal-gatal kronik (urtikaria idiopatik kronik ruam merah dan gatal yang timbul tanpa sebab yang diketahui).

Bagaimana SYNERRV FEXOFENADINE berfungsi

SYNERRV FEXOFENADINE mengandungi *Fexofenadine hydrochloride* yang dikenali sebagai antihistamina. Ia berfungsi dengan menyekat Tindakan histamina untuk mengurangkan gejala gejala alergi.

Sebelum mengambil SYNERRV FEXOFENADINE

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil SYNERRV FEXOFENADINE jika anda alah (hipersensitif) terhadap *Fexofenadine* atau mana-mana bahan bahan lain ubat ini yang disenarai diakhir risalah ini.

-Sebelum mula mengambil

Semak dengan doktor anda sebelum mengambil SYNERRV FEXOFENADINE jika:

- Anda mempunyai masalah berkaitan dengan hati atau buah pinggang anda.
- Anda seorang warga tua.

Jika anda tidak pasti sama ada mana-mana di atas berkenaan dengan anda, sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil SYNERRV FEXOFENADINE.

Mengandung atau menyusukan bayi:

Bincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda:

- Sedang mengandung atau anda merancang untuk mengandung.
- Sedang menyusukan bayi atau mungkin mula menyusukan bayi.

Fexofenadine hydrochloride hanya digunakan semasa mengandung atau menyusukan bayi jika faedah mewajarkan potensi risiko kepada janin atau bayi yang menyusu.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil, baru baru ini telah mengambil atau mungkin mengambil apa-apa ubat-ubatan lain.

- Ubat untuk ketidakhadaman (antasid) mengandungi *aluminium* dan *magnesium* yang boleh menjejaskan tindakan SYNERRV FEXOFENADINE dalam badan dengan menurunkan jumlah ubat yang diserap ke dalam badan. Ia disyorkan untuk mengelakkan mengambil ubat untuk ketidakhadaman dalam 15 minit sebelum atau selepas mengambil SYNERRV FEXOFENADINE.
- *Erythromycin* (antibiotik digunakan untuk merawat jangkitan bakteria) atau *Ketoconazole* (digunakan untuk merawat jangkitan fungus)

Jangan ambil SYNERRV FEXOFENADINE dengan jus buah buahan seperti limau gedang, oren dan epal. Ia disyorkan untuk mengambil SYNERRV FEXOFENADINE dengan air untuk memaksimumkan kesan *Fexofenadine* dalam badan.

Cara menggunakan SYNERRV FEXOFENADINE

SYNERRV FEXOFENADINE 120MG (FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 120MG TABLETS USP)

SYNERRV FEXOFENADINE 180MG (FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 180MG TABLETS USP)

Fexofenadine hydrochloride (120mg & 180mg)

Sentiasa mengambil SYNERRV FEXOFENADINE tepat seperti yang doktor anda telah memberitahu anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

Telan tablet anda secara oral dengan segelas air.

-Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke atas: dos yang disyorkan adalah satu tablet setiap hari.

SYNERRV FEXOFENADINE tidak digalakkan digunakan untuk kanak-kanak dibawah 12 tahun.

Kemerosotan buah pinggang:

Dos yang disarankan pada dewasa dengan masalah fungsi buah pinggang adalah 60mg setiap hari.

-Bila perlu digunakan

Ambil SYNERRV FEXOFENADINE pada waktu yang sama setiap hari kecuali doktor anda memberitahu anda sebaliknya.

-Berapa lama perlu digunakan

Ambil SYNERRV FEXOFENADINE sehingga doktor memberitahu anda untuk berhenti. Jangan berhenti mengambil SYNERRV FEXOFENADINE hanya kerana anda berasa lebih baik. Jika anda berhenti, gejala anda boleh kembali lagi.

-Jika terlupa menggunakan

- Jika anda terlupa untuk mengambil tablet anda, abaikan dos dan ambil tablet

seterusnya pada masa yang biasa.

- Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa.
- Jika anda mempunyai sebarang soalan lanjut mengenai penggunaan produk ini, minta nasihat dari doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil lebih daripada dos yang diperlukan, beritahu doktor atau pergi ke jabatan hospital kecemasan dengan segera. Sila ambil pek ubat dengan anda.

Lakukan ini walaupun tidak ada tandatanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera. Kesan-kesan berikut boleh berlaku: pening, mengantuk dan mulut kering.

Semasa menggunakan SYNERRV FEXOFENADINE

-Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan SYNERRV FEXOFENADINE.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan memberikan ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.
- Jangan gunakan ubat ini untuk merawat sebarang aduan lain melainkan jika doktor anda memberitahu anda.
- Jangan berhenti mengambil SYNERRV FEXOFENADINE atau menukar dos tanpa memeriksa dengan doktor anda.
- Jangan menelan SYNERRV FEXOFENADINE bersama-sama jus buah-buahan.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin:

SYNERRV FEXOFENADINE tidak mungkin menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Walau bagaimanapun, anda perlu memastikan bahawa tablet ini tidak menyebabkan anda berasa mengantuk atau pening sebelum memandu atau mengendalikan jentera.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat-ubatan mempunyai beberapa kesan sampingan yang tidak diingini tetapi bukan semua orang akan mengalaminya.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda notis mana-mana kesan sampingan yang berikut:

- Sakit haid.
- Sakit kepala.

SYNERRV FEXOFENADINE 120MG (FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 120MG TABLETS USP)

SYNERRV FEXOFENADINE 180MG (FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 180MG TABLETS USP)

Fexofenadine hydrochloride (120mg & 180mg)

- Sakit belakang.
- Batuk.
- Jangkitan pada saluran pernafasan dibahagian atas.
- Demam.
- Radang telinga tengah.
- Muntah.
- Cirit-birit.
- Letih.
- Hidung berair.
- Pening.
- Ketidakselesaian dibahagian perut.
- Sakit di kaki dan tangan.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan diatas boleh berlaku pada sesetengah orang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nprra.moh.gov.my [Public→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan

-Penyimpanan

Simpan ubat ini di tempat yang selamat dimana kanak-kanak tidak dapat melihat atau capai.

Jangan menggunakan SYNERRV FEXOFENADINE selepas tarikh tamat tempoh yang dinyatakan pada label dan karton. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

Simpan dibawah suhu 30°C dalam kotak asal.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dilupuskan melalui air sisa atau bahan buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

SYNERRV FEXOFENADINE 120MG: tablet bersalut, dwicembung, berbentuk bujur dan berwarna pic, kosong pada dua-dua belah. Tablet berukuran 15.5 mm memanjang dan 7 mm lebar.

SYNERRV FEXOFENADINE 180MG: tablet bersalut, dwicembung, berbentuk bujur dan berwarna pic, kosong pada dua-dua belah. Tablet berukuran 18 mm memanjang dan 8 mm lebar.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Setiap tablet mengandungi 180mg/120mg
Fexofenadine hydrochloride.
- Bahan tidak aktif
Lactose, Croscarmellose sodium, Maize starch, Colloidal anhydrous silica, Povidone, Magnesium stearate & Opadry pink (03B54819).

-Nombor MAL

SYNERRV FEXOFENADINE 120MG: MAL22086027AZ

SYNERRV FEXOFENADINE 180MG: MAL22086028AZ

Pengilang

Ind-Swift Laboratories Limited, Off-NH-21, Village Jawaharpur, Tehsil Derabassi, Distt. S.A.S Nagar, (Mohali) Punjab (India) Pin -140507

Pemegang Pendaftaran Produk

Synerrv Sdn Bhd,
SO-29-2, Menara 1, KL Eco City,
Jalan Bangsar, Kg Haji Abdullah
Hukum, 59200 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

29/09/2025

Nombor Siri

NPRA(R2) 21/144