

Fasdol Suspension 250mg/5ml (Strawberry)**Fasdol Suspension 250mg/5ml (Orange)**

Paracetamol 250 mg/5ml

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Fasdol suspension
2. Bagaimana Fasdol suspension berfungsi
3. Sebelum mengambil Fasdol suspension
4. Cara mengambil Fasdol suspension
5. Semasa mengambil Fasdol suspension
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan Maklumat Lanjut
8. Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk
9. Tarikh kemaskini RiMUP

1. Apakah kegunaan Fasdol suspension

Fasdol suspension sesuai untuk melegakan demam, sakit kepala, dan gejala kurang sihat dari selesama, sakit gigi, serta ketidakselesaan selepas prosedur pergigian dan demam selepas vaksinasi.

2. Bagaimana Fasdol suspension Berfungsi

Fasdol mengandungi paracetamol, di mana adalah analgesik dan antipiretik yang bertindak secara sentral dengan ciri-ciri anti-radang yang minimum.

3. Sebelum mengambil Fasdol suspension**-Bila tidak boleh Mengambil**

- Jika anda mempunyai alahan terhadap paracetamol atau bahan-bahan yang terkandung dalam produk ini.
- Jika anda sedang mengambil ubat yang lain juga mengandungi paracetamol

-Sebelum mula mengambil

Semak dengan doktor anda

- Jika anda menghadapi sebarang penyakit ginjal atau hati, termasuk penyakit hati alkohol.
- Jika anda menghadapi artritis yang sederhana dan perlu mengambil ubat tahan sakit setiap hari
- Jika anda mempunyai buah pinggang atau hati yang lemah.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila memberitahu doktor atau ahli farmasi jika anda ada mengambil ubat-ubatan lain seperti

- Anti-pembeku (seperti warfarin) dan anda perlu mengaambil ubat tahan sakit setiap hari
- Ubat-ubatan lain yang anda sedang guna, seperti ubat dibeli tanpa preskripsi

-Kehamilan dan penyusuan

Kegunaan dalam Kehamilan:

- Dianggap pilihan analgesik terhadap pesakit yang hamil.

- Walaupun ia akan melalui plasenta, paracetamol dianggap selamat dalam normal dos terapeutik untuk tempoh yang pendek sebagai minor analgesic/antipiretik dalam kehamilan.

-Kegunaan dalam penyusuan:

- mengeluarkan dalam susu ibu
- pemakanan ibu paracetamol dalam dos terapeutik normal tidak muncul untuk membentangkan risiko kepada bayi kejururawatan

-Memandu kereta dan mengendali mesin

Paracetamol mempunyai potensi yang jkecil untuk menjejaskan keupayaan seseorang pesakit mengendali mesin atau memandu.

4. Cara mengambil Fasdol suspension**-Berapa banyak harus digunakan**

Kanak-kanak

1-3 tahun: 3 -5ml

4-6 tahun: 5-7 ml

7-9 tahun: 7-10 ml

10-12 tahun: 10-15 ml

Goncang sebelum mengambil.

Jangan ambil melebihi 4 kali sehari.

-Bila perlu ambil

Fasdol suspension perlu diambil selepas makan.

-Berapa lama perlu diambilkan

Tempoh rawatan ditentukan oleh doktor anda

-Jika terlupa mengambil

Ikut dos yang patut diambil mengikut waktu yang seterusnya, jangan mengambil dos berganda untuk mengganti dos yang terlupa ambil.

-Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera

5. Semasa mengambil Fasdol suspension**-Perkara yang perlu dilakukan**

Simpan RiMUP. Anda mungkin perlu membaca semula. Jika anda ada sebarang pertanyaan, sila tanya doktor atau ahli farmasi.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan bagi orang lain. Ia mungkin tidak sesuai untuk orang lain walaupun mereka mempunyai tanda-tanda yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan mengambil melebihi dos yang disyorkan. Jika tanda-tanda kekal, sila jumpa doktor anda.

6. Kesan-kesan Sampingan

Kesan buruk paracetamol jarang dan biasanya ringan, walaupun reaksi hematologi telah dilaporkan. Reaksi hipersensitiviti kulit termasuk ruam kulit, angioedema, Steven Johnson Syndrome / Toksik Epidermal Necrolysis telah dilaporkan.

Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda untuk maklumat lanjut. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No.Tel: 03-78835490, atau laman web npra.gov.my (Consumer → Reporting Side Effects to Medicines [ConSERF] or Vaccines [AEFI])

7. Cara Penyimpanan and Pelupusan**-Penyimpanan**

Simpan bawah 30°C dalam tempat yang kering dan elak keadaan yang panas, lembap dan bercahaya.

Jauhi daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Sila bertanya kepada ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi persekitaran.

7. Maklumat Lanjut**-Rupa and warna produk**

Fasdol Suspension Strawberry: Larutan yang berwarna merah dengan perisa strawberi.

Fasdol suspension Orange: Larutan yang berwarna orange dengan perisa orange.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif: Paracetamol

Bahan tidak aktif:

Fasdol Suspension strawberry: Methyl paraben, natrium saccharin, gula, sorbitol, xanthan gum, perisa strawberi, perwarna merah jambu dan air.

Fasdol suspension orange: Methyl paraben, natrium saccharin, gula, sorbitol, xanthan gum, perisa pisang dan oren, perwarna oren dan air.

-Nombor Pendaftaran

Fasdol Suspension 250mg/5ml (Strawberry)
MAL XCZ

Fasdol Suspension 250mg/5ml (Orange)
MAL XCZ

Fasdol Suspension 250mg/5ml (Strawberry)

Fasdol Suspension 250mg/5ml (Orange)

Pacetamol 250 mg/5ml

9 Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk

-Product registration holder:

Advance Pharma Sdn Bhd (539885-W)
28, Jalan BP6/6, Bandar Bukit Puchong,
47120 Puchong, Selangor.

-Manufacturer:

AV Manufacturing Sdn. Bhd. (667760-v)
Lot 10621, Jalan Permata 2,
Arab Malaysian Industrial Park
71800 Nilai, Negeri Sembilan.

10. Tarikh kemaskini RiMUP

Jan 2020

Siri Nombor

NPRA(R2) 19/226