# NUVASTATIC EFFERVESCING POWDER

Ekstrak piawai daun *Orthosiphon stamineus* (1000mg) dengan anggaran 6% asid rosmarinik

**Apakah yang ada pada risalah ini**


1. Apakah kegunaan NUVASTATIC
2. Bagaimana NUVASTATIC berfungsi
3. Sebelum menggunakan NUVASTATIC
4. Cara menggunakan NUVASTATIC
5. Semasa menggunakan NUVASTATIC
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan NUVASTATIC
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP


**Apakah kegunaan NUVASTATIC**

Digunakan secara tradisional untuk kesihatan umum.

**Bagaimana NUVASTATIC berfungsi**

NUVASTATIC mengandungi ekstrak piawai daun *Orthosiphon stamineus* sebanyak 1000 mg setiap sachet sebagai bahan aktif.

*Orthosiphon stamineus* ialah bahan herba tradisional yang digunakan secara tradisional untuk menyokong kesihatan umum. Mekanisme tindakannya yang tepat belum ditentukan.

**Sebelum menggunakan NUVASTATIC**

- *Bila tidak boleh menggunakan*

Jangan ambil produk ini jika anda alah kepada ekstrak piawai daun *Orthosiphon stamineus* atau mana-mana bahan lain dalam produk ini (disenaraikan dalam bahagian Maklumat Lanjut).

- *Sebelum menggunakannya*

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil NUVASTATIC jika anda:

- Mengalami masalah fungsi buah pinggang.
- Mengalami masalah fungsi hati.

Ini merupakan sediaan tradisional.

Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil produk ini.

*Mengandung dan menyusukan anak*

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Tiada maklumat tersedia mengenai interaksi dengan ubat-ubatan lain. Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil, baru-baru ini telah mengambil atau mungkin mengambil sebarang ubat-ubatan lain.

**Cara menggunakan NUVASTATIC**

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- *Berapa banyak harus digunakan*

Dewasa: Ambil 1-2 sachet sekali sehari.

- *Bila perlu digunakan*

Ambil NUVASTATIC sekali sehari selepas makan, sebaik-baiknya pada waktu yang sama setiap hari, atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Larutkan satu sachet dalam 350 mL air suam atau sejuk. Kacau sehingga larut sepenuhnya sebelum diminum.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Ambil NUVASTATIC selagi disyorkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Sekiranya gejala anda berterusan atau bertambah teruk, sila dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi.

- *Jika terlupa menggunakan*

Jika anda terlupa mengambil satu dos, ambil dos tersebut sebaik sahaja anda mengingatinya. Jika sudah hampir tiba masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan ambil dos seterusnya pada waktu yang biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- *Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)*

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

**Semasa menggunakan NUVASTATIC**

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Gunakan ubat anda tepat seperti yang diarahkan oleh doktor.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan NUVASTATIC.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan berhenti menggunakan ubat ini melainkan atas nasihat doktor anda.

Jangan gunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan NUVASTATIC kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*

Jangan memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda mengetahui kesan produk ini terhadap diri anda.

**Kesan-kesan sampingan**

Seperti semua ubat, NUVASTATIC boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan produk ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*]

**Cara penyimpanan dan pelupusan NUVASTATIC**

- *Penyimpanan*

Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

Simpan pada suhu di bawah 30˚C. Elakkan daripada cahaya dan kelembapan.

Jangan gunakan produk ini selepas tarikh luput atau sekiranya paket bocor.

- *Pelupusan*

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

**Maklumat lanjut**

- *Rupa dan warna produk*

Produk ini merupakan serbuk berbutir berwarna coklat muda, dengan rasa limau serta bau herba.

- *Bahan-bahan kandungan*

- Bahan aktif
  - Ekstrak piawai daun *Orthosiphon stamineus* (1000 mg setiap sachet).

- Bahan tidak aktif
  - Asid sitrik anhidrat BP.
  - Natrium bikarbonat.
  - Magnesium aluminometasilikat.
  - Sukralosa.
  - Perisa sitrus.
  - Beta siklodekstrin.

- *Nombor MAL*

MAL19126079T

**Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk**

NATURECEUTICALS SDN. BHD.
A1-1, A1-2 & A1-3, Lot 5,
Persiaran 2/1, Kedah Halal Park,
Kawasan Perindustrian Sungai Petani,
08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia.

**Tarikh kemas kini RiMUP**
18/08/2026

**Nombor Siri**
NPRA(R4/1)220726/00036