

POLYLAB ACRIFLAVINE LOTION 0.4%

Acriflavine (0.4% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Acriflavine Lotion
2. Bagaimana Acriflavine Lotion berfungsi
3. Sebelum menggunakan Acriflavine Lotion
4. Cara menggunakan Acriflavine Lotion
5. Semasa menggunakan Acriflavine Lotion
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Acriflavine Lotion
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini

Apakah kegunaan Acriflavine Lotion

Untuk luka kecil, luka terbakar dan jangkitan kulit.

Bagaimana Acriflavine Lotion berfungsi

Acriflavine Lotion bertindak sebagai antiseptik dalam perawatan jangkitan kulit dan luka.

Sebelum menggunakan Acriflavine Lotion

Bila tidak boleh menggunakan

Jika anda mempunyai alahan terhadap Acriflavine atau bahan-bahan lain dalam Acriflavine Lotion atau anda sensitif terhadap cahaya (fotosensitiviti- radang kulit disebabkan terkena cahaya).

Sebelum mula menggunakan

Sila minta khidmat nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Acriflavine Lotion.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil ubat-ubatan lain.

Cara menggunakan Acriflavine Lotion

Berapa banyak harus digunakan

Bersihkan kawasan yang terjejas. Sapukan losyen satu hingga tiga kali sehari. Biarkan kering dan balut dengan kain pembalut steril jika perlu.

Bila perlu digunakan

Ikut arahan yang dinyatakan di label dan seperti yang dinasihati oleh doktor atau ahli farmasi.

Berapa lama perlu digunakan

Sila rujuk doktor atau ahli farmasi anda.

Jika terlupa menggunakan

Sapukan sebaik ingat, jika masa sapuan sudah hampir dengan dos sapuan seterusnya, gunakan seperti biasa. Jangan gunakan dos berlebihan untuk menggantikan dos yang terlepas.

Jika mengambil berlebihan

Rujuk doktor anda untuk tindakan selanjutnya.

Semasa menggunakan Acriflavine Lotion

Perkara yang perlu dilakukan

Rujuk doktor atau ahli farmasi jika kulit/luka tidak sembuh. Doktor dan ahli farmasi akan menilai keperluan sama ada perlu meneruskan sapuan Acriflavine Lotion atau tidak.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan Acriflavine Lotion untuk merawat penyakit selain dari yang dinyatakan kecuali dengan nasihat doktor.

Perkara yang perlu diberi perhatian

- Untuk kegunaan luar sahaja. Penggunaan jangka panjang adalah tidak disyorkan, kerana boleh melambatkan proses penyembuhan.
- Jika terkena mata, basuh dengan air dan rujuk doktor segera.

Kesan-kesan sampingan

- Fotosensitiviti.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Acriflavine Lotion

Penyimpanan

- Simpan di tempat yang kering dan suhu di bawah 30°C
- Lindungi dari cahaya
- Pastikan bekas ditutup rapat

Pelupusan

Acriflavine Lotion tidak boleh dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk ahli farmasi anda untuk mengetahui cara pelupusan ubat yang betul. Langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Cecair berwarna kuning jernih ke coklat muda.

Bahan kandungan aktif

- Acriflavine

Bahan kandungan tidak aktif

- Purified water

Nombor MAL

MAL 07081670XCSZ

Sanchuan Medical Sdn. Bhd.

No.72, Lengkok Rishah 2,
Taman Rishah,
Kawasan Perindustrian Silibin,
30100 Ipoh, Perak.

Pemegang Pendaftaran Produk

Polylab Biotech Sdn. Bhd.
6A, Jalan Kaskas 3,
Taman Cheras,
56100 Kuala Lumpur,
W. P. Kuala Lumpur.

Tarikh kemaskini

25/08/2021

Nombor Siri

NPRA(R2/1)210719/717