

MOVELOX

(Moxifloxacin 0.5 % w/v Ophthalmic Solution USP)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan MOVELOX
2. Bagaimana MOVELOX berfungsi
3. Sebelum menggunakan MOVELOX
4. Cara menggunakan MOVELOX
5. Semasa menggunakan MOVELOX
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan MOVELOX
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan MOVELOX

Titik mata MOVELOX digunakan untuk rawatan jangkitan mata (konjunktivitis) apabila disebabkan oleh bakteria.

Bahan aktif ialah moxifloxacin yang anti-infeksi mata.

Bagaimana MOVELOX berfungsi

Moxifloxacin, generasi keempat fluoroquinolone, menghalang DNA gyrase dan topoisomerase IV diperlukan untuk replikasi DNA bakteria, pembaikan, dan penggabungan semula.

Sebelum menggunakan MOVELOX

Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda alergi (hipersensitif) kepada moxifloxacin, kepada quinolones lain, atau mana-mana ramuan lain ubat ini.

AMARAN DAN LANGKAH BERJAGA-JAGA

- **Sekiranya anda mengalami reaksi alergi kepada MOVELOX:** Reaksi alahan jarang berlaku dan reaksi serius jarang terjadi. Sekiranya anda mengalami reaksi alergi (hipersensitiviti) atau kesan sampingan, beritahu doktor anda.
- **Jika anda memakai kanta lekap** – berhenti memakai kanta lekap anda jika anda mempunyai sebarang tanda-tanda atau gejala-gejala jangkitan mata. Sebaliknya pakai cermin mata anda. Jangan mula memakai kanta lekap anda lagi sehingga tanda dan gejala jangkitan telah tiada dan sehingga anda berhenti menggunakan ubat tersebut.
- Tendon bengkok dan pecah telah berlaku pada orang yang mengambil fluoroquinolones oral atau intravena, terutamanya pada pesakit

yang lebih tua dan kepada mereka yang sedang dirawat dengan kortikosteroid. Berhenti mengambil MOVELOX jika anda mengalami kesakitan atau pembengkakan tendon (tendinitis).

Seperti mana-mana antibiotik, penggunaan MOVELOX untuk masa yang lama boleh menyebabkan jangkitan lain.

Ubat lain dan MOVELOX Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda

jika anda mengambil atau baru mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat-ubatan yang diperoleh tanpa preskripsi.

Mengandung dan menyusukan anak

Tanya doktor anda sebelum menggunakan ubat titik mata MOVELOX.

Jangan ambil MOVELOX jika anda menyusukan anak. Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil apa-apa ubat.

Memandu dan menggunakan jentera

Anda mungkin mendapati penglihatan anda kabur untuk masa yang singkat selepas anda menggunakan MOVELOX. Jangan memandu atau gunakan mesin sehingga tanda ini sudah hilang.

Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan MOVELOX

Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa gunakan ubat ini seperti yang doktor anda beritahu anda. Semak dengan doktor anda atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Dos biasa adalah...
Dewasa, termasuk orang tua,


dan kanak-kanak :

1 titis pada mata atau mata yang terlibat, **3 kali** sehari (pada waktu pagi, tengah hari dan malam).

- Ambil botol MOVELOX dan berdiri dihadapan cermin
- Basuh tangan anda
- Buka penutup
- Apabila penutup dibuka, jika 'tamper evident snap collar' longgar, tanggalkan sebelum menggunakan produk.
- Pegang botol, menghala ke bawah, antara ibu jari dan jari
- Dongakkan kepala. Tarik kelopak mata dengan jari yang bersih, sehingga ada 'pocket' antara kelopak mata dan mata anda. Ubat akan masuk ke dalam dari sini (gambar 1)



- Bawa hujung botol rapat ke mata. Gunakan cermin jika ia dapat membantu.
- Jangan sentuh mata atau kelopak mata, kawasan sekeliling atau permukaan lain dengan penitis. Ia boleh menjangkiti titisan
- Tekan bawah botol perlahan-lahan untuk mengeluarkan satu titis ubat dalam satu-satu masa (gambar 2)



Selepas menggunakan MOVELOX, tekan jari anda ke sudut mata bersebelahan hidung untuk 2-3 minit (gambar 3).



Ini membantu untuk menghalang ubat dari masuk ke seluruh tubuh dan sangat penting untuk kanak-kanak

- Jika anda menggunakan titis di kedua-dua mata, cuci tangan sebelum anda mengulangi langkah-langkah untuk

MOVELOX

(Moxifloxacin 0.5 % w/v Ophthalmic Solution USP)

mata yang lain. Ini akan membantu mencegah jangkitan dari satu mata ke yang lain

- Tutup penutup botol dengan segera selepas digunakan

Bila perlu digunakan

MOVELOX boleh digunakan pada kanak-kanak, pada pesakit lebih 65 tahun dan pesakit dengan masalah buah pinggang atau hati. Hanya terdapat maklumat yang sangat terhad mengenai penggunaan ubat ini pada bayi baru lahir dan penggunaannya tidak disyorkan pada bayi baru lahir. Hanya gunakan ubat di kedua-dua mata jika doktor memberitahu anda. Hanya gunakan MOVELOX untuk mata anda. Jangkitan ini biasanya bertambah baik 5 hari. Jika tiada peningkatan, hubungi doktor anda. Anda harus terus menggunakan titisan untuk 2-3 hari atau selagi doktor memberitahu anda.

Jika terlupa menggunakan

Teruskan dengan dos seterusnya seperti yang dirancang. Jangan gunakan dos berganda untuk membuat dos terlupa.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Bilas semuanya dengan air suam. Jangan letakkan sebarang titisan sehingga masa untuk dos biasa anda akan datang.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil berlebihan ubat ini. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan MOVELOX

Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda menikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Ubat titis MOVELOX.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini..

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil atau baru-baru ini mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat

ini kecuali jika dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor anda.

Jangan memberi titisan mata MOVELOX kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai gejala atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Anda mungkin mendapati penglihatan anda kabur untuk masa yang singkat selepas anda menggunakan MOVELOX. Jangan memandu atau gunakan mesin sehingga tanda ini sudah hilang

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain MOVELOX boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun tidak semua mendapatnya.

Anda biasanya boleh meneruskan pengambilan ubat titis, melainkan kesannya serius atau jika anda mengalami reaksi alergi yang teruk. Sekiranya anda mengalami reaksi alahan yang teruk dan mana-mana yang berikut berlaku, hentikan mengambil MOVELOX serta-merta dan beritahu doktor anda dengan segera: bengkak tangan, kaki, pergelangan kaki, muka, bibir, mulut atau tekak yang boleh menyebabkan kesukaran menelan atau bernafas, ruam atau gatal-gatal, lecur yang penuh dengan cecair, luka dan ulser

Kesan sampingan biasa

(Boleh menjejaskan 1 dalam 10 orang)

Kesan pada mata : sakit mata, kerengsaan mata

Kesan sampingan tidak biasa

(Boleh menjejaskan 1 dalam 100 orang)

Kesan pada mata: mata kering, mata gatal, kemerahan mata, keradangan permukaan mata atau parut, saluran darah mata pecah, sensasi mata yang tidak normal, kelainan mata kelopak mata, gatal-gatal, kemerahan atau bengkak

Kesan sampingan umum : sakit kepala dan rasa tidak enak

Kesan sampingan jarang:

(Boleh menjejaskan 1 dalam 1000 orang)

Kesan di mata: gangguan kornea, penglihatan kabur atau pengurangan, keradangan atau jangkitan konjunktiva, ketegangan mata, pembengkakan mata

Kesan sampingan umum : muntah, ketidakselesaan hidung, rasa benjolan di tekak, penurunan darah dalam darah, ujian darah hati yang tidak normal, sensasi kulit yang tidak normal, sakit, kerengsaan tekak

Tidak diketahui (Kekerapan tidak boleh dianggarkan dari data yang ada)

Kesan dalam mata: jangkitan di mata, permukaan mata menjadi keruh, kebengkakan kornea, deposit pada permukaan mata, peningkatan tekanan pada mata, calar pada permukaan mata, alahan mata, pelepasan mata, peningkatan pengeluaran air mata, sensitiviti kepada cahaya

Kesan sampingan Umum: sesak nafas, irama jantung tidak teratur, pening, gejala alahan meningkat, gatal-gatal, ruam, kemerahan kulit, mual dan urticarial

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada National Centre for Adverse Drug Reaction Monitoring melalui Tel: 03-78835490 atau laman web nppra.moh.gov.my [Public→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Penyimpanan dan Pelupusan MOVELOX

- Penyimpanan

Pastikan semua ubat tidak dapat dilihat atau dicapai oleh kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30 °C. Lindungi dari terkena cahaya.

Jangan simpan sebarang ubat di dalam bilik air, berhampiran sinki, atau di tepi tingkap.

Jangan tinggalkan ubat di dalam kereta, terutamanya bila cuaca panas. Suhu panas dan kelembapan boleh merosakkan ubat.

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang tertera pada bungkusan selepas 'EXP'. Tarikh luput ini merujuk kepada hari terakhir dalam bulan tersebut..

MOVELOX

(Moxifloxacin 0.5 % w/v Ophthalmic Solution USP)

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair kuning yang jernih, bebas dari zarahen bendasing.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Setiap ml mengandungi:

Moxifloxacin Hydrochloride USP

.....5.45 mg

Equivalent to Moxifloxacin .. 5 mg.

- Bahan tidak aktif

Sterile aqueous vehicle q.s.

- *Nombor MAL:*

MAL19016006AZ

Pengilang

INDOCO REMEDIES LTD

L-32, 33 & 34, Verna Industrial Area,
Verna, Goa – 403 722, INDIA.

Regd. Office: 166, C.S.T. Road, Mumbai
400 098, INDIA

Pemegang Pendaftaran Produk

Arms Pharma Sdn. Bhd,

22-1, Jalan PJU 5/20D, The Strand,
47810 Kota Damansara, Selangor

Tarikh kemaskini

11/06/2019

Nombor siri

NPRA(R2/1)190528/156

MOVELOX

(Moxifloxacin 0.5 % w/v Ophthalmic Solution USP)
