

ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS)

Dorzolamide 2% and Timolol 0.5%

Apakah yang ada pada risalah ini.

1. Apakah kegunaan ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS)
2. Bagaimana ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS) berfungsi
3. Sebelum menggunakan ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS)
4. Cara menggunakan ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS)
5. Semasa menggunakan ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS)
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS)
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS)

ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS) terdiri dari dua komponen. Dorzolamide hydrochloride dan Timolol maleate. Dorzolamide tergolong dalam golongan ubat-ubatan “*carbonic anhydrase inhibitors*”.

Timolol tergolong dalam golongan ubat-ubatan “*beta blockers*”

Bagaimana ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS) berfungsi

Setiap dua komponen ini menurunkan tekanan intraokular yang tinggi, sama ada atau tidak berkaitan dengan glaukoma, dengan mengurangkan rembesan humor akueus.

Sebelum menggunakan ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS)

Bila tidak boleh menggunakan

- jika anda alah kepada dorzolamide dan timolol atau mana-mana bahan lain ubat ini (disenaraikan dalam bahagian 6).
- Sekiranya anda mengalami masalah pernafasan yang lalu, seperti asma atau bronkitis obstruktif kronik yang teruk

(penyakit paru-paru yang teruk yang boleh menyebabkan kesukaran bernafas, sukar bernafas dan / atau batuk yang berpanjangan).

- jika anda mempunyai degupan jantung perlahan, kegagalan jantung atau gangguan irama jantung (rentak jantung yang tidak teratur).
- jika anda mempunyai penyakit atau masalah buah pinggang yang teruk, atau sejarah buah pinggang sebelum ini
- jika anda mempunyai keasidan darah yang berlebihan yang disebabkan oleh pembentukan klorida dalam darah (asidosis hyperchloraemic).

Jika anda tidak pasti sama ada harus menggunakan ubat ini atau tidak, hubungi doktor atau ahli farmasi anda.

Mengandung dan menyusukan anak

Jika anda mengandung atau menyusukan anak, berfikir anda mungkin mengandung atau bercadang untuk mempunyai anak, tanya nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil sebarang ubat.

Penggunaan semasa mengandung
Jangan menggunakan ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS) semasa kehamilan melainkan jika doktor anda menganggapnya perlu.

Penggunaan semasa menyusukan anak
Jangan menggunakan ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS) jika anda menyusukan anak. Timolol boleh masuk ke dalam susu anda. Dapatkan nasihat doktor anda sebelum mengambil sebarang ubat semasa menyusukan.

- Sebelum menggunakan ZOLAMIDOL

- Mengambil ubat-ubatan lain
ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS) boleh menjejaskan atau terjejas oleh ubat lain yang anda gunakan, termasuk ubat mata yang lain untuk rawatan glaukoma. Beritahu doktor anda jika anda menggunakan atau berhasrat menggunakan ubat lain untuk menurunkan tekanan darah, ubat jantung atau ubat untuk merawat kencing manis. Beritahu doktor atau

ahli farmasi anda jika anda menggunakan, baru-baru ini menggunakan atau mungkin menggunakan sebarang ubat lain. Ini amat penting jika anda:

- mengambil ubat untuk menurunkan tekanan darah atau merawat penyakit jantung (seperti penyekat saluran kalsium dan *beta-blockers* atau *digoxin*).
- mengambil ubat untuk merawat denyutan jantung yang terganggu atau tidak teratur seperti penyekat saluran kalsium, beta blocker atau *digoxin*.
- menggunakan satu lagi ubat titis mata yang mengandungi *beta-blocker*.
- mengambil *carbonic anhydrase inhibitor* yang lain seperti *acetazolamide*.
- mengambil *monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)* selalunya digunakan untuk merawat kemurungan).
- mengambil ubat parasimpatomimetik yang mungkin telah ditetapkan untuk membantu anda mengeluarkan air kencing. Ubat parasimpatomimetik adalah sejenis ubat tertentu yang kadang-kadang digunakan untuk membantu memulihkan pergerakan normal melalui usus.
- mengambil narkotik seperti morfin yang digunakan untuk merawat kesakitan sederhana dan teruk.
- mengambil ubat untuk merawat kencing manis.
- mengambil antidepresan yang dikenali sebagai *fluoxetine* dan *paroxetine*.
- Mengambil ubat yang mengandungi sulfur
- Mengambil quinidine (digunakan untuk merawat pelbagai keadaan jantung dan beberapa jenis malaria)

Cara menggunakan ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS)

Berapa banyak harus digunakan

Dos yang sesuai dan tempoh rawatan akan ditentukan oleh doktor anda. Dos yang disyorkan adalah satu titis pada mata yang terlibat dua kali sehari, contohnya pagi dan petang. Sekiranya anda menggunakan ubat ini dengan ubat titis mata yang lain, ubat titis harus digunakan berselang sekurang-kurangnya 10 minit. Jangan ubah dos ubat itu tanpa berunding dengan doktor anda. Jangan biarkan hujung bekas menyentuh mata atau kawasan sekitar

ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS)

Dorzolamide 2% and Timolol 0.5%

mata. Ia mungkin tercemar dengan bakteria yang boleh menyebabkan jangkitan mata yang membawa kepada kerosakan mata yang serius, mungkin hilang penglihatan. Untuk mengelakkan kemungkinan kontaminasi pada bekas, cuci tangan sebelum menggunakan ubat ini dan simpan hujung bekas dari sentuhan dengan sebarang permukaan. Sekiranya anda menganggap ubat anda tercemar, atau jika anda mengalami jangkitan mata, hubungi doktor anda dengan segera mengenai meneruskan penggunaan botol ini.

- Bila perlu digunakan
Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.
- Berapa lama perlu digunakan
Teruskan penggunaan ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS) selama yang di cadangkan oleh doktor.
- Jika terlupa menggunakan
Adalah penting untuk mengambil ubat ini seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Jika anda terlepas dos, gunakannya secepat mungkin. Walau bagaimanapun, jika sudah hampir masa untuk dos seterusnya, langkau dos terlepas dan kembali ke jadual dos biasa anda. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa.
- Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)
Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda menganggap anda atau sesiapa mungkin mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan ZOLAMIDOL

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Beritahu semua doktor, doctor gigi da ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil ZOLAMIDOL

(DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS)

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini melainkan jika diarahkan oleh doktor.

Jangan mengambil apa-apa ubat baru tanpa merujuk dengan doktor anda.

Jangan beri ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS) kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera:

Tiada kajian mengenai kesan keupayaan memandu atau menggunakan mesin telah dilakukan. Kesan-kesan sampingan yang berkaitan dengan ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS), seperti penglihatan kabur, yang boleh menjejaskan kemampuan anda untuk memandu dan / atau mengendalikan jentera. Jangan memandu atau mengendalikan jentera sehingga anda merasa sihat atau penglihatan anda jelas.

Kesan-kesan sampingan

Kesan-kesan sampingan berikut telah dilaporkan dengan Zolamidol.

Sangat biasa: Mata pedih, Disgeusia (hilang deria rasa)

Biasa: Jangkitan konjungtiva, Penglihatan kabur, Hakisan kornea (kerosakan lapisan sepan bebola mata), gatal-gatal pada mata, kerengsaan kelopak mata, Sinusitis (Radang pada selaput sinus hidung)

Tidak biasa: Urolithias (batu karang)

Jarang: Tanda-tanda dan gejala tindak balas alahan sistemik, termasuk angioedema, urticarial (gatal-gatal), pruritus (kegatalan kulit yang kronik), ruam, anafilaksis, sesak nafas, kegagalan pernafasan, rhinitis (koriza),

bronkospasma, dermatitis sentuh, sindrom Stevens-Johnson, nekrosis epidermis toksik.

Seperti ubat-ubatan lain, ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS) boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mendapatnya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npra.moh.gov.my (*Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI*)

Cara penyimpanan dan pelupusan ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS)

- Penyimpanan
Pastikan ubat tidak dapat dicapai dan dilihat oleh kanak-kanak. Simpan di bawah suhu 30 °C.
- Pelupusan
Ubat tidak boleh dilupuskan melalui sisa buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat-ubatan tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Larutan yang jelas dan tidak berwarna dan sedikit likat.

- Bahan-bahan
- Bahan aktif
Dorzolamide Hydrochloride 22.3 mg Equivalent to Dorzolamide 20 mg
Timolol Maleate 6.83 mg equivalent Timolol 5 mg.
- Bahan-bahan tidak aktif
- *Hydroxy Ethyl Cellulose*

ZOLAMIDOL (DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% EYE DROPS)

Dorzolamide 2% and Timolol 0.5%

a) Natrosol 250 HX Pharm.

b) Natrosol 250 HHX Pharm.

- Mannitol (Pearlitol 160C)

- Sodium Citrate

- Benzalkonium Chloride

- Sodium Hydroxide

- Water For Injection

- Nombor MAL:

MAL18106141AZ

Pengilang

INDOCO REMEDIES LTD.

L-32, 33, 34, Verna Industrial Area,

Verna, Goa 403 722, INDIA

Regd. Office: 166, C.S.T. Road,

Mumbai 400 098, INDIA.

Pemegang Pendaftaran Produk

Arms Pharma Sdn. Bhd.

22-1, Jalan PJU 5/20D,

The Strand, 47810 Kota Damansara,

Selangor D.E.,

MALAYSIA

Tarikh kemaskini

11/06/2019

Nombor siri

NPRA(R2/1)190528/155