

AJENAFIL CHEAWABLE TABLET

Sildenafil Citrate 25mg, 50mg dan 100mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Ajenafil Cheawable Tablet*
2. Bagaimana *Ajenafil Cheawable Tablet* berfungsi
3. Sebelum mengambil *Ajenafil Cheawable Tablet*
4. Cara menggunakan *Ajenafil Cheawable Tablet*
5. Semasa menggunakan *Ajenafil Cheawable Tablet*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Ajenafil Cheawable Tablet*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah Kegunaan *Ajenafil Cheawable Tablet*:

Rawatan untuk lelaki dewasa dengan masalah ketegangan, kadang-kadang dikenali sebagai mati pucuk. Ini adalah apabila zakar seorang lelaki tidak boleh mengeras atau tegang sesuai untuk aktiviti seksual.

Bagaimana *Ajenafil Cheawable Tablet* berfungsi:

Ajenafil Cheawable Tablet mengandungi sildenafil bahan aktif yang tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil phosphodiesterase jenis 5 (PDE5) inhibitors. Ia berfungsi dengan membantu untuk mengendurkan saluran darah di dalam zakar anda, melancarkan pengaliran darah ke dalam zakar anda apabila anda ghairah. *Ajenafil Cheawable Tablet* hanya akan membantu anda untuk mendapatkan ereksi jika anda dirangsang secara seksual.

Sebelum mengambil *Ajenafil Cheawable Tablet*:

Bila tidak boleh mengambil:

- Hipersensitiviti kepada bahan aktif atau dengan mana-mana eksipien
- Aktiviti seksual adalah tidak digalakkan.
- Kehilangan penglihatan pada sebelah mata kerana *Non Arteritic Anterior Ischaemic Optic Neuropati* (NAION).
- Kerosotan hepatic yang teruk, tekanan darah rendah (tekanan darah <90/50 mmHg), sejarah strok atau infarksi miokardium dan gangguan retina degeneratif keturunan, seperti retinitis pigmentosa

Sebelum mula ambil:

Beritahu doktor anda mengenai semua ubat yang anda ambil, termasuk ubat-ubatan preskripsi dan *over-the-counter*, vitamin, dan makanan tambahan herba.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil mana-mana yang berikut:

- Perencat CYP3A4 seperti Ketoconazole, erythromycin dan cimetidine.
- Ubat-ubt perencat *protease* HIV, seperti ritonavir, saquinavir.
- *Antacid* seperti magnesium hidroksida / aluminium hidroksida.
- Perencat CYP2C9 seperti tolbutamide, warfarin, phenytoin dan perencat CYP2D6 seperti thiazide.
- Rifampicin and barbiturates.
- Nicorandil dan nitrat lain
- Terapi Alpha-blocker

• Cara menggunakan *Ajenafil Cheawable Tablet*

Berapa banyak harus digunakan

Dewasa:

Dos yang disyorkan ialah 50 mg. Tablet perlu dikunyah sebelum ditelan.

Berdasarkan keberkesanan dan toleransi, dos boleh ditingkatkan kepada 100 mg atau berkurangan kepada 25 mg. Maksimum Dos yang disyorkan ialah 100 mg. Maksimum kekerapan dos yang disyorkan ialah sekali setiap hari. Jika *Ajenafil* diambil dengan makanan, bermulanya aktiviti boleh ditangguhkan berbanding negeri berpuasa.

Dos untuk orang tua:

Pelarasan dos tidak diperlukan untuk pesakit tua.

Bila perlu digunakan

Diambil seperti yang diperlukan kira-kira satu jam sebelum aktiviti seksual.

Berapa lama perlu digunakan

Ambil seperti yang dinasihatkan oleh doktor anda.

Jika terlupa menggunakan

Anda boleh mengambil satu jam sebelum aktiviti seksual.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Dos melebihi 100 mg tidak meningkatkan keberkesanan. Hubungi doktor anda jika anda mengambil lebih tablet daripada yang diperlukan.

Semasa menggunakan *Ajenafil Cheawable Tablet*

Perkara yang perlu dilakukan

Ambil 1 jam sebelum aktiviti seksual

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Anda tidak boleh menggunakan Ajenafil Chewable Tablet dengan ubat lain berkenaan rawatan untuk mati pucuk.
- Anda tidak boleh mengambil Ajenafil Chewable Tablet sekiranya anda tidak mempunyai masalah mati pucuk.
- Ajenafil Chewable Tablet mengandungi *Aspartame*. Anda tidak boleh mengambil jika anda pesakit *phenylketonuria*.
- Ajenafil Chewable Tablet mengandungi lactose. Jika anda mewarisi masalah intoleransi galaktosa, Lapp kekurangan laktase atau glukosa-galaktosa *malabsorption* anda tidak boleh mengambil ubat ini.

Perkara yang perlu diberi perhatian

- Status jantung anda.
- Jika anda mempunyai kecacatan pada zakar
- Jika anda mempunyai anemia sel sabit, *multiple myeloma* dan leukemia.

Kesan-kesan sampingan

Sakit kepala, kemerahan, ketidakcernaan, gangguan penglihatan, kesesakan hidung, pening dan rabun warna.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nptra.gov.my [*Consumers → Reporting side effects to Medicines (ConSERF) Or Vaccines (AEFI)*]

Cara penyimpanan dan pelupusan Ajenafil Chewable Tablet

Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C dalam bungkusan asal untuk melindungi daripada cahaya.

Pelupusan

Jangan buang sebarang ubat melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi bagaimana untuk membuang ubat-ubatan yang tidak lagi digunakan.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

25 mg: Berwarna putih, segi tiga, dengan sisi 7.3 mm, dwicembung, mencetak timbul dengan "25" pada satu belah.

50 mg: Berwarna putih, segi tiga, dengan sisi 8.8 mm, dwicembung, mencetak timbul dengan "50" pada satu belah.

100 mg: Berwarna putih, segi tiga, dengan sisi 11.8 mm, dwicembung, mencetak timbul dengan "100" pada satu belah.

Bahan-Bahan Kandungan

Bahan aktif

Sildenafil Citrate

Bahan tidak aktif

Polacrillin potassium, purified water, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous, aspartame, croscarmellose sodium, peppermint flavor, lactose monohydrate, povidone K-30, hydrochloride acid/potassium hydroxide.

MAL no:

Ajenafil 25mg Chewable Tablet: MAL18046144ACZ
Ajenafil 50mg Chewable Tablet: MAL18046145ACZ
Ajenafil 100mg Chewable Tablet : MAL18046146ACZ

Pengilang:

Genepharm S.A
18 Km Marathon Avenue -
15351 Pallini
Greece

Pemegang Pendaftaran

Produk:

AJ Research & Pharma Sdn.Bhd.
Unit 27.1, Level 27,
Menara Felda, Platinum
Park, No. 11, Persiaran
KLCC,
50088 Kuala Lumpur
Malaysia.

Tarikh kemaskini:

Disember 2022

Serial Number:

NPRA (R1/1)
09022023/040

