

Alpharme Amlodipine 5mg Tablet

Amlodipine Besilate 6.944mg equivalent to amlodipine 5mg

Alpharme Amlodipine 10mg Tablet

Amlodipine Besilate 13.888mg equivalent to amlodipine 10mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Alpharme Amlodipine
2. Bagaimana Alpharme Amlodipine berfungsi
3. Sebelum menggunakan Alpharme Amlodipine
4. Cara menggunakan Alpharme Amlodipine
5. Semasa menggunakan Alpharme Amlodipine
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Alpharme Amlodipine
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Alpharme Amlodipine

Alpharme Amlodipine adalah digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi (hipertensi) atau jenis kesakitan dada tertentu dipanggil angina, suatu bentuk yang jarang berlaku iaitu angina Prinzmetal atau varian angina.

Bagaimana Alpharme Amlodipine berfungsi

Alpharme Amlodipine adalah salah satu daripada kumpulan ubat dipanggil antagonis kalsium.

Pada pesakit-pesakit menghadapi tekanan darah tinggi, Alpharme Amlodipine berfungsi dengan mengendurkan saluran darah, supaya darah mengalir melaluinya dengan lebih mudah.

Pada pesakit-pesakit menghadapi angina, Alpharme Amlodipine berfungsi dengan menambahbaik bekalan darah kepada otot jantung yang mana kemudiannya menerima lebih banyak oksigen dan hasilnya kesakitan dada dicegah. Ia tidak memberikan

kelegaan segera untuk kesakitan dada daripada angina.

Sebelum menggunakan Alpharme Amlodipine

Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Alpharme Amlodipine sekiranya anda alergi kepada dihydropyridines dan amlodipine atau kepada bahan-bahan tidak aktif dalam ubat ini.

Sebelum menggunakan Alpharme Amlodipine

Sila beritahu doktor anda sekiranya anda:

- Pernah menghadapi penyakit jantung
- Pernah menghadapi masalah hati
- Sedang hamil, atau merancang untuk hamil. Doktor anda akan membuat keputusan seandainya Alpharme Amlodipine adalah rawatan terbaik untuk anda.
- Amlodipine diketahui meresap ke dalam susu ibu dalam kuantiti yang sedikit. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum anda mengambil sebarang ubat.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil atau baru-baru ini mengambil apa-apa ubat lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi kerana mereka boleh berinteraksi antara satu sama.

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika sedang mengambil:

- Simvastatin
- Sildenafil
- Tacrolimus
- Perencat mTOR (seperti sirolimus, temsirolimus, everolimus)
- Perencat CYP3A4 (seperti Ketoconazole, Itraconazole, Ritonavir, Clarithromycin)
- Pencetus CYP3A4 (e.g.

Rifampicin, Perforatum)

Hypericum

Cara menggunakan Alpharme Amlodipine

Berapa banyak harus digunakan

Untuk kedua-dua hipertensi dan angina, dos permulaan yang biasa adalah 5mg amlodipine sekali sehari, ia boleh ditambahkan kepada dos maksimum 10mg bergantung kepada tindak balas individu.

Sentiasa mengambil Alpharme Amlodipine dengan teliti seperti yang doktor anda telah memberitahu anda. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Bila perlu digunakan

Ia adalah yang terbaik untuk mengambil ubat anda pada masa yang sama setiap hari dengan minuman atau air. Jangan mengambil Alpharme Amlodipine dengan jus limau gedang dan buah limau gedang.

Berapa lama perlu digunakan

Doktor anda akan menasihati anda tempoh untuk mengambil ubat anda. Keadaan anda mungkin kembali jika anda berhenti menggunakan ubat anda sebelum anda dinasihatkan.

Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa mengambil dos, sila mengambil dos berikutnya pada jadual berikut. Jangan ambil dos berganda bagi dos yang terlepas.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda tidak sengaja mengambil terlebih Alpharme Amlodipine tablet (lebih daripada dos harian), hubungi doktor anda atau hospital terdekat untuk mendapatkan nasihat.

Semasa menggunakan Alpharme Amlodipine

Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda berasa anda mungkin hamil, atau merancang untuk hamil, anda perlu memberitahu doktor anda sebelum anda mengambil Alpharme Amlodipine.

Jika anda sedang menyusukan bayi atau merancang untuk penyusuan, anda perlu memberitahu doktor anda sebelum mengambil Alpharme Amlodipine.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil ubat-ubatan.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Jus limau gedang dan buah limau gedang

Jus limau gedang dan buah limau gedang tidak boleh diambil oleh mereka yang sedang mengambil Alpharme Amlodipine. Ini adalah kerana buah limau gedang dan jus limau gedang boleh meningkatkan paras bahan aktif amlodipine dalam darah, seterusnya menyebabkan tekanan darah menurun ke tahap yang lebih rendah secara tidak dijangka berikutan pengambilan Alpharma Amlodipine.

Memandu dan menggunakan jentera

Alpharme Amlodipine tidak berkemungkinan menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Alpharme Amlodipine boleh menyebabkan kesan-kesan

sampingan berikut. Kesan-kesan sampingan yang paling biasa adalah:

- Sakit kepala
- Berasa pening
- Rasa mengantuk yang lampau
- Flushing (berasa panas atau hangat pada muka anda)
- Palpitasi jantung (denyutan jantung sangat laju)
- Sakit perut, rasa loya
- Bengkak kaki atau buku lali anda
- Keletihan

Kesan-kesan sampingan yang biasa adalah:

- Leukopenia (penurunan sel-sel darah putih dalam darah), thrombocytopenia (kekurangan platelet dalam darah)
- Gula darah tinggi
- Insomnia, perubahan perasaan.
- Hypertonia (peningkatan ketegangan otot)
- Hypoesthesia/paraesthesia neuropati peripheral (kekurangan rasa sentuhan atau rangsangan)
- Pengan, gangguan rasa pada lidah, menggeletar.
- Gangguan penglihatan
- Tinnitus (deringan di telinga)
- Hipotensi (tekanan darah rendah), vasculitis (keradangan salur darah)
- Batuk, sesak nafas, hidung tersumbat
- Perubahan tabiat usus, mulut kering, senak (termasuk gastritis)
- Hyperplasia gingival (pembesaran gusi), pankreatitis, muntah
- Keguguran rambut secara tiba-tiba, penambahan berpeluh, purpura (merah atau ungu bitnik pada kulit), perubahan warna kulit, ruam kulit
- Sakit sendi, sakit belakang, kekejangan otot, sakit otot
- Peningkatan kekerapan kencing, gangguan kencing, nokturia (bangun pada waktu malam untuk membuang air kecil)
- Gynecomastia (payudara lelaki bengkak), mati pucuk
- Kelemahan, rasa tidak selesa, sakit

- Peningkatan/ penurunan berat badan

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Alpharme Amlodipine

Penyimpanan

Simpan pada suhu 30°C ke bawah.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Alpharme Amlodipine Tablet 5mg berwarna putih atau hampir warna putih, berbentuk oblong, dan satu garisan pada satu permukaan tablet.

Alpharme Amlodipine Tablet 10mg berwarna putih atau hampir warna putih, berbentuk oblong, dan satu garisan pada satu permukaan tablet.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Bahan aktif Alpharme Amlodipine adalah amlodipine besilate.

Bahan tidak aktif:

Microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate anhydrous, sodium starch glycolate, magnesium stearate.

Nombor MAL

Alpharme Amlodipine 5mg Tablet MAL _____

Alpharme Amlodipine 10mg
Tablet
MAL _____

Pengilang

Bluepharma
– Industria Farmaceutica, S.A
S. Martinho do Bispo,
3045-016 Coimbra.
Portugal

Pemegang Pendaftaran Produk

Alpharme PLC Sdn. Bhd.
Lot 6-01, 6th Floor, Choo Plaza,
41, Lorong Abu Siti,
10400 Georgetown, Penang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

24/2/2022

Nombor Siri

NPRA(R2)20/090

MYP043RM(00)