

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Coxa 500 Tablet
2. Bagaimana Coxa 500 Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Coxa 500 Tablet
4. Cara menggunakan Coxa 500 Tablet
5. Semasa menggunakan Coxa 500 Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Coxa 500 Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Coxa 500 Tablet

Coxa 500 Tablet digunakan untuk melegakan demam dan melegakan kesakitan.

Bagaimana Coxa 500 Tablet berfungsi

Coxa 500 Tablet mengandungi Paracetamol yang bersifat analgesik (melegakan kesakitan) dan antipiretik (anti-demam).

Sebelum menggunakan Coxa 500 Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Coxa 500 Tablet jika:

- Anda alergic kepada Paracetamol dan bahan kandungan lain.
- Anda mengambil ubat lain yang mengandungi Paracetamol.

Jika anda tidak pasti, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini.

- Sebelum menggunakan Coxa 500 Tablet

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika:

- Anda mempunyai masalah hati atau buah pinggang.
- Anda sedang hamil atau menyusukan bayi. Masalah pada manusia tidak dilaporkan apabila mengambil paracetamol semasa hamil atau menyusukan bayi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

AMARAN

Ubat ini mengandungi
PARACETAMOL.

Jangan mengambil ubat lain yang mengandungi paracetamol pada masa yang sama.

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil cholestyramine, metaclopramide, domperidone, warafin, chloramphenicol, ubat anti-radang bukan steroid (NSAID), alcohol, pendorong enzim hati, dan ubat hepatotoksik.

Cara menggunakan Coxa 500 Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

- Dewasa dan kanak-kanak 12 tahun ke atas: 1 - 2 tablet tiga hingga empat kali sehari seperti yang dikehendaki. Tidak lebih daripada 8 tablet dalam masa 24 jam kecuali diarahkan oleh doktor.
- Kanak-kanak bawah 12 tahun: Tidak disyorkan.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan pada label dengan teliti dan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa.

Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

Jika anda tidak pasti, rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan apabila anda terlupa menggunakan ubat ini.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan kulit menjadi pucat, mual atau muntah, kekejangan perut atau kesakitan, kehilangan selera makan, dan kerosakan hati.

Semasa menggunakan Coxa 500 Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Coxa 500 Tablet

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Coxa 500 Tablet kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Elakkan pengambilan alcohol Ketika anda menggunakan ubat ini.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Coxa 500 Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Kesan-kesan sampingan paracetamol adalah ringan, walaupun alahan dan tindak balas hematologi (tindak balas ubat yang berkaitan dengan darah, biasanya dimanifestasi dengan paras darah yang tidak normal) pernah dilaporkan. Berhenti mengambil ubat dan beritahu doktor anda dengan segera jika anda

mengalami reaksi alergi termasuk ruam kulit, pembengkakan lapisan kulit yang mendalam, Sindrom Steven Johnson / Epidermal toksik.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Amaran alergi: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Antara gejala-gejalanya termasuk kemerahan pada kulit, lepuh atau ruam. Gejala -gejala seperti di atas menunjukkan tanda-tanda keadaan yang serius. Sekiranya tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan ubat ini dan dapatkan bantuan dengan segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan

Coxa 500 Tablet

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Lindungi dari cahaya. Jauhi daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Coxa tablet adalah putih, bulat, seragam dengan garisan belah di satu permukaan. Garisan belah bukanlah untuk tujuan membahagikan tablet kepada dos yang sama rata.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Paracetamol 500mg

- Bahan tidak aktif

Pregelatinized starch, stearic acid, Povidone, dan purified water.

- Nombor MAL

MAL22036020XCZ

Pengilang

Medinfar Manufacturing, S.A.

Parque Industrial Armando Martins

Tavares

Rua Outeiro da Armada, 5

Condeixa-a-Nova

3150-194 Sebal

Portugal

Pemegang Pendaftaran Produk

Alpharme Plc Sdn Bhd.

Lot 6-01, 6th Floor, Choo Plaza,

41 Lorong Abu Siti, 10400

Georgetown, Pulau Pinang,

Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

21/02/2024

MYX066RM (01)

Nombor Siri

NPRA (R2) 21/081