

CANDID-B CREAM

Clotrimazole 1% and Beclomethasone 0.025%

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Candid-B
2. Bagaimana Candid-B berfungsi
3. Sebelum menggunakan Candid-B
4. Cara menggunakan Candid-B
5. Semasa menggunakan Candid-B
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Candid-B
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Candid-B

CANDID-B Cream boleh memberi manfaat kepada jangkitan kulat kulit, terutamanya apabila disertai dengan ciri-ciri ekzematous.

Bagaimana Candid-B berfungsi

CANDID-B Cream adalah gabungan *Clotrimazole* dan *Beclometasone Dipropionate*.

Clotrimazole adalah agen antikulat *imidazole* dan berkesan terhadap pelbagai kulat. *Clotrimazole* dipercayai melaksanakan aktivitinya pada membran sel kulat.

Beclometasone Dipropionate adalah *synthetic glucocorticoid* dan digunakan secara aplikasi topical untuk rawatan pelbagai dermatosis. Aplikasi topical *Beclometasone Dipropionate* menghasilkan penindasan dermatosis dengan kuat dan mempercepatkan anti-radang, anti-prurit, anti alergi, anti-proliferasi serta tindakan menyempitkan saluran darah.

Sebelum menggunakan Candid-B

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil ubat ini jika anda alah terhadap sebarang bahan kandungan lain untuk ubat ini.

Jangan mengambil ubat ini jika anda mengalami tuberkulosis kulit, *herpes simplex*, cacar air, campak, vaksin, luka kulit yang sifilis.

Jangan mengambil Candid-B secara masa yang lama jika anda menghamil.

- Sebelum menggunakan Candid-B

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda sebelum anda mula menggunakan produk ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Candid-B

- Berapa banyak harus digunakan

Kekerapan permohonan secara amnya adalah 2 hingga 3 kali sehari. Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda. Selepas mengawal gejala ekzematous, beralih ke CANDID Cream atau Lotion boleh dinasihatkan sehingga jangkitan kulat utama sepenuhnya dibasmi.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor atau ahli farmasi anda jika terambil dos berlebihan.

Semasa menggunakan Candid-B

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Candid-B.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Candid-B dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera
Tiada laporan.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Candid-B boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Penggunaan steroid secara topical di kawasan kulit yang besar, dengan atau tanpa pakaian eksklusif, boleh menyebabkan penyerapan sistemik steroid.

Atrofi setempat (sebahagiannya atau lengkap membuang sebahagian daripada badan) dan striae (tanda regangan) telah dilaporkan dengan steroid topical.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui Tel: 03-78835490, atau laman web npa.gov.my [Consumer Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Candid-B

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

31/12/2019

Simpan dibawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya.

Nombor Serial

NPRA(R2/1)191230/318

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

HDPE balang yang dilabel dengan tagger mempunyai sisipan dan topi berwarna putih mengandungi krim separuh pepejal putih

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Clotrimazole

Beclomethasone Dipropionate

- Bahan tidak aktif

Propylene Glycol, White Soft

Paraffin, Liquid Paraffin,

Cetomacrogol Emulsifying Wax,

Benzyl Alcohol, Methyl

Hydroxybenzoate, Propyl

Hydroxybenzoate, Butylated

Hydroxytoluene, Sodium

Dihydrogen Phosphate Dihydrate,

Dibasic Sodium Phosphate

Anhydrous, Purified Water

- Nombor MAL

MAL19872019AZ

Pengilang

Glenmark Pharmaceuticals LTD
Plot No. E-37, 39, D-Road, MIDC,
Satpur, Nashik - 422 007, Maharashtra
State, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Glenmark Pharmaceuticals (Malaysia)
Sdn Bhd (660397-W) D-31-02, Menara
Suezcap 1, No. 2, Jalan Kerinchi, 59200
Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP