

CANDID V1 VAGINAL INSERT

Clotrimazole (500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Candid V1*
2. Bagaimana *Candid V1* berfungsi
3. Sebelum mengambil *Candid V1*
4. Cara menggunakan *Candid V1*
5. Semasa menggunakan *Candid V1*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Candid V1*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Candid V1*

Candid V1 digunakan untuk merawat jangkitan faraj yang disebabkan oleh kulat - terutamanya *candida* dan/atau *trichomonas*.

Bagaimana *Candid V1* berfungsi

Candid V1 menghalang atau membunuh banyak kulat, termasuk ragi dan dermatofit; Ia juga berkesan terhadap *trichomonas vaginalis*.

Sebelum mengambil *Candid V1*

- *Bila tidak boleh mengambil*
- Jika anda alah (hipersensitif) kepada *clotrimazole* atau mana-mana komponen penyediaan.
- Sepanjang tempoh haid anda mungkin kurang berkesan

Mengandung dan menyusukan anak

Sila berjumpa doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda hamil, merancang kehamilan atau menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Sebelum mula mengambil

Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil *Candid V1* jika:

- Jika anda alah (hipersensitif) kepada *clotrimazole* atau mana-mana komponen penyediaan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil, atau baru-baru mengambil sebarang ubat lain. Ini termasuk apa-apa ubat yang anda beli tanpa preskripsi

Terutamanya jika anda mengambil:

- *Tacrolimus* dan *sirolimus* (ubat imunosupresif)

Cara menggunakan *Candid V1*

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Candid V1 Vaginal Tablet 500mg:

1 tablet harus digunakan sebagai dos tunggal yang dimasukkan sedalam mungkin ke dalam vagina.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Tiada gejala berlebihan dos telah dilaporkan.

Jika berlaku, hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan *Candid V1*

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *Candid V1*.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi *Candid V1* dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Candid V1 tidak boleh digunakan dengan aplikator semasa kehamilan. *Candid V1* boleh mengurangkan keberkesanan produk lateks seperti kondom; walau bagaimanapun ia hanya berlaku buat sementara waktu semasa rawatan.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Candid V1* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Gangguan sistem imun:

- Reaksi alahan (pengsan, tekanan darah rendah, sesak nafas, urtikaria, kulit gatal)

Gangguan sistem reproduktif dan penyakit payudara:

- Pengelupasan kulit pada alat kelamin, kegatalan, ruam, edema, *erythema* (kemerahan kulit), ketidakselesaian, kesakitan, kerengsaan, sakit bahagian pelvis, pendarahan faraj

Gangguan gastrousus:

- Sakit perut

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan

Candid V1

- *Penyimpanan*

Lindungi dari cahaya & kelembapan

Simpan dibawah suhu 30°C.

- *Pelupusan*

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- *Rupa dan warna produk*

Candid V1 Vaginal Insert

Karton bercetak dengan risalah, aplikator dibungkus dalam beg polipropilena dan jalur aluminium bercetak mengandungi 1 faraj biconvex putih tablet tidak bersalut dengan logo G pada satu sisi dan jelas di sisi lain.

- *Bahan-bahan kandungan*

- Bahan aktif
Clotrimazole

- Bahan tidak aktif

Candid V1 Vaginal Tablet 500mg:
Lactose Monohydrate, Maize Starch, Methylparaben, Propylparaben, Sodium Starch Glycolate, Talc, Magnesium Stearate, Colloidal Silicon Dioxide, Purified Water.

- *Nombor MAL*

Candid V1 Vaginal Insert:
MAL19900335AZ

Pengilang

Glenmark Pharmaceuticals Ltd
Plot No. E37,39, MIDC Area,
Satpur, Nasik-422007,
Maharashtra, INDIA

**Pemegang Pendaftaran Produk
Glenmark Pharmaceuticals
(Malaysia) Sdn. Bhd.**

D-31-02, Menara Suezcap 1,
No. 2, Jalan Kerinchi,
59200, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

05.09.2023

Nombor siri

NPRA(R2/1)230906/1135