

CANDID™- V GEL

Clotrimazole USP 2% w/w

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Candid - V Gel
2. Bagaimana Candid - V Gel berfungsi
3. Sebelum menggunakan Candid - V Gel
4. Cara menggunakan Candid - V Gel
5. Semasa menggunakan Candid - V Gel
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Candid - V Gel
8. Maklumat Lanjut
9. Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Candid - V Gel

Candid - V Gel melegakan kerengsaan pada vulva (vulvitis) yang disebabkan oleh seriawan faraj / *vaginal thrush* (candidiasis). Walaupun gel ini memberikan kelegaan daripada kerengsaan luaran yang disebabkan oleh seriawan faraj, ia tidak boleh merawat jangkitan dalaman faraj. Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mengesyorkan rawatan. Hanya gunakan produk ini jika anda telah sebelum ini disahkan mempunyai seriawan faraj oleh doktor. Sesetengah wanita mengalami jangkitan seriawan yang berulang. Untuk mengurangkan kekerapan serangan ini, pasangan seksual anda harus sapu gel ini dibahagian zakar (*penis*) agar dapat mengelakkan jangkitan berulang walaupun pasangan ini tidak mempunyai sebarang simptom jangkitan seriawan.

Bagaimana Candid - V Gel berfungsi

Bahan aktif dalam Candid - V Gel adalah Clotrimazole. Clotrimazole tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil azoles dan merupakan ejen anti-kulat yang melawan punca jangkitan seperti seriawan faraj.

Clotrimazole faraj Gel adalah disyorkan untuk rawatan vulvitis candida. Ia boleh digunakan sebagai tambahan kepada rawatan vaginitis candida.

Ia juga boleh digunakan untuk rawatan zakar pasangan seksual untuk mencegah jangkitan berulang.

Sebelum menggunakan Candid - V Gel

Jangan gunakan Candid - V Gel

Jika anda alergi (hipersensitif) kepada Clotrimazole atau mana-mana bahan-bahan lain, termasuk chlorocresol, cetyl alkohol, dan propylene glycol, daripada Candid - V Gel (lihat Maklumat Lanjut).

Sebelum menggunakan Candid - V Gel, anda perlu berjumpa dengan doktor anda jika:

- Anda tidak pasti sama ada anda mempunyai seriawan atau ini adalah kali pertama anda mempunyai simptom-simptom ini.
- Anda mempunyai lebih daripada dua jangkitan seriawan dalam tempoh enam bulan lepas.
- Anda atau pasangan anda pernah mempunyai penyakit kelamin.
- Anda berumur di bawah 16 atau lebih 60.
- Anda pernah mempunyai reaksi alahan kepada Candid - V Gel atau mana-mana produk anti-kulat faraj yang lain.
- Anda mempunyai mana-mana gejala berikut:
 - pendarahan faraj yang tidak berkala
 - pendarahan faraj yang tidak normal atau mempunyai discaj yang mempunyai kesan pendarahan
 - ulser, lepuhan atau kesakitan di bahagian faraj (*vagina*) atau bahagian luar faraj (*vulva*)
 - kesakitan di bahagian bawah perut.
 - kesakitan atau kesukaran membuang air kecil.
 - demam atau menggigil.
 - rasa sakit atau muntah-muntah.
 - cirit-birit.
 - mempunyai discaj yang berbau busuk daripada faraj

Ini kerana Candid - V Gel mungkin tidak rawatan yang sesuai untuk anda.

Maklumat penting tentang bahan-bahan yang terkandung dalam Candid - V Gel:

Produk ini mengandungi chlorocresol, cetyl alkohol, dan propylene glycol, yang boleh menyebabkan reaksi alahan, tindak balas

kulit setempat (contohnya dermatitis), dan kerengsaan kulit.

Langkah perlindungan khas (*special precaution*):

Seperti gel lain, produk ini boleh mengurangkan keberkesanan kontraseptif bahan getah, seperti kondom atau gegendang (*diaphragms*). Oleh itu, anda perlu menggunakan langkah berjaga-jaga alternatif untuk sekurang-kurangnya lima hari selepas menggunakan produk ini.

Mengandung dan menyusukan anak:

Jika anda hamil, menyusukan anak atau bercadang untuk hamil, beritahu doktor atau bidan anda sebelum menggunakan Candid - V Gel. Sekiranya doktor atau bidan telah maklum, sila ikut arahan beliau secara teliti.

Cara menggunakan Candid - V Gel

Jika Candid - V Gel telah dipreskripsikan kepada anda oleh doktor, sila ikut arahan yang diberi. Sekiranya anda mendapatkan produk ini tanpa preskripsi doktor, sila ikut arahan yang berikut secara teliti:

- Sebelum anda dapat menggunakan gel ini, anda harus menusuk lapisan tertutup tiub dengan menggunakan penusuk yang ada di bahagian atas kepala penutup (*cap*).
- Untuk merawat simptom gatal-gatal dan kesakitan vulva (vulvitis), gel harus disapu secara nipis dan rata di kawasan sekitar bukaan faraj dan pastikan sapuan resap secara perlahan-lahan, 2 atau 3 kali sehari. Produk untuk merawat jangkitan seriawan dalaman (internal vaginal infection) harus digunakan pada masa yang sama.

Rawatan perlu diteruskan sehingga simptom-simptom jangkitan hilang. Dapatkan nasihat doktor jika simptom jangkitan anda tidak bertambah baik dalam masa tujuh hari selepas anda tamat rawatan untuk jangkitan dalaman faraj.

CANDID™- V GEL

Clotrimazole USP 2% w/w

Merawat pasangan seksual anda:

Jika pasangan seksual anda dirawat dengan gel ini, gel yang patut diterapkan pada hujung zakar 2 atau 3 kali sehari sehingga dua minggu.

Candid - V Gel adalah untuk kegunaan luar sahaja:

Jangan letakkan gel di dalam mulut anda atau menelannya.

Jika gel ditelan secara tidak sengaja, beritahu doktor anda dengan segera atau hubungi Jabatan Kemalangan dan Kecemasan hospital yang berdekatan.

Semasa menggunakan Candid - V Gel

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai penggunaan ubat ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Kesan-kesan Sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Candid - V Gel boleh menyebabkan kesan sampingan, Walaubagaimanapun, tidak semua orang akan dapat kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan yang lain, sesetengah orang mungkin alahan terhadap gel. Jika anda mempunyai alahan, tindak balas akan berlaku sebaik sahaja anda telah menggunakan gel ini. Jika anda mengalami reaksi alahan atau kemerahan, membakar, sakit, gatal-gatal atau bengkak menjadi lebih buruk, berhenti menggunakan produk ini dan beritahu doktor anda dengan segera atau hubungi Jabatan Kemalangan dan Kecemasan hospital yang berdekatan. Tanda tindak balas alahan mungkin termasuk:

- Ruam
- Kesukaran untuk menelan atau bernafas
- Bengkak dibahagian bibir, muka, tekak atau lidah
- Lemah, rasa pening atau pengsan
- Mual atau loya

Selepas anda menggunakan gel ini, anda juga mungkin alami kesan sampingan yang berikut:

- Gatal-gatal, ruam, lepuh, sensasi bakar, ketidakselesaan, bengkak, kerengsaan, kemerahan atau kulit mengelupas.

Sekiranya anda mengalami apa-apa kesan sampingan di atas, atau mengalami apa-apa kesan tindakbalas yang buruk terhadap gel ini yang tidak tersenarai di atas, sila beritahu doktor atau ahli farmasi segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my (Public → Reporting Medicinal Problems/ Side Effects/AEFI)

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Candid - V Gel

Jauhi daripada kanak-kanak

Produk ini harus disimpan dalam kotak asalnya.

Jangan simpan di suhu melebihi 30°C., lindungi daripada cahaya.

Jangan gunakan Candid - V Gel selepas tarikh luput yang dinyatakan pada label kotak dan label botol. Tarikh luput adalah merujuk kepada hari terakhir bulan yang tercetak.

Ubat-ubatan tidak harus dibuang bersama sisa buangan air atau sisa isi rumah. Sila bertanya dengan ahli farmasi cara membuang ubat-ubatan yang tidak diperlukan lagi. Langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif adalah Clotrimazole pada kekuatan 2% w/w.
- Bahan lain termasuk Chlorocresol, Carbomer 940 (Carbopol 940), Cetyl alcohol, Cetomacrogol Emulsifying Wax, Propylene Glycol, Glycerine Refind, Benzyl Alcohol, Sodium Hydroxide, Purified Water

-Rupa dan warna produk

Kotak bercetak yang mengandungi risalah, aplikator dan tiub aluminium jenis collapsible yang mengandungi gel semi solid berwarna putih.

Pengilang

Glenmark Pharmaceuticals Ltd
Plot No E-37, 39, D-Road, MIDC,
Satpur, Nashik -422 007,
Maharashtra State, India

Pemegang Pendaftaran Produk

Glenmark Pharmaceutical (Malaysia) Sdn Bhd

D-31-2, Menara Suezcap 1, No. 2, Jalan
Kerinci, 59200, Kuala Lumpur.

Tarikh Kemaskini RiMUP

26.07.2023

Nombor Siri

NPRA(R2/1)230725/1113