

CANDID EAR DROPS

Clotrimazole USP 1% w/w

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Candid Ear Drops
2. Bagaimana Imiquad Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Candid Ear Drops
4. Cara menggunakan Candid Ear Drops
5. Semasa menggunakan
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Candid Ear Drops
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Candid Ear Drops

Bahan aktif untuk Candid 1% Ear Drops ialah clotrimazole. Clotrimazole berada dalam kumpulan ubat yang dipanggil imidazole dan adalah ubat anti-kulat yang boleh menangani punca jangkitan fungi dalam telinga.

Secara asas, varian lawan dikalangan spesies fungi sensitif adalah sangat jarang; kejadian lawan lanjut (secondary resistance) oleh fungi sensitif hanya dilihat dalam kes-kes yang tertentu dibawah keadaan terapeutik.

Sebelum menggunakan Candid Ear Drops

- Bila tidak boleh menggunakan Candid Ear Drops

Jika anda allergik (alahan) terhadap clotrimazole atau mana-mana bahan tidak aktif

-Sebelum mula menggunakan Candid Ear Drops

Jika anda hamil, menyusui atau bercadang untuk hamil, beritahu doktor/ bidan sebelum guna Candid Ear Drops. Justeru, ikut arahan doktor/bidan dengan teliti.

Penggunaan Ubatan Lain

Jika digunakan bersama, Candid Ear Drops dan Sofradex Drop mungkin menyebabkan reaksi haba/panas. Rujuk doktor sebelum menggunakan produk-produk ini bersama untuk rawatan telinga anda.

Cara menggunakan Candid Ear Drops

Berapa banyak harus digunakan

Jika Candid Ear Drops telah dipreskripsikan oleh doktor anda, ikut arahan yang doktor beri. Jika ubat ini dibeli tanpa preskripsi, sila ikut arahan yang berikut secara teliti:

-Untuk infeksi telinga, titiskan 2-3 titis Candid Ear Drop ke dalam telinga dua atau tiga kali sehari.

-Rawatan harus disambung untuk sekurang-kurangnya dua minggu setelah semua tanda infeksi telah hilang untuk elak daripada infeksi berulang.

Candid Ear Drops adalah untuk kegunaan luaran sahaja.

Bila harus digunakan

Untuk merawat infeksi fungus/kulat di bahagian luar dan tengah telinga.

Berapa lama harus digunakan

Jika Candid Ear Drops telah dipreskripsikan oleh doktor anda, ikut arahan yang telah diberikan. Jika anda beli produk ini tanpa preskripsi, sila ikut arahan yang berikut secara teliti;

-Untuk infeksi telinga, titiskan 2-3 titis Candid Ear Drops dalam telinga untuk dua atau tiga kali sehari.

- Rawatan harus disambung untuk sekurang-kurangnya dua minggu setelah semua tanda infeksi telah hilang untuk elakkan infeksi berulang.

Jika terlupa guna

Gunakan ubat ini sejurus ingat dan teruskan rawatan secara biasa.

Jika guna terlalu banyak (terlebih dos)

Tiada risiko intoksikasi akut dilihat kerana kemungkinan ia berlaku akibat terlebih dos dalam satu kali aplikasi pada kulit (aplikasi ke atas permukaan yang luas di bawah keadaan yang menggalakkan meyerapan) atau pengambilan secara oral yang tidak disengajakan. Tiada ubat penawar yang spesifik.

Namun, sekiranya dalam situasi kemalangan ubat diambil secara oral, langkah-langkah biasa seperti lavaj gastrik harus di jalankan sekiranya simptom-simptom klinikal terlebih dos wujud (eg. pening, loya atau muntah). Lavaj gastrik juga hanya boleh dilakukan jika saluran pernafasan boleh dilindungi secara cukup.

Semasa menggunakan

Perkara yang harus dilakukan

Jika Candid Ear Drops telah dipreskripsikan oleh doktor anda, ikut arahan yang doktor beri. Jika ubat ini dibeli tanpa preskripsi, sila ikut arahan yang berikut secara teliti:

-Untuk infeksi telinga, titiskan 2-3 titis Candid Ear Drop ke dalam telinga dua atau tiga kali sehari.

-Rawatan harus disambung untuk sekurang-kurangnya dua minggu setelah semua tanda infeksi telah hilang untuk elak daripada infeksi berulang.

-Sekiranya ada mengalami kesan sampingan, bincang dengan doktor, ahli farmasi atau jururawat.

Bagaimana Candid Ear Drops berfungsi

Clotrimazole berfungsi terhadap fungi melalui aktiviti menghentikan sintesis ergosterol. Ini merosakkan struktur serta fungsi membrane cytoplasma fungi.

Clotrimazole mempunyai spectrum antimycotic in-vitro dan in-vivo yang luas, yang meliputi dermatophytes, yis, kulat dan lain lain. Di bawah keadaan ujian yang sesuai, bacaan MIC (Minimum Inhibitory Count) untuk jenis-jenis fungi ini adalah dalam bacaan kurang daripada 0.062-8.0 ug/ml substrat. Kaedah berfungsi clotrimazole yang utama adalah fungistatic atau fungicidal bergantung kepada kepekatan clotrimazole di kawasan infeksi. Aktiviti in-vitro adalah terhad kepada proliferasi elemen fungi; spora fungi hanya sedikit sensitif.

Tambahan kepada fungsi antimycotic, clotrimazole juga berfungsi terhadap microorganism gram positif (streptococci/ staphylococci/ Gardnerella vaginalis), dan microorganism gram-negatif (Bacteroides). Secara in-vitro, clotrimazole menghentikan pertumbuhan Corynebacteria dan gram-positif cocci, dengan pengecualian terhadap Enterococci, dalam kepekatan substrat 0.5-10 ug/ml.

Perkara yang anda tidak harus lakukan

Candid Ear Drops adalah untuk kegunaan luaran sahaja.

Jangan letak cecair ini ke dalam mulut atau menelannya.

Jika cecair ini ditelan secara tidak sengaja, beritahu doktor anda serta-merta atau hubungi Pusat Kemalangan dan Kecemasan hospital yang terdekat.

Jika cecair ini termasuk mata atau mulut secara tidak sengaja, basuh serta-merta dengan air dan hubungi doktor anda.

Perkara yang harus diberi perhatian

Jika anda hamil, menyusu atau bercadang untuk hamil, beritahu doktor atau bidan sebelum menggunakan Candid Ear Drops. Jika telah beritahu doktor/bidan, ikut arahan yang diberikan secara teliti.

Kesan-kesan Sampingan

Seperti semua ubatan, Candid Ear Drops boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun ia tidak dialami oleh semua orang. Seperti semua ubatan, sesetengah orang mungkin alergik terhadap cecair ini. Jika alergik, reaksi alergik akan muncul sejurus selepas anda mula gunakan cecair ini. Jika anda alami reaksi alergik, hentikan penggunaan Candid Ear Drops dan segera beritahu doktor anda atau hubungi Pusat Kemalangan dan Kecemasan hospital yang terdekat.

Tanda-tanda reaksi alergik boleh meliputi:
Ruam
Kesukaran menelan/ masalah pernafasan
Bengkak di bahagian bibir, muka, kerongkong atau lidah
Lemah, rasa pening atau pitam
Loya

Selepas anda menggunakan cecair ini, anda mungkin mengalami:
Gatal, ruam, kulih melepuh, rasa membakar, ketidakselesaan, bengkak, kerengsaan, kemerahan kulit atau kulit mengelupas.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda segera jika anda alami mana-mana kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)] or

Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Candid Ear Drops

Simpan di bawah 30°C. Lindungi dari cahaya.

Jangan buang ubat ini melalui sisa buangan air atau sisa isi rumah. Sila bertanya dengan ahli farmasi cara membuang ubat-ubatan yang tidak diperlukan lagi. Langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

Deskripsi Produk

Rupabentuk produk

Karton bercetak yang mengandungi satu sisipan risalah ubat dan satu botol LDPE yang berlabel dan dipasang lengkan dengan plug dan penutup berwarna biru. Botol ini mengandungi cecair tanpa warna yang likat.

Bahan-bahan

-Bahan aktif
Clotrimazole USP

-Bahan tidak aktif
Propylene Glycol USP base

Nombor MAL:

MAL19900331AZ

Pengilang dan Pemegang pendaftaran produk

Pengilang

Glenmark Pharmaceuticals Ltd
Plot No. E-37, 39, D-Road, MIDC,
Satpur, Nashik - 422 007,
Maharashtra State, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Glenmark Pharmaceuticals (Malaysia) Sdn
Bhd (660397-W)
D-31-02, Menara Suezcap 1,
No. 2, Jalan Kerinchi,
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

31/01/2022

No Siri

NPRA(R2/1)200707/480

