

EZZICAD 10mg Tablets

Ezetimibe Tablets 10mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan EZZICAD
2. Bagaimana EZZICAD berfungsi
3. Sebelum menggunakan EZZICAD
4. Cara menggunakan EZZICAD
5. Semasa menggunakan EZZICAD
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan EZZICAD
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP
12. Nombor Siri

Apakah kegunaan EZZICAD
EZZICAD ialah tablet yang mengandungi 10mg ezetimibe sebagai bahan aktif.

- EZZICAD ialah ubat penurun kolesterol
- EZZICAD merawat aras kolesterol yang terlalu tinggi pada pesakit apabila pemakanan sahaja tidak dapat menurunkan aras tersebut dengan memadai.
- EZZICAD menurunkan aras jumlah kolesterol, kolesterol LDL (tidak baik) dan trigliserida yang terlalu tinggi, dan juga meningkatkan kolesterol HDL (baik).
- EZZICAD boleh dimakan sendiri ataupun dengan ubat penurun kolesterol yang lain yang digelar *statin*, di samping mengawal pemakanan.
- EZZICAD boleh dimakan bersama dengan *fenofibrate*, iaitu sejenis ubat penurun kolesterol yang lain, di samping mengawal pemakanan.

Bagaimana EZZICAD berfungsi

EZZICAD bertindak dengan mengurangkan penyerapan kolesterol di dalam usus kecil. *Statin* dan *fenofibrate* mengurangkan kolesterol dengan cara yang berbeza, iaitu

ubat-ubat bertindak di dalam hati.

EZZICAD menambahkan kesan penurunan kolesterol yang ada pada *statin* dan *fenofibrate*.

Sebelum menggunakan EZZICAD

- Bila tidak boleh menggunakan

Pesakit yang hipersensitif (alah) terhadap ezetimibe atau terhadap mana-mana bahan tidak boleh mengambil EZZICAD.

Mengandung dan menyusukan anak

Jika anda hamil atau berhasrat untuk menjadi hamil, EZZICAD mungkin tidak sesuai bagi anda.

Jika anda menyusukan anak dengan susu badan, EZZICAD boleh dirembes ke dalam susu anda.

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum menggunakan EZZICAD

Bincanglah dengan doktor anda tentang masalah perubatan (seperti penyakit hati atau masalah pada hati) atau alergi yang sedang atau yang pernah anda hidapi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda, jika anda telah mengambil sebarang ubat baru-baru ini, atau jika anda mula mengambil ubat baru. Ini termasuk ubat-ubat yang anda membeli tanpa preskripsi. Sesetengah ubat lain mungkin mempengaruhi cara EZZICAD berfungsi.

Khususnya, beritahu doktor anda mengambil ubat-ubatan mengandungi mana-mana

bahan-bahan aktif yang berikut:

- Ciclosporin (sering digunakan dalam pesakit pemindahan organ)
- Ubat-ubatan mengandungi bahan aktif untuk mengelakkan pembekuan darah, seperti *warfarin* atau *fluindione* (antikoagulan)
- *Cholestyramine* (juga digunakan untuk mengurangkan kolesterol), kerana ia menjejaskan cara EZZICAD berfungsi
- *Fibrates* (juga digunakan untuk mengurangkan kolesterol)

Cara menggunakan EZZICAD

- Berapa banyak harus digunakan

Makan satu biji tablet 10mg setiap hari, pada bila-bila masa.

- Bila perlu digunakan

- EZZICAD boleh dimakan bersama-sama ataupun tanpa makanan.
- Doktor mungkin mengarahkan anda mengambil EZZICAD bersama dengan ubat-ubat lain, iaitu *statin* ataupun *fenofibrate*, supaya kolesterol anda dapat dikawal dengan lebih baik.
- Jika anda mengambil *statin* atau *fenofibrate*, EZZICAD boleh dimakan pada waktu yang sama seperti ubat tersebut.
- Jika doktor mempreskripsikan EZZICAD bersama dengan *cholestyramine* (sejenis sekuestran asid hempedu) atau mana-mana sekuestran asid hempedu yang lain, EZZICAD mestilah dimakan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum atau 4 jam selepas mengambil sekuestran asid hempedu tersebut.

Sentiasa gunakan EZZICAD sebagaimana yang diarahkan oleh doktor anda. Berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

EZZICAD 10mg Tablets

Ezetimibe Tablets 10mg

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil ubat penurun kolesterol anda melainkan diarahkan oleh doktor untuk berhenti.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil EZZICAD seperti yang dipreskripsikan. Walau bagaimanapun, jika anda tertinggal satu dos, teruskan sahaja mengikut jadual seperti biasa, iaitu sekali sehari.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Makanlah EZZICAD seperti yang diarahkan bagi anda. Jika anda memakan jumlah EZZICAD yang melebihi preskripsi, hubungilah doktor atau ahli farmasi.

Semasa menggunakan EZZICAD

- Perkara yang perlu dilakukan

EZZICAD mestilah dimakan seperti yang diarahkan oleh pengamal perubatan yang menjaga anda.

Maklumkan doktor anda tentang ubat-ubat lain yang sedang diambil atau anda merancang untuk mengambil. Ini termasuk ubat-ubat tanpa preskripsi.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berkongsi EZZICAD dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Kesan sampingan yang mungkin menjejaskan kemampuan anda memandu atau mengendalikan jentera pernah dilaporkan apabila mengambil ezetimibe. Tindak balas setiap orang terhadap EZZICAD mungkin berbeza.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, EZZICAD boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Ezetimibe pada amnya dapat diterima dengan baik.

Apabila dimakan dengan sendiri, kesan sampingan yang berikut dilaporkan berlaku:

Lazim berlaku: sakit pada bahagian perut; cirit-birit; angin; rasa penat.

Tidak lazim berlaku:

peningkatan pada hasil beberapa ujian fungsi hati (*transaminase*) atau fungsi otot (CK); batuk; senak; pedih hulu hati; loya; sengal; spasma otot; sakit leher; kurang selera makan, sakit, sakit dada, merah muka; tekanan darah yang tinggi.

Selain itu, apabila dimakan dengan *statin*, kesan sampingan yang berikut dilaporkan berlaku:

Lazim berlaku: peningkatan pada hasil beberapa ujian fungsi hati (*transaminases*); sakit kepala; sakit otot, otot terasa sakit apabila disentuh atau lemah.

Tidak lazim berlaku: rasa gelenyar; mulut kering; gatal-gatal; ruam; urtikaria; sakit belakang; lemah otot; sakit pada lengan dan betis; penat atau lesu yang luar biasa; bengkak, terutamanya pada tangan dan kaki.

Apabila dimakan dengan *fenofibrate*, kesan sampingan yang berikut dilaporkan berlaku:

Lazim berlaku: sakit pada bahagian perut.

Selain itu, kesan sampingan yang berikut pernah dilaporkan apabila digunakan secara umum: tindak balas alergi (yang mungkin memerlukan rawatan segera) termasuklah bengkak pada muka, bibir,

lidah, dan/atau tekak yang boleh menyebabkan kesukaran bernafas atau menelan, ruam, dan urtikaria; ruam merah yang timbul, kadangkala dengan lesi berbentuk sasaran; sakit otot; rasa penat atau lemah yang luar biasa; perubahan pada hasil sesetengah ujian darah; keradangan pankreas; sembelit; pening; rasa gelenyar; kemurungan; batu hempedu; dan radang pundi hempedu.

Hubungilah doktor dengan segera jika anda mengalami sakit otot, otot yang terasa sakit apabila disentuh, atau lemah otot tanpa sebab yang diketahui apabila mengambil EZZICAD. Ini kerana walaupun jarang-jarang sekali berlaku, namun masalah otot boleh menjadi serius, seperti penguraian otot yang mengakibatkan kerosakan ginjal.

Bincanglah dengan doktor pada bila-bila masa anda mengalami masalah perubatan yang anda rasa mungkin berkait dengan EZZICAD.

Jika anda diberi EZZICAD bersama *statin*, pegawai perubatan yang menjaga anda itu mungkin akan melakukan ujian darah yang rutin untuk memeriksa fungsi hati anda sebelum dan selepas akan rawatan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan EZZICAD

- Penyimpanan

Simpan dibawah suhu 30°C.

EZZICAD 10mg Tablets

Ezetimibe Tablets 10mg

- Pelupusan

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput.

Jika anda mempunyai sebarang tablet yang tidak diperlukan lagi, dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda tentang cara pelupusan tablet yang tidak perlukan. Ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Putih keputihan, bentuk kapsul, rata, tepi beveled tablet yang tidak bersalut terukir dengan logo Glenmark 'G' di satu sisi dan '44' di sisi lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Ezetimibe

- Bahan tidak aktif
Lactose Monohydrate,
Sodium Lauryl Sulphate,
Croscarmellose Sodium,
Povidone K-30,
Croscarmellose Sodium and
Magnesium Stearate

- Nombor MAL:

MAL

Pengilang

Glenmark Pharmaceuticals
Limited,
Plot No. 2, Phase II, Pharma
Zone, Indore Special Economic
Zone, Pithampur, Dist. Dhar
(M.P), 454775 India

Pemegang Pendaftaran

Produk

Glenmark Pharmaceuticals
(Malaysia) Sdn Bhd (660397-
W)
D-31-02, Menara Suezcap 1,
No.2, Jalan Kerinchi,
59200 Kuala Lumpur,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

- 03/02/2021

Nombor Siri

NPRA (R2) 20/141